

## עלון לצרcn לפי תקנות הרווחים (תקנירם) התשמ"ג - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

### **ציטאלופרム טבע 20 מ"ג**

#### **טבליות מצופות**

**הרכב:**

כל TABLET מצופה מכילה:  
ציטאלופרם (כהידרובורומיד) 20 מ"ג  
Citalopram (as hydrobromide) 20 mg

למיידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה סעיף 2 "מיידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מיידע נוספת".

- קרא בעיון את עלון עד סופו לפני שימוש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
- מומלץ לחת לבן משפחה או אדם אחר הקרוב אליו לעליון זה.
- תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

**ازהרה: מחשבות והתנהגות אובדןית**  
תרופות נוגדות לדיכאון וחרדה, מעלות את הסיכון להתנהגות ומחשבות אובדןית בילדים, מתבגרים ומבוגרים צעירים עד גיל 25.  
עם תחילת הטיפול בתרופה, על המטופלים בכל הגילאים וקרובייהם, לעקב אחר שינויים בתנהגותיים כגון: החמרה הדיכאון, מחשבות אובדןית, תוקפנות וכדומה.  
במידה וילדים שינויים כאלה, יש לפנות מיד לרופא.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

**פעולות רפואיות:** לטיפול בדיכאון ובהפרעת חרדה.  
ציטאלופרם טבע שייכת לקבוצת תרופות נוגדות לדיכאון הנקראות מעכבי ספיגת סרotonin סלקטיביים (SSRI). תרופות אלו מעלות את רמות הסרotonin במוח. הפרעות במערכת הסרוטונין במוח נחשות לגרום חשוב בהתקפות של דיכאון ומחלות הקשורות אליו.

**קבוצה טיפולית:** מעכבי ספיגת סרotonin סלקטיביים (SSRI).

#### **2. לפני השימוש בתרופה**

##### **אין להשתמש בציטאלופרם טבע אם:**

- אתה רגיש (אלרג) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראה חומרים בלתי פעילים בסעיף 6). היועץ ברופא אם אתה חשש שיש לך רגש.
- אתה מטופל בו זמן קצר בתרופות מקבוצת מעכבי מונואמינאוקסיד (MAOIs) כגון: פנליין, איפרונייאזיד, איזוקרבוקסזיד, ניאלמייד, טרניליציפרומין ומוקלובמיך (משמשים לטיפול בדיכאון); סLAG'ליין (טיפול במחלת הפרקיינסון); לינזוליד (אנטיבוטיק). גם אם סימת ליטולichert בין התרופות מקבוצת מעכבי מונואמינאוקסיד הבאות: פנליין, איפרונייאזיד, איזוקרבוקסזיד, ניאלמייד או טרניליציפרומין עליך לחכות שבועיים לפני שתתחיל לטבול את טבליות ציטאלופרם טבע.
- יש לך מתין יום אחד לאחר הפסקת נתילת מוקלובמיך. לאחר הפסקת נתילת ציטאלופרם טבע יש להמתין שבוע אחד לפני נטילת תרופה כלשהי מקבוצת מעכבי מונואמינאוקסיד.
- אתה סובל מlidיה או ססבלת בעבר מארועים של קצב לב לא נורמלי (ניתן לראות אותם בא.ק.ג.) בדיקה להערכת תפוקוד הלב).
- אתה נוטל תרופות לטיפול בעבויות בקצב הלב או תרופות אשר עשוות להשפיע על קצב הלב (ראה סעיף "תגובהות בין-תרופתיות" בהמשך העalon).

## **ażherot miyukhot haengutot leshimot batrufah**

**לפני הטיפול בציטאלופרム טבע, ספר לרופא אם יש לך בעיות רפואיות כלשהן ובמיוחד אם יש לך:**

- עבר של הפרעות דימום או אם סבלת בעבר מדימום בקיבה או במעי, או אם את בהירין (ראי עייף "הירין, הנקה ופוריות")
- מחלת כבד
- מחלת כלות
- סוכרת ("יתכן יהיה צורך להתאים את מינון התרופות לסוכרת")
- אפילפסיה או היסטוריה של התקפים או פרוכסים
- הפרעת מאניה או חרדה
- רמות נמוכות של גתran בدم
- אתה מטופל בэнזע חשמלי (ECT)
- אתה סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הלב או אם סבלת לאחרונה מהתקף לב קצב לב נמוך במנוחה /או אם ידוע לך שאתה עלול לפתח ירידת ברמות מלחים בדם,
- כתוצאה של משילשול חמוץ ממושך והקאות או כתוצאה מננטילת תרופות משתנות
- סבלת מקצב לב מהיר או לא סדר, עילפון, התמוטטות או סחרחות בעת מעבר לעמידה אשר עלול להזכיר על תפקוד לך קצב הלב
- או היי לך בעבר בעיות עיניים, כגון סוגים מסוימים של גלאוקומה (עליה בלחץ התוך עיני)

נא הייעץ ברופא גם אם הממצאים שפורטו מעלה קרו לך בזמן כלשהו בעבר.

### **שים לב:**

- חלק מהחולמים במחלה מאניה-דרטסיה עלולים להיכנס לשלב של מאניה. שלב זה מאופיין בחילופי רעימות מהירים ולא רגילים, שמהה אשר אינה הולמת את המצב יתר פעילות גופנית. אם חשת בתופעות אלה - פנה לרופא.
- תסמניהם כגון חוסר שקט, קושי בישיבה או עמידה ללא תזוזה עלולים להופיע בשבועות הראשוניים של הטיפול. פנה לרופא מייד, אם הבחנת בתופעות אלה.
- תרופות כדוגמת ציטאלופרם טבע (הנקרואוט/SNRI/SSRI) עלולות לגרום לתסמנים של הפרעות בתפקוד המימי (ראה סעיף 4). במקרים מסוימים התסמנים נמשכו גם לאחר הפסקת הטיפול.

**מידע מיוחד הקשור למחלתן**  
כמו תרופות אחרות המשמשות לטיפול בדיכאון או במקרים של הקשרות בך, השיפור אינו מושג באופן מיידי. לאחר תחילת הטיפול בציטאלופרם טבע, יתכן כי יחלפו מספר שבועות עד שתתחוש בשיפור. בתחילת הטיפול, חלק מהמטופלים חוות חרדה מוגברת, שנעלמת בהמשך הטיפול. לפיכך, חשוב מאד לנוכח במידוק לפי הוראות הרופא, ולא להפסיק את הטיפול או לשנות את המינון לפני התיעיצות עם הרופא.

### **מחשבות אובדן או החמרה בדיכאון או בהפרעת חרדה:**

- אם הינך סובל מדיכאון /או מהפרעות חרדה יכולות להיות לך לעיתים מפעם לפעם מחשבות אובדן או על פגעה עצמה.
- מחשבות אלו עלולות להיות מוגברות בתחילת הטיפול בנוגדי-דיכאון, כיוון שנדרש זמן עד שההשפעה נוגדת הדיכאון של התרופה מורגשת. בדרך כלל בשבועיים, אך לעיתים זמן ארוך יותר. קיים סיכוי גבוה יותר שתחשוב כך אם:
- היי לך בעבר מחשבות אובדן או על פגעה עצמה.
- אתה מבוגר צער. מידע מחקרים קליניים הראה עלייה בסיכון להתנהגות אובדןית במבוגרים צעירים (מתוך גיל 25 שנים) הסובלים ממחלה פסיכיאטרית אשר טיפולו בנוגדי דיכאון.

אם אתה חוות מחשבות אובדן או על פגעה עצמה, בכל זמן שהוא, **פנה באופן מיידי לרופא המטפל או גש לבית החולים.**

**מומלץ לספר לקרוּב משפחה או לחבר קרוב** שאתה סובל מדיכאון או הפרעת חרדה ולבקש מהם לקרוא עליו זה.

בקש מהם לספר לך אם הם חושבים כי חלה החמרה בדיכאון או בהפרעת חרדה שלך, או אם הם מוטרדים משינויים שהלכו בהתנהגותך.

## ילדיים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים

ציטאלופרム טבע אינה מיועדת בדרך כלל לשימוש בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים. עליך לדעת כי במטופלים מתחת לגיל 18 שנים אשר לך חו תרופות מקבוצה זו, קיים סיכון מגבר לתופעות לוואי כגון ניסיונות התאבדות, מחשבות אובדן ועינוי (במיוחד תוקפנות, התנהגות מרדנית וזעם). למורת זאת, הרופא שלך יכול לרשום תרופה זו למטופלים מתחת לגיל 18 שנים אם הוא סבור שהדבר לטובתם.

אם הרופא רשם את התרופה למטופל מתחת לגיל 18 שנים ואתה מעוניין לדון בכך - פנה שנית לרופא.

עליך לדוחות לרופא שלך אם הופיעו חלק מתופעות לוואי שיפורטו או שהן הוחדרו, במטופלים מתחת לגיל 18 שנים הנוטלים ציטאלופרם טבע. כמו כן, טרם נבדקו השפעות הבטיחות הארוכות טווח של ציטאלופרם טבע בקבוצת הגיל הזה, מבחינת גידלה, התגברות והתפתחות קוגניטיבית-התנהגותית.

### תגובהות בי-תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. תרופות עלולות להשפיע על פעולות תרופות אחרות והדבר עלול לגרום לעיתים לתופעות לוואי חמורות. ספר לרופא או לרוקח שלך אם אתה נוטל, נטלת בעבר או שאתה עשוי ליטול תרופות כלשהן, כולל תרופות אחרות לדיכאון (ראה סעיף "אין להשתמש בцитאלופרם טבע אם").

- התכשיר הצמחי סנט ג'ון ווורט (היפריקום פרפרואטום) – אין ליטול אותו בו זמנית עם ציטאלופרם טבע.
- מעכבי מונומיאוקסיד (MAO) – אין ליטול תרופות אלה בו זמנית עם ציטאלופרם טבע (ראה סעיף "אין להשתמש בцитאלופרם טבע אם").

ספר לרופא אם אתה נוטל אחת מבין התרופות הבאות:

- לינזolid (אנטיביוטיקה).
- סומטריפטן (טיפול במיגרנה) או טרמડול ובופנוורפין ותרופות דומות (משככי כאבים חזקים).
- נטילת תרופות אלה יחד עם ציטאלופרם עלולה לגרום לסינדרום סרוטוני, מצב של סיכון חיים אפשרי. הסינדרום עלול להיות הקשור לתסמינים כגון התכווצויות קצביות, לא רצניות של שרירים, כולל שריריהם השולטים על תנועת העין, אי-שקט, הזרמת, הצעת יתר, רעד, רפלקסים מוגברים, עלייה במתוח הגוף וחום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס. פנה אל הרופא אם אתה חשים בתסמינים אלה.
- ליתיום (למניעה וטיפול במאניה) וטריפטופן (טיפול בדיכאון).
- פימוזיד (ניירולפטיק). אין ליטול אותו בו זמנית עם ציטאלופרם טבע.
- אימיפרמין ודיזפרמין (תרופות לטיפול בדיכאון).
- תרופות המכילות סלג'ליין (המשמש לטיפול במחלת הפרקינסון).
- סימטידיון, לנזופרזול ואומפרזול (טיפול בכיבכ קיבה), פלוקונאזול (משמש לטיפול בziehomים פטריטיים), פלווקסמין (טיפול בדיכאון) וטיקלופידין (המשמש להורדת הסיכון לשbez). הללו עלולים להביא לעלייה ברמותבדם של ציטאלופרם בדם.
- מפלוקווין (טיפול במלליה).
- בופרופין (טיפול בדיכאון).
- תרופות הידועות כמשפיעות על טסיות הדם (לדוגמה תרופות נוגדות קריישה המשמשות לטיפול או מניעת של היוצרות של קריישי דם; אספירין ונוגדי דלקת שאנים סטרואידים (NSAIDs) כגון איבופרופן ודיקלופנאק המשמשים כמשככי כאבים וכן תרופות אנטי פסיקטיביות ונוגדי דיכאון טריציקליים).
- מטופרולול, חוסם בטא המשמש לטיפול במיגרנה, מחלות לב מסוימות ויתר לחץ דם. ההשפעה של כל אחת מהתרופות עלולה להיות מוגברת, מוחלשת או שונה.
- תרופות נירולפטיקות (טיפול בסכיזופרניה).

אין ליטול ציטאלופרם טבע אם אתה נוטל תרופות לטיפול בהפרעות בקצב הלב או תרופות שעשויה להיוות להן השפעה על קצב הלב כגון תרופות אנטי אריתמיות מקבוצה A וקבוצה III, תרופות אנטי פסיקטיביות (לדוגמה נגזרות של פנטיאזינים, פימוזיד, הלופרידול, נוגדי דיכאון טריציקליים, תרופות אנטי-מיקروبיאליות מסוימות (לדוגמה ספרפלוקסצין, מוקסיפלוקסצין, אriterומיצין במתן תור-ורדי, פנטמידין, תרופות נגד מלריה ובמיוחד הלופנטרין), אנטי-היסטמינים מסוימים (אסטמיזול, מיזולסטין). אם יש לך שאלות נוספות בקשר לכך לפנות אל הרופא.

## **שימוש בתרופה ומזון**

ניתן ליטול את התרופה עם או בלי מזון.

### **שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול**

כמו לגבי כל התרופות נוגדות הדיכאון, מומלץ להימנע משתיית אלכוהול במהלך הטיפול בתרופה, זאת למטרות שלא נפתחה עליה בהשפעה של אלכוהול כתוצאה מנטיילת ציטאלופרם טבּע.

### **הירין, הנקה ופוריות**

#### **הירין**

אם את נוטלת ציטאלופרם טבּע סמוך לתום ההירין, עשוי להיות סיכון מגבר לדימום וגינלי כבד זמן קצר לאחר הלידה, במיעוד אם יש בעבר הפרעות דימום. על הרופא או המילדת שller להיות מודעים לכך שאת נוטلت ציטאלופרם טבּע כדי שהם יוכלו לסייע לך. יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופות כלשהן. אם את בהירין, חושבת שהינך בהירין או מנסה להרוויח, ספרי לרופא.

אל תשתמשי בציטאלופרם טבּע כאשר הינך בהירין, אלא אם כן התייעצת עם הרופא שller ודנטה עמו בסיכון לעונמת התועלת בליקחת תרופה זו. ודאי כי המילדת / או הרופא יודיעים שאתה נוטלת ציטאלופרם טבּע. נטילת תרופות כמו ציטאלופרם טבּע במהלך ההירין, ובמיוחד בשלושת החודשים האחרונים להירין, עלולה להעלות את הסיכון למצב חרום בתינוקות הנגרא יתר לחץ דם ריאתי עיקש של הילד (PPHN) הגורם לנשימה מהירה ומראה של עור כחלה לתינוק. סימנים אלו מופיעים בדרך כלל ב-24 השעות הראשונות לאחר הלידה. אם הבחנת בסימנים אלה בתינוק, יש לפנות מיד למילדת / או לרופא. כמו כן, אם את נוטلت ציטאלופרם טבּע במהלך שלושת החודשים האחרונים של ההירין ועד ללידה, עליך לדעת כי התופעות הבאות עלולות להופיעبيلוד: התקפים (עוויתות), חום גוף גבוה מדי או נמוך מדי, קשי האכלה, הקאות, רמת סוכר נמוכה בدم, שרירים נוקשים או רפואיים, רפלקסים מוגברים, רעד, עצבניות, רגירות, תשישות, בכיבלי פוסק, ישנוניות או קשיים בשינה. יש לפנות לרופא באופן מיידי אם תינוקך מראה סימני כלשהו מסימנים אלו.

### **הנקה**

היוועצי ברופא או ברוקח לפני נטילת תרופות כלשהן. אם הינך מניקה, עליך להיוועץ ברופא. אין להניך בזמן השימוש בתרופה, מכיוון שכמויות קטנות עלולות לעבור לחלב.

### **פוריות**

מחקרים בבעלי חיים הראו כי ציטאלופרם, החומר הפעיל בציטאלופרם טבּע, מפחיתת את האיכות של הזרע. באופן תיאורתי, הדבר עלול להשפיע על פוריות, אולם טרם נפתחה השפעה על פוריות באדם.

### **נהיגה ושימוש במכונות**

ציטאלופרם טבּע בדרך כלל אינה משפיעה על יכולת לבצע פעולות יומיומיות, אולם אם אתה חש סחרחות או ישנוניות בתחילת הטיפול בתרופה, עליך לנתקו זהירות בעת נהיגה ברכב או הפעלת מכונות מסוכנות או בכלל פעילות המכ"ב ערנות, עד שתסמנים ALSO.

### **מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**

ציטאלופרם טבּע מכילה לקטוז. אם נאמר לך על-ידי הרופא שיש לך אי-סבירות (רגישות) לסוכרים מסוימים, היועץ ברופא לפני נטילת התרופה. תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

### **3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או ברוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון והטיפול בלבד. המינון המקביל בדרך כלל הוא: המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד. המינון המקביל בתכשיר. טיפול בדיכאון: מינון התחלתי של 10 מ"ג ליום בשבוע הראשון לטיפול ולאחר מכן העלאת מינון ל-20 מ"ג ליום. הרופא יכול להעלות את המינון עד 40 מ"ג ליום. טיפול בהפרעת חרדה: מינון התחלתי של 10 מ"ג ליום בשבוע הראשון לטיפול ולאחר מכן העלאת מינון ל-20 מ"ג ליום. הרופא יכול להעלות את המינון עד 40 מ"ג ליום.

**קשישים (מעל גיל 65):** נדרש הפחתה למחצית מהמינון המומלץ: 10 מ"ג עד 20 מ"ג ליום. מינון מקסימלי 20 מ"ג ליום.  
**מטופלים עם הפרעות בתפקוד הכלבי:** נדרש מינון מופחת: מינון מקסימלי 20 מ"ג ליום.

**ילדים ותבגרים ( מתחת לגיל 18 שנים):**

אין לתת ציטאלופרם טבּע לילדים ותבגרים. מידע נוספת ראה סעיף 2 "לפני השימוש בתרופה". Citalopram Teva 20 mg SD, Notif 8.2023

אין לעבור על המנה המומלצת.

#### אופן השימוש

יש ליטול ציטאלופרム טבע עם אחת ביום.

ניתן לבוחר כל שעה ביום לנטיילת התרופה, עם מזון או בלבד.

אין ללווע את התרופה (כיוון שתעטמה מר). יש לבלווע את התרופה עם מעט מים.

אין להחזיק את התרופה בפה מעבר לזמן הדרוש לבלייתה.

ניתן לחזות את הטבילה.

#### אם נטלת בטיעות מינון גבוהה יותר:

תסמנני מינון יתר (אשר חלוקם יכולם להיות מסכני-חיים): קצב לב לא סדייר, פרכויסים, שינוי בקצב הלב, ישנוניות, אובדן הכרה, הקאות, רעד, ירידת בלוטת הדם, עלייה בלוטת הדם, בחילה, סינדרום סרטוניין (ראה סעיף 4 "טופעות לוואי"), אי שקט, סחרחות, אישונים מורחבים, עור כחלחל, הפירוננטילציה.

אם נטلت מנת יתר או אם בטיעות בעליל מין התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה אליו, גם אם אין חש בתסמינים המופיעים לעיל.

אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא!

יש לשתמש בתרופה זו בזמנים קבועים כפי שנקבע על-ידי הרופא המטפל.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד, יש ליטול מנה מייד כשנזכרת; אך בשום אופן אין ליטול שתי מנות בידך.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

#### משך הטיפול:

בדומה לתרופות אחרות המיעדות לטיפול בדיכאון ובמחלות דומות, השיפור אינו מושג באופן מיידי. לאחר התחלת הטיפול בתרופה, יתכן ויחלו מספר שבועות (כ- 2-4 שבועות) לפני שתרגיש בשיפור במצבך. בתחילת הטיפול חולמים מסוימים עלולים לחוש עלייה בתחושת החרדה אשר עתידה להעלם בהמשך הטיפול. חשוב על כן להקפיד על נטילת התרופה על פי הוראות הרופא ולא להפסיק את נטילת התרופה או לשנות את המינון הניטל, ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה: הפסקה פתאומית של נטילת התרופה עלולה להוביל לתסמינים הבאים: סחרחות, כאב ראש, בחילה, הקאות, העזה, תחושת עצבנות או אי שקט, רעד, תחושת שינוי, תחושת חרדה, כאב בראש, בלבול או דיסאוריינטציה, אי יציבות רגשית, שלשול, הפרעות בראייה, פעימות לב מהירות ומוגברות (פלפיטציות).

משך הטיפול בתרופה שונה ממטופל למטופל, והוא בדרך כלל לפחות 6 חודשים. חולמים עם דיכאוןות חזוריות עשויים להיות מטופלים בתרופה במשך זמן ארוך יותר וכך מספר שנים. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התיעיצות עם הרופא או הרוקח: מחלתה עלולה לחזור וכן, במידה וyoichlat על הפסקת הטיפול יש לעשות זאת באופן הדרגתי כדי למנוע הופעת תופעות לוואי.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעע שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

#### 4. טופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בציגאלופרם טבע עלול לגרום לטופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.

אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אחד מהן.

חלק מתופעות הלואוי המופיעות מטה עשוויות להיות גם תסמנים של מחלתה וייתכן והן יعلמו כאשר תתחיל לחוש שיפור בהרגשתך.

## **תופעות לוואי חמורות**

- יש להפסיק את השימוש בציגיאלופרם טבע ולפנות מיד לרופא אם מופיעים התסמינים הבאים:**
- קשיי נשימה.
  - נפיחות של הפנים, השפטים, הלשון או הגרון העוללה לגרום לקשיי בליעה או נשימה.
  - גרד חמוץ של העור (עם גושים מורמיים).
  - קצב לב מהיר, לא סדר, עילפון אשר עלולות להיות תסמיינים למצב מסכן חיים הידוע בשם "פיטול השנתות" (torsades de pointes).

**אם אתה מבחין באחד מבין התסמינים הבאים עלייך לפנות לרופא מיידית היות ויתכן כי יש להוריד את המינון שאתה נוטל או להפסיק את הטיפול:**

- יש לרק התקף אפילפטי לראשונה או אם חלה עליה בתדרות ההתקפים האפילפטיים ביחס לעבר.
- אם התנהגותך משתנה היות אתה חש בהתורמות רוח או התרגשות יתר.
- אם יש לך חום גבוה, עצבנות, הבלבול, רעד או כיווץ חזק של שריריהם. תסמיינים אלו עלולים להוות סימנים של סינדרום סרטוניון (נדיר).
- עייפות, בלבול וכיווץ שריריים. הללו עלולים להיות סימנים לרמה נמוכה של נתן בدم (היפונתרמיה).

**אם יש לך בזמן שהוא מחשבות אובדן או מחשבות על פגיעה בעצמך, פנה מיד לרופא או לבית החולים.**

**תופעות הלואין הבאות הן בדרך כלל קלות וחולפות לאחר מספר ימי טיפול.**

**תופעות לוואי מאד שכיחות (מופיעות ביותר ממשתמש אחד עשרה):**

- ישנונות
- קשיי שינה
- כאב ראש
- שינויים בתבנית השינה שלך
- ירידת חזק הגוף, חולשה
- הצעת יתר
- יבש בפה (עליה סיכון לעששת וכן יש לצחצח שניים בתדרות גבוהה מהרגיל)
- בחילה

**תופעות לוואי שכיחות (מופיעות בעד ל- 1 מתוך 10 משתמשים):**

תיאנון מופחת, אי שקט, דחף מיני מופחת, חרדה, עצבנות, הבלבול, חלומות לא רגילים, ירידת ברגשות, אדיישות (אפטיה), רעד, עקצוץ או קחות תחושה בידיים או ברגליים, סחרורת, בעיות ביכולת הריכוז, מיגרנות, אובדן זיכרו, צלצול באזוניהם (טיניטוס), דפיקות לב, פיחוק, נזלת או אף סחומם, שלשול, הקאות, עצירות, כאבי בטן, גיזם במערכת העיכול, ריר, גרד, כאבי שרירים ופרקדים, בעיות בזקפה ובשפיכת זרע בגברים, קושי בהאגעה לאורגזמה בנשים, עייפות, דקירות בעור, ירידת בمشקל.

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות בעד ל- 1 מתוך 100 משתמשים):**

דימום עורי (חלות), תיאנון מגבר, תוקפנות, הזיות, מאניה, עילפון, אישונים מוגדים, קצב לב מהיר או איטי, סרפתת (סוג של פריחה), נשירת שער, פריחה, רגשות לאור השימוש, קשיים בהטלת שתן, דימום מגבר בזמן המחזור, התנפחות הגוף, עלייה במשקל.

**תופעות לוואי נדירות (תופעות בעד ל- 1 מתוך 1000 משתמשים):**

דחף מיני מגבר, פרכוויים, תנעות לא רצויות, הפרעה בטעם, דימום, שיעול, דלקת בכבד, הרגשה כללית לא טוביה.

**תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (דווחו על ידי מספר משתמשים):**

דימום ויגני כבד זמן קצר לאחר הלידה, ראה מידע נוסף בסעיף "הירון, הנקה ופוריות" המופיע בסעיף 2 של העalon.

מחשבות אובדן או מחשבות על פגיעה עצמית (ראה גם בסעיף 2 "לפני השימוש בתרופת"), ירידת בטסיות הדם (טרומבויצ'ופניה) המעליה סיכון לדימומים או חבלות, רגשות יתר (פריחה), היפוקלמייה: רמת אשגן נמוכה בדם העוללה לגרום לחולשת שרירים, עוינותות או קצב לב לא תקין; עליה ברמות בדם של הורמן בשם פרולקטין, התקף פאניקה, חריקת שיניים, חוסר מנוחה, תנעות שרירים לא רגילים או שרירים נוקשים, אקנתיזה (תנעות לא רצויות), לחץ דם נמוך, דימום מהף, הפרעות דימום הכלולות דימום תת עור או מהריות, התנפחות פתאומית של העור או של הריריות, בגברים- זקפה מכאייה, הפרשת חלב בגברים ובנשים שאין מיניות, מחרוזים לא סדרים, תוצאות

לא רגילות בבדיקות תפקודי כבד, עליה בסיכון לשברים בעצמות נצפתה במטופלים הנוטלים סוג זה של תרופות, קצב לב לא רגיל.

תרופות מקבוצת SSRI עלולות במרקם נדרים, להביא לעלייה בסיכון לדימומיים, כולל דימום קיבת או מעיים. ספר לרופא אם הקאת דם או אם הופעה אצל צואה שחורה או המוכתמת בדם. כמו כן ספר לרופא אם הינך ממשיך לסבול מתסמיינים אחרים של דיכאון. הללו עלולים לכלול חרדה, מאניה או בלבול.

**בדרך כלל תופעות הלואין חולפות לאחר מספר ימים. אם תופעות הלואין אינן חולפות או שהן מטרידות, אם אחת מתופעות הלואין מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לואין שלא הזכרה בעבר, עלייך להתייעץ עם הרופא.**

#### דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### **5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומם סגור מחוץ להישג ידך וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי קר תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחריה תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזינה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **יש לאחסן במקום יבש, מתחת ל- 25°C.**
- אין להשאיר תרופות לאשפה הביתיית או לביב. התקיעץ עם הרוקח כיצד תוכל להיפטר מתרופות שאין בהן צורך יותר. צעדים אלה יעזורו לשמר על הסביבה.

#### **6. מידע נוספת**

##### **נוסח על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:**

Microcrystalline Cellulose (Avicel PH-101), Lactose Monohydrate, Maize Starch, Croscarmellose Sodium (Primellose® SF), Copovidone (Kollidon® VA 64), Magnesium Stearate, Hypromellose, Glycerol, Microcrystalline Cellulose, Titanium Dioxide (E-171), Macrogol Stearate 40.

**כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה:**  
טבליה לבנה מצופה, בעלת צורה אליפטית עם קו חציה בצדיה אחד.  
גודל אריזות: 28, 30 טבליות. ניתן ולא כל גודלי האריזות משוקרים.

**שם בעל הרישום וכתובתו:** טבע ישראל בע"מ, רח' דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.  
**שם הייצור וכתובתו:** פולפארמה פרמוציאיטייל S.A. גダンסק, פולין.

**העלון נערך באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.**

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 136.19.31231**

לשם הפשטות ולהקלת הקיריה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.