

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ג - 1986
התרופה משווקת על ידי מרשם רפואי בלבד

**קובומטיקס 20 מ"ג
קובומטיקס 40 מ"ג
קובומטיקס 60 מ"ג**

טבליות מצופות

| חומרים פעילים וكمותם | |
|---|--|
| | קובומטיקס 20 מ"ג |
| cabozantinib (as (S)-malate) | כל טבלייה מכילה 20 מ"ג קבוזנטיניב (בצורת (S)-מלאט) |
| cabozantinib (as (S)-malate) | כל טבלייה מכילה 40 מ"ג קבוזנטיניב (בצורת (S)-מלאט) |
| cabozantinib (as (S)-malate) | כל טבלייה מכילה 60 מ"ג קבוזנטיניב (בצורת (S)-מלאט) |
| חומרים בלוטי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 6 " מידע נוסף ". ראה גם " מידע חשוב על חילך המרכיבים של התרופה " בסעיף 2. | |

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

سرطان הכליה (Renal Cell Carcinoma)

קובומטיקס מיועדת לטיפול ייחד בסרטן הכליה מתתקדם מסווג קרצינומה:

- כקן טיפול ראשון במטופלים מבוגרים בסיכון בינוני או גבוה על פי סיווג IMDC.
- במטופלים מבוגרים אשר טיפולו בעבר במעכבי VEGF (vascular endothelial growth factor).

קובומטיקס, בשילוב עם ניבולומאב, מותווית כקו טיפול ראשון הסרטן הכליה מתתקדם מסווג קרצינומה מבוגרים.

سرطان הכלב (Hepatocellular Carcinoma)

קובומטיקס מיועדת לטיפול ייחד בסרטן הכלב מסווג קרצינומה, מבוגרים עם ליקוי בתפקוד כבד (Child-Pugh Class A) אשר טיפולו בעבר בסוראפרניב.

سرطان של בלוטת התריס (DTC)

קובומטיקס מיועדת לטיפול ייחד בחולמים מבוגרים עם קרצינומה מקומית מתקדמת או ממוקמת גורחתית של בלוטת התריס (DTC), עמידה או שאינה מתאימה לירוד רדיואקטיבי (RAI) שהתקדמה במהלך או לאחר טיפול מערכתי קודם.

קבוצה רפואיית: מעכב האנזים פרוטאין קינאז.

קובומטיקס חוסמת את פעילות החלבונים בשם קולטני טירוזין קינאז (RTKs), אשר מעורבים בגידילת תאים ובהתפתחות של כלי דם חדשים המזינים אותם. חלבונים אלו יכולים להתבטא בכמותות גבוהות בתאי סרטן ועל ידי חסימת פעילותם, קבומטיקס יכולה להאט את הקצב שבו הגדול גדול, ולסייע לנתק את אספקת הדם שהגדיל הסרטני צרי.

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (cabozantinib) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נספ").

ازהרות מיוחדת הנוגעת לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בקבומטיקס, ספר לרופא או לרוקח אם:

- אתה סובל מלחץ דם גבוה
- אתה סובל או סבלת בעבר ממפרצת (התרחבות והichלות של דופן כלי הדם) או קרע בדופן כלי הדם
- אתה סובל משלשול
- סבלת לאחרונה מדימום משמעותי
- עברת ניתוח בחודש האחרון (או אם מתוכננים ניתוחים כירוגיים), כולל ניתוח שניינים
- אתה סובל ממחלה מעי דלקתית (כגון מחלה קrhohn או קוליטיס כיבית, דלקת הסעיף (דיברטיקוליטיס) או דלקת התופסתן)
- סבלת לאחרונה מקרייש דם ברגל, שבח או התקף לב
- אתה סובל מביעות בבלוטת התannis. ספר לרופא אם אתה מתעייף יתר קלות, מרגיש באופן כללי, שקר ליר יותר מאשר לאנשים אחרים, או אם הקול שלך נהיה עמוק יותר במהלך נטילת התרופה.
- אתה סובל ממחלה כבד או כליה

בדיקות ומעקב
יש לבדוק את תפקוד בלוטות התannis לפני Nutzung קבומטיקס ובמהלך הטיפול באופן קבוע.

ספר לרופא המטפל אם אחד מאלו חלים עליו
יתכן שתצטרך טיפול עבורם, או הרופא המטפל עשוי להחליט לשנות את המינון של קבומטיקס או להפסיק את הטיפול לחלוות. ראה גם סעיף 4 "טופעות לוואי".
עליך לספר לרופא השני שאתה נוטל קבומטיקס. חשוב להזכיר לשמר על בריאות הפה במהלך הטיפול בקבומטיקס.

ילדים ומתבגרים
קבומטיקס אינה מיועדת לילדים או מתבגרים. ההשפעות של קבומטיקס באנשים מתחת לגיל 18 שנים אין ידועות.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות
אם אתה לוקחת, או אם לךחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקחת:

- תרופות המטפלות בziehomiים פטריטיים, כגון איטרkonzzol, קטוקונzzol ופואקונzzol
- תרופות המשמשות לטיפול בziehomiים חידקאים (אנטיבוטיקות) כגון אריתרומיצין, קלריטרומיצין וריפאמיצין
- תרופות לטיפול באלהרים כגון פקסופנדין
- תרופות לטיפול בתעוקת חזזה (כאב חזה כתוצאה מספקת דם שאינו עונה על דרישת הלב) כגון רנולאזין
- תרופות המשמשות לטיפול באפילפסיה או בפרכוים כגון פנטואין, קרbamזפין ופנברביטל
- תכשירים צמחיים המכילים סנט ג'ונס ורט (היפריקום פרפורטום), המשמש לעיתים לטיפול בדיכאון או במצבים הקשורים לדיכאון כגון חרדה
- תרופות המשמשות לדילול הדם, כגון וורפרין וدبיגטראן אטקסילט
- תרופות לטיפול בלחץ דם גבוה או במקרים לב אחרות, כגון אליסקiran, אמבריסנטן, דיגוקסין, טליינולול וטולבפטן
- תרופות לטיפול בסוכרת, כגון סקסגליפטין וסיטגליפטין
- תרופות המשמשות לטיפול בגאות, כגון קווליצין
- תרופות המשמשות לטיפול ב-VAO או באידס, כגון אפברינז, ריטונאביר, מרביירוק ואמטריציטבין
- תרופות המשמשות למניעת דחיה של איברים מושתלים (ציקלוספורין) ומשתרט טיפול בדלקת מפרקים שగונית ופסורייזיס המבוססים על ציקלוספורין

שימוש בתרופה ומזון

אין ליטול קבומטיקס עם מזון. אין לאכול שום דבר במהלך שעתיים לפני נטילת קבומטיקס ובמשך שעה אחת לאחר נטילת התרופה. הימנע מצריכת מוצריים המכילים אשכליות כל עוד אתה משתמש בתרופה זו, שכן הם עלולים להעלות את רמות קבומטיקס בדם.

הירין, הנקה ופוריות

יש להימנע מהיכנס להירין בעת הטיפול בקבומטיקס. אם הינך עשיריה להיכנס להירין או אם אתה מטופל ובת זוגתך עשיריה להיכנס להירין, יש להשתמש באמצעות מניעה מתאימים במהלך הטיפול ובמשך לפחות 4 חודשים לאחר שהטיפול הסתיים. יש להיעזר ברופא המטפל בגין למניעה מתאימים בזמן נטילת קבומטיקס (ראה פרק "אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות").

יש לספר לרופא המטפל אם את כניסה להירין או מתכנתת להרות או אם אתה מטופל ובת זוגתך כניסה להירין או מתכנתת להרות במהלך הטיפול בקבומטיקס.

יש **לפנות לרופא לפני נטילת קבומטיקס** אם את שוקלת או מתכנתת להיכנס להירין לאחר הטיפול הסתיים או אם אתה סימת את הטיפול ובת זוגתך שוקלת או מתכנתת להיכנס להירין. קיימת אפשרות שהטיפול בקבומטיקס ישפיע על הפוריות שלך.

על נשים הנוטלות קבומטיקס, אין להניך במהלך הטיפול ובמשך לפחות 4 חודשים לאחר הטיפול הסתיים מכיוון שקבומטיקס ו/או המטבוליטים שלו עלולים לעורר לחלב האם ולהיות מזיקים לילוד.

אם את נוטלת קבומטיקס תוך כדי שימוש בגלולות למניעת הירין, הגלולות למניעת הירין עלולות להיות לא יעילות. עליך להשתמש גם באמצעות מנעה חוץ (כגון קונדומים או דיאפרגמה) בזמן נטילת קבומטיקס ולפחות 4 חודשים לאחר הטיפול הסתיים.

נהיגה ושימוש במכוניות

יש לנתקט משינה זהירות בעת הנהיגה או שימוש במכוניות. עליך לזכור כי טיפול עם קבומטיקס עלול לגרום לך להרגיש עיף או חלש וכן יכול להשפיע על יכולת שלך לנוהג או להשתמש במכוניות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

קבומטיקס מכילה לקטוז (סוג של סוכר). אם נאמר לך על ידי הרופא המטפל כי יש לך אי סובלות לסוכרים מסוימים, עליך לפנות לרופא לפני נטילת התרופה.

קבומטיקס מכילה נתרן

תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג סודיום בטבלייה, כך שלמעשה התרופה נחשבת כ"נטולת נתרן".

3. כיצד להשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקביל בדרך כלל הוא 60 מ"ג פעם אחת ביום. עם זאת, הרופא המטפל יחליט מהו המינון הנכון עבורך.

במתקן קבומטיקס בשילוב עם ניבולומאב לטיפול בסרטן כליה מתקדם, המינון המומלץ של קבומטיקס הינו 40 מ"ג פעם ביום.

עליך להמשיך ליטול תרופה זו עד שהרופא מחייב להפסיק את הטיפול. אם אתה חווית תופעות לוואי חמורות,.ITICK שהרופא יחייב לשנות את המינון או להפסיק את הטיפול מוקדם מהמתוכן. הרופא ינחה אותך אם תידרש לההתאמת מינון.

צורת הנטילה:

יש לבלוע את הטבלייה בשלהמזהה עם כוס מלאה של מים. אין מידע לגבי ריסוק או חצייה של הטבלייה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד מלבד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה אליו.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם המנה הבאה שלאחר הינה בעוד 12 שעות או יותר, עליך להשלים את המנה שנשכחה בהקדם האפשרי.

אם המנה הבאה שלאחר הינה בעוד פחות מ-12 שעות, אין ליטול את המנה שנשכחה. עליך ליטול את mana הבאה בזמן הרגיל.

אם אתה מפסיק את השימוש בתרופה

הפסקת הטיפול עלולה להפסיק את השפעת התרופה. אין להפסיק את השימוש בקברומטיקס ללא הייעוץ ברופא.

בממן קברומטיקס בשילוב עם ניבולומאב, אתה קודם כל תקבל ניבולומאב ולאחר מכן קברומטיקס.

יש לעין בעלון לצריך של ניבולומאב על מנת להבין את אופן השימוש בתרופה. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לאופן השימוש בתרופה, פנה לרופא.

אין ליטול תרופות בחושרי! בדוק התוויות והמנה בכל פעע שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי.

כמו בכל תרופה, השימוש בקברומטיקס עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשיימת תופעות הלואו. יתכן שלא תסבול מ一封 אחת מהן. אם אתה חווית תופעות לוואי, יתכן שהרופא ינוח אותך ליטול קברומטיקס במינון נמוך יותר. כמו כן, יתכן שהרופא ירשום לך תרופות אחרות כדי לסייע בשליטה על התופעות הלואו.

פנה מיד לרופא אם אתה מביח באחת מתופעות הלואו הבאות – יתכן שתזדקק לטיפול רפואי דחוף:

- **תסמינים הכלוליםocab בבטן, בחילה, הקאה, עצירות או חום. אלו עלולים להיות סימנים של נקב במערכת העיכול – חור שמתפתח בקיבה או בעור שעלול להיות מסכן חיים.**
- **דימום חמוץ או בלתי נשלט עם תסמינים כגון הקאת דם, צואה שחורה, שתן דמי,ocab כאב ראש, שיעול דמי.**
- **נפיחות, או קוצר נשימה.**
- **פצע שאינו נרפא.**
- **פרכוסים,ocab כאבי ראש,בלבול או קושי להתרכז. אלו עלולים להיות סימנים של מצב הנקרא תסמנת anzephalopatiyah אחוריית הפיכה (PRES - posterior reversible encephalopathy syndrome). מצב זה הינו נדיר (משפיע על פחות מ-1 מתוך 1,000 משתמשים).**
- **כאב בפה, בשיניים ואו בלסת, נפיחות או פצעים בתווך הפה, חוסר תחושה או תחושת כבדות בלסת, או התרופופת של השיניים. אלו יכולים להיות סימנים של נזק לעצם בלסת (איסוטאונקרוזיס).**

תופעות לוואי נוספת של קברומטיקס בטיפול יחיד

טופעות לוואי שכיחות מודר (עלולות להופיע על יותר משמש אחד מעשרה)

- **אנמיה (רמות נמוכות של תא דם אדום) ורמות נמוכות של טסיות פועלות מופחתת של בלוטת התריס; התסמינים עלולים לכלול עייפות, עליה במשקל, עצירות, תחושת קור ועור יבש**
- **תיאבן מופחת, שינוי בחוש הטעם רמות נמוכות של מגנזיום או אשלגן בדם**
- **רמות נמוכות של אלבומין בדם (אשר נשא חומרים כמו הורמוניים, תרופות ואנדזימים ברחבי גוף)**
- **כאב ראש וחרחורת**
- **יתר לחץ דם (לחץ דם גבוה)**
- **דימום**

- קושי בדיבור, צרידות, שיעול וקוצר נשימה
- אודם, נפיחות או כאב בפה או בגין פריחה על העור לעתים עם שלפוחיות, גירוד, כאב של הידיים או תחתית כפות הרגליים, פריחה הפרעתה בקיבה כולל שלשול, בחילה, הקאה, עצירות, קשיי עיכול וכאב בטן
- כאב בזרועות, בידים, ברגליים או כפות הרגליים
- תחושת עייפות או חולשה, דלקת ברירית הפה והעיכול, נפיחות ברגליים ובזרועות
- רידיה במשקל
- בדיקות תפקודי כבד לא תקיןות (כמויות מוגברות של אנזימי הכבד אספרטאט אמינוטרנספרاز, אלנין אמינוטרנספרاز)

תופעות לוואי שכיחות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10 משתמשים)

- מורסה (הצטברות מוגלה, עם נפיחות ודלקת)
- התיבשות
- קושי בבליעה
- אצלולים באוזניים (טינטו)
- קריישי דם בכלי הדם
- קריישי דם ברייאות
- רמות נמוכות של תא דם לבנים
- רמות סוכר גבוהות (היפרגליקמיה) או נמוכות (היפוגליקמיה) בدم
- רידיה ברמות של סידן, נתרן וזרחן בדם
- עלייה ברמות של אשלגן בדם
- עלייה ברמות של בילירובין בדם (אשר עלולה לגרום לצהבת/עור או עיניים צהובות)
- דלקת של העצבים (గורמת לחוסר תחושה, חולשה, עקצוץ או כאב צורב בזרועות וברגליים)
- עלייה ברמות עמילאץ בדם
- עלייה ברמות ליפאץ בדם
- עלייה ברמות כולסטרול או טריגליקרידים בדם
- חוסר תחושה, עקצוץ, תחושת צריבה או כאב בגפיים
- דלקת בלבל
- קרע כואב או חיבור לא תקין של הרקמות בגוף (פיסטולה)
- מחלת ההחזר הקיבתי ושתן (עליה של חומצת הקיבה)
- טחרורים
- פה יבש וכואב בפה
- עור יבש, גירוד חמוץ של העור, אקנה
- עיבוי שכבת העור החיצונית
- התקרכחות (נשירה ודילול השיער), שינוי בצבע השיער, אדרומותיות בעור
- כאב במפרקים, עוינותות שרירים
- חלבון בשתן (נראה בבדיקות)
- קושי בבליעה
- בדיקות תפקודי כבד לא תקיןות (כמויות מוגברות של אנזימי הכבדALK-לינן פוספטאז ומא-גלוטמילטרנספרاز בדם)
- בדיקות תפקודי כלות לא תקיןות (כמויות מוגברות של קרייאטינין בדם)

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות להשפיע על 1 מתוך 100 משתמשים)

- שבח
- התקף אפילפסטי
- יתר לחץ דם חמוץ
- קריישי דם בעורקים
- הפחתה בזרימת המרה מהכבד
- תחושת צריבה או עקצוץ בלשון
- התקף לב
- קרייסט ריאה עם אויר כלוא בשלל שבין הריאה לחזה, לעיתים קרובות גורמת לקוצר נשימה (חזה אויר)

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה)

- התרחבות והחלשות של דופן כלי דם או קרע בדופן כלי דם (מפרצות וביתור עורק)
- דלקת של כלי הדם בעור

תופעות הלואאי הבאות דווחו **בעור השילוב של קבומטיקס יחד עם ניבולומאב:**

תופעות לוואי שכיחות מודרן (עלולות להשפיע על יותר משתמש אחד מעשרה)

- זיהומיים של דרכי הנשימה העליונות
- פעילות מוגברת של בלוטת התannis; התסמים עשויים לכלול עייפות, עליה במשקל, עצירות, תחושת קור ועור יבש
- פעילות מוגברת של בלוטת התannis; התסמים עשויים לכלול קצב לב מהיר, הצעה ורידת במשקל
- תיאבן ירוד, שינויים בחושطعم
- כאב ראש, סחרחות
- לחץ דם גבוה
- קושי בדיבור, צידדות, שיעול וקוצר נשימה
- קלקלול קיבה, כולל שלשול, בחילה, הקאה, קשיי עיכול, כאב בטן ועצירות
- אודם, נפיחות או כאב בפה או בגרון (דלקת בריריות הפה)
- פריחה עורית לעיתים עם שלפוחיות, גרד, כאב של הידיים או תחתית כפות הרגליים, פריחה או גירוד חמור
- כאבי מפרקים (ארתראגליה), עוויתות שרירים, חולשת שרירים וכאבי שרירים
- חלבון בשתן (נראה בבדיקות)
- תחושת עייפות או חולשה, חום ובצקת (ນפיחות)

תופעות לוואי שכיחות (עלולות להשפיע על עד 1 מתוך 10 משתמשים)

- זיהום ריאה חמוץ (דלקת ריאות)
- עליה בכמות תא דם לבנים מסוימים הנקראים אוזינופיליים
- תגובה אלרגית (כולל תגובה אנפילקטית)
- הפרשה מוגברת של הורמוני המיצרים על ידי בלוטות האדרנל (בלוטות הנמצאות מעל הכליות)
- התיבשות
- דלקת של העצבים (גורמת לחוסר תחושה, חולשה, עקצוץ או כאב צורב בזרועות וברגליים)
- צלצלים באוזניים (טינטון)
- עיניים יבשות וראייה מוטושתת
- Shininess במהירות או בקצב פעימות הלב, קצב לב מהיר
- קרייש דם בכלי הדם
- דימום מהף
- דלקת המעי הגס (קוליטיס), יובש בפה, כאב בפה, דלקת של הקיבה (גסטראיטיס) ותחורים
- דלקת של הכבד (הפטיטיס)
- יובש בעור ואדמנויות
- אלופסיה (הידלות ונשירת השיער), שינוי בצבע השיער
- דלקת מפרקים (ארטראיטיס)
- כשל כלייתי (כולל אובדן פתאומי בתפקוד הכליה)
- כאב, כאב חזה

תופעות לוואי שאינן שכיחות (עלולות להשפיע על 1 מתוך 100 משתמשים)

- תגובה אלרגיות הקשורות לעורי התרפיה ניבולומאב
- דלקת של בלוטת יותרת המוח הנמצאת בסיס המוח (היפופיזיטיס), נפיחות של בלוטת התירואיד (тирואידיטיס).
- דלקת זמנית של העצבים הגורמת לכאב, חולשה ושיתוק בגפיים (תסמונת גיליאן-ברה); חולשה ועייפות של שרירים ללא ניון (תסמונת מיאסטנית)
- דלקת של המוח

- דלקת של העין (הגורמת לכאוב ואודם)
 - דלקת של שריר הלב
 - דלקת של הלבלב (פנקריאטיטיס), ניקוב המעי, תחושת כאב או צריבה בלשון
 - מחלת עור עם טלאים עבים של עור אדום, בדרך כלל מלאה בקשישים כסופים (פסוריאזיס)
 - סרפפת (פריחה מוגדרת)
 - רגשות וחולשה בשירים אשר לא נגרמה על ידי פעילות גופנית (מיופתיה), נזק לעצם בלסת, קרע כאב או חיבור לא תקין של הרקמות בגוף (פייסטולה)
 - דלקת בכלייה
 - קרייסת ריאה עם אויר כלוא בחלל שבין הריאה לחזה, לעיתים קרובות גורמת לקוצר נשימה (חזה אויר)
- תופעות לוואי ששייכותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה)**
- דלקת של כלי הדם בעור

שינויים בתוצאות בדיקות:

קובומטיקס לבודו והשילוב של קובומטיקס יחד עם ניבולומאב עלול לגרום לשינויים בתוצאות הבדיקות שיבצע הרופא.

אלו כוללות:

- בדיקות תפוקדי כבד חריגות (כמויות מוגברות של אנצימי הכלב אספרטאט אמינוטרנספרاز, אלנין אמינוטרנספרاز אוALK-LIN פוספטאז בدم, רמות גבוהות יותר של תוצרי הפסולתobilobin).
- בדיקות תפוקדי כליה חריגות (כמויות מוגברות של קרייאטינין בדם)
- רמות גבוהות (היפרגליקמיה) או נמוכות (היפוגליקמיה) בדם
- אנמיה (ירידה במספר תאי הדם האדומים המוביילים חמוץ), ירידה במספר תאי הדם הלבנים (החשובים במלחמה בזיהום), ירידה במספר טסיות הדם (תאים המסייעים לكريשת הדם)
- רמה מוגברת של האנזים המפרק שומנים (ליפאץ) ושל האנזים המפרק עמילן (עמילאצ)
- ירידה ברמות הפווספט
- עלייה או ירידה בכמות של סידן או אשלגן
- ירידה ברמות של מגנזיום או נתרן בדם
- עלייה במשקל הגוף
- עלייה ברמות הטריאג'יצידים בדם
- עלייה ברמות הקולסטROL בדם

קובומטיקס לבודה עלולה לגרום לשינויים בתוצאות הבדיקות שבוצעו על ידי הרופא שלך. אלו כוללים:

- כמויות מוגברות של האנזים גמא-אלטומיל טרנספרاز
- ירידה בכמות חלבון אלבומין בדם (הנושא חומרים כמו הורמוניים, תרופות ואנזימים בכל הגוף)

קובומטיקס בשילוב עם ניבולומאב עלולה לגרום לשינויים בתוצאות הבדיקות שבוצעו על ידי הרופא שלך.

אלו כוללים:

- רמות מוגברות של מגנזיום או נתרן בדם

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחייבת או מאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי". שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המופיע <https://sideeffects.health.gov.il> לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלת תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מוחז להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (date. exp) המופיע על גבי תווית הבקבוק ואריזת הקרטון. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן באזזה המקורית. אין להוציא את 3 לוכדי הלחות מהבקבוק.

תנאי אחסון

יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל-25°C.

אין להשאיר תרופות לכיר או לפח האשפה הביתי. שאל את הרוקח כיצד להיפטר מתרופות שאין משתמש בהן עוד. צעדים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:
תוכן הטבליה:

Microcrystalline cellulose, lactose anhydrous, croscarmellose sodium, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide (anhydrous)

ציפוי:

Opadry® yellow components: hypromellose (HPMC) 2910, titanium dioxide (E171), triacetin, iron oxide yellow

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזשה

קברומטייקס 20 מ"ג

טבליות מצופות עגולות, בצבע צהוב, ללא קו חציה, עם סימון של "LA" על צידן אחד ו-"20" על צידן השני.

קברומטייקס 40 מ"ג

טבליות מצופות בצורת משולש, בצבע צהוב, ללא קו חציה, עם סימון של "LA" על צידן אחד ו-"40" על צידן השני.

קברומטייקס 60 מ"ג

טבליות מצופות בצורת אליפסה, בצבע צהוב, ללא קו חציה, עם סימון של "LA" על צידן אחד ו-"60" על צידן השני.

טבליות קברומטייקס ארוזות בבקבוק פלסטי עם פקק העמיד לפתיחה על ידי ילדים. הבקבוק מכיל 30 טבליות מצופות, ו-3 סופחי לחות מסוג סיליקה ג'ל וסוליל פוליאסטר למניעת נזק לטבליות המצופות. שומר את סופחי הלחות ואת סליל הפוליאסטר בבקבוק ועל TABLEAU אוטם.

בעל הרישום וכותבו

מדיסון פארמה בע"מ, רח' השילוח 10 ת.ד. 7090, פתח תקווה

שם היצרן וכותבו

Ipsen Pharma, 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt, France

נערך בינואר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות

קברומטייקס 20 מ"ג: 160-99-35263-00

קברומטייקס 40 מ"ג: 161-01-35264-00

קברומטייקס 60 מ"ג: 161-02-35265-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.