

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיירם) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

המנגיול תמיישה לבליעה

חומר פעיל: החומר הפעיל הוא פרופראנולול (Propranolol) (אואואנוול). כל מ"ל של תמיישה מכיל 3.75 מ"ג פרופראנולול (אקוואולנט ל- 4.28 מ"ג פרופראנולול הידרוכלוריד).

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר : ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם **תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו גרשמה עבור ידך בלבד. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

בנוסף לעalon זה, לתרופה המנגיאול קיימת חוברת מידע להורי המטופל. חוברת זו מכילה מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בהמנגיול ולפעול על פיו. יש לעיין בחוברת המידע להורי המטופל ובullen לצריכן בטרם תחילת השימוש בתרופה. יש לשמר את חוברת המידע לעיון נוסף במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול בהמנגיומה משגחתת בגיל הינקות אשר דורשת טיפול מערכתי:.

- המנגיאומה מסכנת חיים או תפוקוד.
- המנגיאומה כיבית עם כאב ו/או חוסר תגובה לאמצעי טיפול פשוטים בפצע.
- המנגיאומה עם סיכון להצטלקות או עיוותים קבועים.

יש להתחיל את הטיפול בהמנגיול בפעוטות בגיל 5 שבועות עד 5 חודשים.

המנגיומה הינה צבר של כלי דם עודפים אשר יוצרים גוש בעור או מתחתיו. המנגיאומה יכולה להיות שטחית או عمוקה. לעיתים היא נקראת "סימן תות" כי פני השטח שלה מצכירים במראה צורת תות.

קבוצה רפואיית:

החומר הפעיל פרופראנולול משתייך לקבוצת תרופות היידועה כחויסמי בטא.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- ילדר נולד פג ולא הגיע לגיל המתוון של 5 שבועות (הגיל המתוון מתייחס לגיל שתינוק פג אמור להיות בו אם היה נולד בתאריך הלידה המשוער שלו).
- ילדר רגש (אלרגי) לחומר הפעיל פרופראנולול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוספת" בעلون זה). תגובה אלרגית עלולה לכלול פריחה בעור, גירוד או קוצר נשימה.
- ילדר יש אסתמה או היסטורי של קשיי נשימה.
- ילדר יש קצב לב נמוך עבור גילו. פנה לרופא אם אין בוטוח.
- ילדר יש בעיהقلب (כגון הפרעות בקצב הלב או אי ספיקת לב).
- ילדר יש לחץ דם נמוך מאוד.
- ילדר יש בעיה במחזור הדם הגורמת לכך שהאצבעות והבהונות חסרות תחושה וחיוורות.
- ילדר נתיה לרמת סוכר נמוכה בדם.
- ילדר יש לחץ דם גבוה כתוצאה מגידול בבלוטת יותרת הכליה (הأدרכן). גידול זה נקרא פאוכרומוציטומה (phaeochromocytoma).
- אין לתת תרופה זו לילדר אם הנר מניקה ואת נוטלת תרופות שאסורה לשימוש יחד עם המנגיאול (ראי סעיף "הנקה" וסעיף "אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות").**

اذהרויות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני מתן המנגיאול לילדך, ספר לרופא אם:

- יליך יש בעיות בכבד או בצליות. תרופה זו אינה מומלצת במקרה של בעיות בכבד או בצליות.
- יליך הייתה בעבר תגoba אלרגית, לא משנה מה מקורה (למשל מתרופות או מרכיב תזונתי וכו'). תגoba אלרגית עלולה לכלול פריחה, גרד או קוצר נשימה.
- יליך סובל מספחת (פסוראייזס) [מחלת עור הגורמת להיווצרות פלאקים (רבדים) אדומים ויבשים של עור מעובה], שכן תרופה זו עלולה להחמיר את התסמינים של המחלת הזו.
- יליך סובל מסוכרת: במקרה זה יש לנטר את רמת הסוכר בدم שלו לעתים קרובות יותר.
- יליך סובל מתסומנות PHACE (מצב המשלב המנגיאול עם הפרעות בכלי הדם כולל כלי דם במוח), שכן תרופה זו עלולה להגבר את הסיכון לשbez מוחי.

סימנים שחייבים לשים לב אליום לאחר מתן המנגיאול לילדך.

- סיכון לרמת סוכר נמוכה בدم (היפוגליקמיה)

- תרופה זו עלולה לגרום סימני אזהרה של היפוגליקמיה (הידועה גם כרמת סוכר נמוכה בدم). התרופה עלולה גם להחריף היפוגליקמיה בילדים, במיוחד בזמן צום (לדוגמא: אכילה מועטה, דיאתoms במקביל, הקאות) או כאשר הדרישות לאלקוז עלות (קור, לחץ, דיאתומים) או במקרה של מנת יתר. סימני האזהרה עלולים להיות:
- מתוניים(מינורי): חירוץ, עייפות, הדעה, רעד, דפוקות לב (פלפיטציות), חרדה, רעב, קושי בתתעוררויות.
 - חמוריים(מג'ורי): יותר שינה מהרגיל, קושי בתגובה, אכילה מועטה, ירידת בטמפרטורת הגוף, פרכוסים, הפסיקות נשימה קצרות, איבוד הכרה.
- הסיכון להיפוגליקמיה נשאר ממשמעו לארוך כל תקופת הטיפול בתרופה.

בכדי להימנע מסיכון של רמת סוכר נמוכה בدم(היפוגליקמיה), עליך לתת לילדך המנגיאול במהלך הארוחה או מיד אחריה ולהימנע מלתת את המנה האחזרונה בסמוך לשיננת הלילה (ראה סעיף 3). יש להאכיל את הילד במידה מספקת ובאופן סדרי במשך הטיפול. אם יליך אינו אוכל מספיק או שהוא מקיין, מומלץ לדלג על המנה. אין לתת המנגיאול לילדך עד אשר הוא שב לאכול באופן תקין.

אם יליך מראה סימנים כלשהם של רמת סוכר נמוכה בدم(היפוגליקמיה) בזמן נתילת המנגיאול, הפסיק את הטיפול וצור קשר מיידי עם רופא או פנה לבית חולים. אם הילד בהכרה, יש לתת לו משקה נוזלי המכיל סוכר.

- סיכון לעויתת הסימפונות (ברונכוספזם)

יש להפסיק את הטיפול וליצור קשר מיידי עם רופא אם לאחר מתן המנגיאול לילדך אתה מביחס באחד מהتسمיניות הבאים, שעלוים להיעיד עלעויתת הסימפונות (קשיי נשימה בשל היצרות זמנית של דרכי האויר בריאות): שיעול, נשימה מואצת או קושי בנשימה או צפוצים עם או ללא עור בגון כחלחל.

הפסיק את הטיפול וצור קשר מיידי עם רופא אם יליך מראה תסמינים של הצטננות המלוים בקשיי נשימה ו/או צפוצים במהלך הטיפול בהמנגיאול.

- סיכון לחץ דם נמוך וקצב לב איטי (ברדייקרדיה)

המנגיאול עלולה לגרום לירידה בחץ הדם ובקצב הלב(ברדייקרדיה), לכן על יליך להיות במעקב רפואי צמוד וניטור קצב הלב שעתים לאחר מתן המנה הראשונה או לאחר העלאת מנת התרופה. לאחר מכן, על הרופא לבדוק את הילד במהלך הטיפול באופן קבוע.

הפסיק את הטיפול בתרופה וצור קשר מיידי עם רופא אם יליך מראה סימני עייפות, תחושים

קור, חיורון, עור בגוון כחלחל או עילפון בתקופת השימוש המנגיאול.

- **סיכון לרמת אשגן גבוהה בدم (היפרקלמיה)**

המנגיאול עלולה להגבר את רמת האשגן בדם (היפרקלמיה). במקרה של המנגיאומה כיבית גדולה יש לנטר את רמת האשגן בדם של ילדר.

אם ילדר מתוכנן לעבר הרדמה כללית

עליך לומר לרופא שילדר מקבל המנגיאול. זאת מכיוון שילדר עלול לסבול מלחץ דם נזוק אם תינטעתו לו תרופות מרדיימות מסוימות בזמן נתילת תרופה זו (ראה סעיף "אינטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות"). יתכן שהייה נדרש להפסיק ליטול המנגיאול לפחות 48 שעות לפני הבדיקה.

בדיקות ומעקב

אם יש לילדר סוכרת, יש לנטר את רמת הסוכר בדם שלו לעתים קרובות יותר (ראה "ازהירות מיוחדת הנוגעת לשימוש בתרופה").

המנגיאול עלולה לגרום לירידה בלחץ הדם ובקצב הלב, لكن על ילדר להיות במעקב קליני צמוד עם ניתוח קצב הלב שנתיים לאחר מתן המנה הראשונה או לאחר העלאת מינון התרופה. לאחר מכן, על הרופא לבדוק את הילד במהלך הטיפול באופן קבוע (ראה "סימנים חשובים לב אליהם לאחר מתן המנגיאול לילדך").

המנגיאול עלולה להגבר את רמת האשגן בדם. במקרה של המנגיאומה כיבית גדולה יש לנטר את רמת האשגן בדם של ילדר (ראה "סימנים חשובים לב אליהם לאחר מתן המנגיאול לילדך").

אינטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות

אם ילדר לוקח או לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולן תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופאו או לרוקח. זאת ממשום שהמנגיאול עלולה לשנות את דרך הפעולה של תרופות אחרות וייתכן שלתרופות אחרות תהיה השפעה על האופן בו המנגיאול פועל. אם הנך מניקה את ילדר, חשוב לעדכן את הרופא או הרוקח או הצוות הרפואי אם את נוטלת תרופה כלשהי, שכן התרופה עלולה לעבר דרכן לחבל האם ולהשפיע על הטיפול של הילד. הרופא ייעץ לך האם עלייך להפסיק הנקה או לא.

ספר/י לרופא או לרוקח אם ילדר לוקח או אם את מניקה ולוקחת:

- תרופות לטיפול בסוכרת.
- תרופות עבר בעיותقلب או בכלי הדם, כגון הפרעות בקצב הלב, כאב בחזה או תעוקת חזזה (אנגינה), לחץ דם גבוה, אי ספיקת לב.
- תרופות לטיפול בחרדה ובדיכאון, כמו גם תרופות בעיות נפשיות חמורות יותר ואפילפסיה.
- תרופות לטיפול בשחפת.
- תרופות לטיפול בכאב ובדלקת.
- תרופות להורדת רמת השומנינים בדם.
- תרופות להרדמה.

אם יש לך שאלות נוספת נועז להיעזר ברופא שלך או ברוקח.

שימוש בתרופה ומזהן

יש לתת את התרופה מיד לאחר האכלה הילד או במהלך האכלתו.

הנקה

אם הנך מניקה את ילדר

- ספרי לרופא טרם נתינת תרופה זו לילדך.
- אל תתני תרופה זו לילדך אם את נוטלת תרופות שאסורה לשימוש עם המנגיאול (ראי סעיף "אינטראקטיות/תגובהות בין תרופתיות").

התרופה מכילה פחתות מ- 1 מילימול (23 מ"ג) נתרן למנה (למענה "נטולת נתרן"). התרופה מכילה 2.08 מ"ג של פרופילן גליקול/ kg /יום. אם תינוק בגיל הקטן מ- 4 שבועות, היועץ ברופא או ברוקח לפני מתן תרופה זו, ביחוד אם התינוק נוטל תרופות נוספות פרופילן גליקול או אלכוהול.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

הטיפול בילדך הוא בהתאם להמלצת רופא בעל מומחיות באבחון ובטיפול בהמנגיים בגיל הינקות. יש לשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. **עלולים אל תנסה את המינון שניתן לילדך על דעת עצמן. כל עלייה במנה או התאמת מנה בהתאם למשקל של תינוק חייבים להיעשות על ידי הרופא המטפל בלבד.**

• מינון:

המינון יקבע בהתאם למשקל תינוק, לפי משטר המינון הבא:

שבועות (מנה יומית)	מנה לבליה	זמן המנות
שבוע ראשון (1 מ"ג/ kg /יום)	0.5 מ"ג/ kg /ג	מנה אחת בבוקר
שבוע שני (2 מ"ג/ kg /יום)	1 מ"ג/ kg /ג	מנה נוספת בשעות אחר הצהרים המאוחרות במרווח של לפחות 9 שעות בין 2 המנות
(3 מ"ג/ kg /יום)	1.5 מ"ג/ kg /ג	שבוע שלישי והשבועות שלאחריו

אם יש צורך, ניתן לערבות את התרופה עם **כמות קטנה** של חלב המיועד לתינוקות או מיץ תפוחי עץ /או מיץ תפוזים המתאים לגילו, ולתת את התרופה לילדך מבקבוק לתינוקות. אין לערבות את התרופה עם בקבוק מלא של חלב או מיץ פירות. לילדים שמשקלם עד 5 ק"ג ניתן לערבות את המנה עם כפית אחת (בערך 5 מ"ל) של חלב המיועד לתינוקות. לילדים שמשקלם מעל 5 ק"ג ניתן לערבות את המנה עם כף אחת (בערך 15 מ"ל) של חלב המיועד לתינוקות או מיץ תפוחי עץ או מיץ תפוזים המתאים לגיל הילד. יש לשתמש בתערובת עד שעתיים מהכנה.

אין לעbor על המנה המומלצת.

• איך לחתת המנגיאול לילדך:

המנגיאול מיועד לבליה בלבד.

- יש לחתת את התרופה מיד לאחר האכלת הילד או במהלך האכלתו.
- עליך תמיד למדוד את המנה על ידי שימוש במזרק למtanן דרך הפה המסופק יחד עם הבקבוק. ואין להחליפו עם אף מזרק אחר. אם איבדת את המזרק צור קשר עם בעל הרישום.
- יש לחתת את ההמנגיאול ישירות לפה של הילד בעזרת המזרק למtanן דרך הפה שסופק עם הבקבוק..
- האכל את הילד באופן קבוע בכדי להימנע מצום ממושך.
- אם הילד לא אוכל במידה מסוימת או שהוא מקיא, יש לדלג על המנה.
- אם הילד ירק את המנה או שאתה לא בטוח אם קיבל את המנה בשלמותה, אין לחתת מנה נוספת, יש לחכות עד שיגיע מועד מתן המנה הבא.

- מתן המנגיול והאכלה הילד צרכים להיעשות על ידי אותו אדם בכדי להימנע מהסיכון של רמת סוכר נמוכה בدمו לילדך (היפוגליקמיה). במידה שאנשים שונים מעורבים בטיפול הילד, חיוני שתהיה תקשורת טובה בין המעורבים על מנת להבטיח את בטיחות הילד.

הוראות שימוש:

שלב 1 - הוצאה את הפריטים מהקופסא

ה קופסא מכילה את הפריטים הבאים להם TZDKK למתן התרופה:


1. בקבוק זכוכית המכיל 120 מ"ל של תמייסה לבליה של המנגיול.

2. מזרק מדידה למtanן דרך הפה, המסתמן בשנותות של מיליגרמים, המצויר לתרופה זו. יש להוציא מהקופסא את הבקבוק ואת המזרק למtanן דרך הפה, ויש להוציא את המזרק משקית הפלסטיין.



שלב 2 - בדוק את המנה

בדוק מהי מנת המנגיול במיליגרמים (מ"ג) כפי שרשם אותה הרופא של ילך. מצא את המספר זהה על המזרק למtanן דרך הפה.




ו. שלב 3 - פותח את הבקבוק

לבקבוק יש מכסה בטיחות העמיד בפני פתיחה של ילדים. יש לפתח את הבקבוק באופן הבא: יש ללחוץ על מכסה הפלסטיκ כלפי מטה תוך כדי סיבובו נגד כיוון השעון (לכיוון שמאל). אין לנער את הבקבוק לפני השימוש.




ו. שלב 4 - הכנס את המזרק

הכנס את קצה המזרק למடן לתוך בקבוק העומד אנכית ולחץ את בוכנת המזרק כלפי מטה עד הסוף. אין להסיר את מתאם המזרק (syringe adapter) מצוואר הבקבוק. למדידה ומתן המנה יש להשתמש ארוך ורך במזרק למtan דרך הפה המצויר לתרופה. אין להשתמש בכף או בכל מכשיר מדידה אחר.



ו. שלב 5 - הוציא את המנה


הפוך את הבקבוק כשהמזרק למtan דרך הפה נשר במקומו. משור את בוכנת המזרק עד לסימון מספר המיליגרים להם אתה זקוק.




ו. **שלב 6 - בדוק הימצאות בועות אויר**
 אם הנר רואה בועות אויר בمزרק, החזק את המזרק באופן אנכי, דחוף את הבוכנה כלפי מעלה עד למצב של בועות האוויר הגדלות יצאו החוצה ואז כוון מחדש את המנה אשר נרשמה על ידי הרופא לידך.



ו. **שלב 7 - הוצאה המזרק**
 הפוך את הבקבוק למצב אנכי והוציא את כל המזרק מתוכו הבקבוק. יש להיזהר לא לדחוף את הבוכנה פנימה במהלך שלב זה.




ו. **שלב 8 - סגור את הבקבוק**
 החזר את פקק הפלסטיิก למקומו על הבקבוק על ידי סיבובו בכיוון השעון (לכיוון ימין).



◦ **שלב 9 - תן המנגנון לילדך**


הכנס את המזרק לפיו של תינוקך והצמד אותו כנגד הצד הפנימי של הלחי. כעת אתה יכול להזילף לאט את המנגנון מהמזרק ישירות לתוך הפה של תינוקך. אין להשיכיב את התינוק מיד לאחר מתן התרופה.



◦ **שלב 10 - נקה את המזרק**

אין לפרק את המזרק. שטוף את המזרק הריק לאחר כל שימוש לתוך כוס של מים נקיים:

1. קח כוס של מים נקיים
2. משור את הבוכנה
3. שפוך את המים לכירור
4. חזר על פועלות ניקוי זו 3 פעמים



אל תשתמש בסבון כלשהו או בתכשיר מבוסס אלכוהול לניקוי. נגב את החלק החיצוני עד יבשו. אל תשים את המזרק במכשיר לחיטוי (סטריליזטור) או במדיח כלים. אחסן את הקבוק והמזרק ייחדיו באrizת התרופה במקום בטוח שילדר לא יוכל לראותה או להגיע אליה, עד השימוש הבא. לאחר סיום הקבוק זורק את המזרק.

אם נתת לילדך בטיעות מינון גבוהה יותר מהנדרש של התרופה היועץ ברופא מיד או פנה לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת לחתת את התרופה לילדך

דילג על המנה שנשכחה ואל תיתןמנה כפולת כדי לפצות על המנה שנשכחה. המשך בטיפול במידירות הקבועה: מנה אחת בבוקר ומנה אחת בשעות אחר הצהריים המאוחרות. יש להתמיד

בטיפול כFI שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק לתת את התוropa לילדי

ניתן להפסיק את המtan של התוropa בביטחון אחת בתום הטיפול, לפי החלטת הרופא.

- אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוoya והמנה **בכל פעם** שהן נוטל תרוoya. הרכב משקפיים אם הנר זוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתוoya, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרוoya, השימוש בהמג'יול עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואוי. יתכן שילדך לא יסבול מכך אחד מהם. לאחר מתן המג'יול יש לשים לב לסייעו אזהרה חשובים הקשורים לתופעות הלואוי האפשריות הבאות: לחץ דם נמוך, קצב לב איטי, רמת סוכר נמוכה בدم ועווית בסימפוניות (ברונכוספזם, קשי נשימה). ראה סעיף 2 בעלון זה.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שימושיות ביותר משתמש אחד מעשרה):

- דלקת בסימפוניות (ברונכיטיס)
- הפרעותamina (נדודיamina, איכות ירודה של השינה וקשיים בהתעוררויות)
- שלשול והקאה

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שימושיות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- עוויתת סימפוניות - ברונכוספזם (קשי נשימה)
- דלקת סימפוניות (ברונכיאוליטיס) - דלקת של הסימפוניות (דרכי הנשימה) הקטנות בראיות, כולל קשי נשימה וצפצופים בחזה, המלווה בשיעול וחום
- ירידה בלחץ הדם
- ירידה בתאIRON
- עצבנות(אגיטציה), סיגרים, רגונות
- ישנוניות
- גפיים קרות
- עצירות, כאב בטן
- אודם בעור
- תפרחת חיתולים

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שימושיות ב-1-1,000 משתמשים מתוך 1,000):

- הפרעות בהולכת הלב או בקצב הלב (פעימות לב איטיות או לא סדירות)
- סרפדת (אורטיקרייה - תגובה אלרגית בעור), נשירת שיעור (אלופסיה)
- ירידה ברמות הסוכר בדם
- ירידה בכמות תא הדם הלבנים

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה(תופעות שכיחותן טרם נקבעה)

- פרכסים המקשרים לרמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה)
- ברדיקרדייה (קצב לב איטי מהרגיל)
- לחץ דם נמוך
- רמת נמוכות מאוד של תא דם לבנים נוגדי דיאטום
- בעיות במבחן הדם שగורמות לחיוורון וחוסר תחושה באצלבות ולבבון
- עליה ברמת האשلغן בדם

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מטופעות הלואוי חמלה או כאשר ילדי סובל מטופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לבדוק על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקורי לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

בנוסף, ניתן לבדוק לחברת פאדגיס באמצעות הכתובת הבאה: Padagis.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תכשיר זה וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזזה ותוויות הבקבוק. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

- יש לאחסן מתחת ל- C° 25. אין להקפיא. יש לאחסן את הבקבוק באזזה המקורי על מנת להגן מפני אור.
- יש לאחסן את הבקבוק והזרקן בדרך הפה יחד באזזה המקורי בין שימוש לשימוש.
- לאחר הפתיחה הראשונה: ניתן להשתמש במשך חודשים, אך לא יותר מאשר מתאריך התפוגה.
- יש לאחסן מתחת ל- C° 25.
- אין להשליך תרופות לביב או לאשפפה הביתית. התיעץ עם הרוקח כיצד להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. נקיית אמצעים אלו תעוזר לשמר על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Hydroxyethylcellulose(250 grade), Vanilla flavour (IFF*SC011851)[contains Propylene glycol 75.2%, Vanillin, Water, Butyric acid, Ethyl butyrate, Piperonal], Saccharin sodium, Strawberry flavour (IFF*SN864761)[contains Propylene glycol 92%, Ethyl butyrate, Vanillin, Undecalactone/Gamma, Ethyl acetate, Ethyl propionate, Maltol, Hydroxy-2-5-dimethyl-3(2h)-furanone/4-, Hexyl alcohol, Hexen-1-Ol/Cis-3, Linalool, Isoamyl butyrate, Ethylhexanoate, Ethyl-2-methylbutyrate, Hexen-1-Yl acetate/Cis-3-, Decalactone/gamma-, Methylbutyric acid/2-, Hydroxyphenyl)-2-butanone/4(para-, Methyl dihydrojasmonate, Methyl cinnamate, Ethyl isovalerate, Hexenal/trans-2-, Hexanoic acid, Diacetyl natural, Isovaleric acid, Ionone/alpha, Ionone/beta, Ionone/gamma, Tocopherol/alpha], Citric acid monohydrate, Purified water.

למידע נוסף, ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזזה:

המנגiol היא תמייה לבליה, צולולה וחסרת צבע עד צהבהבה בריח פירות. אזיות התרופה מכילה בקבוק זכוכית בצבע חום כהה המכיל 120 מ"ל של תמייה המנגiol, הסוגר עם מכסה בטיחות עמיד בפני פתיחה על ידי ילדים. האזזה כוללת מזרק מדידה למtanך דרך הפה.

בעל הרישום והיבואן:

פאדגיס ישראל סוכנויות בע"מ, רח' רקפת 1, שוהם.

נערך ביולי 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 15968.35287
לשם הפטשות ולהקלת הקראיה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

17.07.2023