

עלון לצרכן לפי תקנות הרווקחים (תק Shirim) התשמ"ז - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

איקטיבנט טבּע
תמיישה להזרקה תת עורית

הרכב

כל מזרך מכיל:

Icatibant (as acetate) 30 mg/3 ml 30 מ"ג/3 מ"ל

איקטיבנט (כאצטט) 30 מ"ג/3 מ"ל

למיידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 2 "מיידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מיידע נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מיידע תמציתי על התרופה.
אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

איקטיבנט טבּע משמשת לטיפול סימפטומטי בהתקפים אקוטיים של אנגיאודמה תורשתית (HAE) במבוגרים, במתבגרים ובילדים בני שנתיים ומעלה. במצב HAE יש עליה של החומר ברדיין בזרם הדם וזה גורם לתופעות כהantanפות, כאב, בחילה ושלשלולים. איקטיבנט טבּע חוסמת את פעילות הברדיין וכך עוזרת התופעות נוספות של התופעות.

קבוצה רפואיית: חומרים המטולוגים אחרים, תרופות לטיפול באנגיאודמה תורשתית.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין לשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (איקטיבנט) או לאחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בסעיף 6).

ażhorot miyohdot haengutot leshimush batrufah:

לפני הטיפול באיקטיבנט טבּע, ספר לרופא אם:

- אתה סובל מאנגינה (ירידה בזרימת הדם לשדר הלב).
- סבלת לאחרונה מאירוע מוחי.

חלק מתופעות הלואן הקשורות לטיפול באיקטיבנט טבּע דומות לתסמינים של מחלתן. ספר לרופא מיידית אם הבחנת בהרעה של תסמיini ההתקף לאחר השימוש באיקטיבנט טבּע.

בנוסף:

- עליך או על האדם המטפל בר' לעבר הדרכה בטכניית הזרקה תת עורית, לפני ביצוע הזרקה עצמית או לפני הזרקת איקטיבנט טבּע למטופל.
- אם אתה מזריק בעצמך או מקבל את הזרקה על-ידי מטפל, בזמן **התקף המלווה בחסימת דרכי נשימה עליונות**, פנה מיד לבית חולים לקבלת עזרה רפואי.
- במידה ולא חל שיפור בתסמיני ההתקף לאחר הזרקה עצמית אחת או הזרקה אחת של איקטיבנט טבּע על ידי המטפל, יש להיוועץ ברופא לגביו נתילת מנתה נוספת של איקטיבנט טבּע. עברו מטופלים מבוגרים ניתן לתת עד 2-2 זריקות נוספות תוך 24 שעות.

שימוש בילדים ובמתבגרים

לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתכשיר זה בילדים מתחת לגיל שנתיים או לילדים השוקלים פחות מ-12 ק"ג.

תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקחת או אם לך תרופה אחרת כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקט.

לא ידוע על תגובהות בין תרופתיות של איקטיבנט טבע עם תרופות אחרות.

אם אתה נוטל תרופות אחרות הידועות כמעכבי (ACE) Angiotensin Converting Enzyme (ACE) (לדוגמה: קפטופריל, אנאלפריל, רמיפריל, קוונפריל וליזינפריל) להורדת לחץ הדם או בשל כל סיבה אחרת, עליך להיוועץ ברופא לפני נטילת איקטיבנט טבע.

הירון והנקה:

- אם הינך בהירון, חושבת שאתה בהירון או מתכונת להרות יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרפיה.
- אם הינך מניקה, אין להניך 12 שעות לאחר הזרקה המנה האחרונה של הטרופה.

נשימה ושימוש במכונות:

אין לנוהג או להפעיל מכונות במידה והינך חש סחרחות או עייפות כתוצאה מהתקף HAE או לאחר נטילת איקטיבנט טבע.

מידע חשוב על חלק מהרכבים של הטרופה

התמיסה להזרקה מכילה פחוט מ- 1 מילימול (23 מ"ג) של נתרן, لكن הינה נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד השתמש בתרפיה?

יש להשתמש בתרפיה תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרפיה. אם טרם השתמש באיקטיבנט טבע בעבר, המנה הראשונה תמיד תזרק על-ידי הרופא או האחות. הרופא יורה לך מתי בטוח עברך ללכת הביתה.

לאחר קבלת הדרכה מרופא או מחותן ולאחר אימון בטכניקת הזרקה תתעורר (מתוך לעור) תוכל להזריק איקטיבנט טבע לעצמך (או שהמתפל שלך יוכל להזריק לך איקטיבנט טבע) בעת התקף של HAE.

חשוב שההזרקה תבוצע במתן תת עורית מיד עם תחילת התקף האנגיאודמה. איש צוות רפואי ילמד אותך ואת המתפל שלך כיצד להזריק איקטיבנט טבע בביטחון תוך מילוי ההוראות המפורטות בעלון זה.

كيف وأيضاً تדריות יש להשתמש באיקטיבנט טבע؟

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקביל בדרך כלל הוא:

מבוגרים

המינון המומלץ הוא זריקת אחת, תת עורית, של איקטיבנט טבע (3 מ"ל/30 מ"ג), מיד כשמבחנים בסימנים של התקף אנגיאודמה (לדוגמה: עליה בנפיחות של העור, בעיקר באזור הפנים והצואר או כאב בטן מתגבר).

אם לא חל שיפור במצבך לאחר 6 שעות, יש להיוועץ ברופא לגבי הזרקות נוספות של איקטיבנט טבע. עבור מבוגרים, ניתן להזריק עד ל-2 זריקות נוספות תוך 24 שעות.

אין להזריק יותר מ-3 זריקות במשך 24 שעות ובמידה ונדרשת יותר מ-8 זריקות של איקטיבנט טבע בחודש, יש להיוועץ ברופא.

ילדיים ומתבגרים בגילאי 2 עד 17 שנים

המונה המומלצת של איקטיבנט טבע היא 1 מ"ל עד למקסימום של 3 מ"ל בהתאם למשקל הגוף (מזרק אחד של איקטיבנט טבע מכל 3 מ"ל), בהזרקה תת-עורית (מתחת לעור), מיד כשותפות חימם סימנים של התקף אנגיאודמה (לדוגמה: עלייה בנפיחות של העור, בעיקר באזורי הפנים והצואר או כאב בטן מתגבר).

ראה מינונים להזרקה בטבלה 1 תחת "הוראות הזרקה שלב אחר שלב" בהמשך עליון זה.
אם אתה לא בטוח איזו מנה להזריק, היועץ ברופא, ברוקח או באחות.

אין לעבור על המונה המומלצת

אם התסמינים שלך מחמורים או שאתה משתפרים, عليك לפנות מיידית לקבלת עזרה רפואי.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעל או הזריק יلد מן התרופת, פנה מיד לרופא או לחדר המין של בית החולים והבא את אריזת התרופת איתך.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהינך נוטל תרופת. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופת, היועץ ברופא או ברוקח.

הוראות שימוש באיקטיבנט טבע

איקטיבנט טבע מיועד להזרקה תת-עורית (מתחת לעור).
כל מזרק מיועד לשימוש חד פעמי.

יש להזריק איקטיבנט טבע עם מהט קצרה לתוכ שכבת השומן אשר נמצאת מתחת לעור הבطن.

הוראות הבאות מתייחסות להזרקה:

- **למבוגרים (עצמיות או על ידי מטפל/איש צוות רפואי)**
- **למתבגרים או ילדים מעל גיל שנתיים (השוקלים לפחות 12 ק"ג) על ידי מטפל/איש צוות רפואי**

ההוראות כוללות את השלבים העיקריים הבאים:

א. ההוראות כלליות (לכלל המטופלים)

ב. הכנת המנה במזרק לילדים ולמתבגרים (גילאי 12-17 שנים) השוקלים 12-65 ק"ג

ג. הכנת המזרק והמחט להזרקה (לכלל המטופלים)

ד. הכנת מקום ההזרקה לגוף

ה. הזרקת התרופת

ו. השלכת חומר הזרקה לאחר הטיפול

הוראות הזרקה שלב אחר שלב

א. **הוראות כלליות (לכלל המטופלים)**

- יש לנוקות את משטח העבודה (שולחן) לפני התחלת התהילה
- יש לרחוץ את הידיים עם מים וסבון
- יש לתלויש את מכסה האריזה הפנימית לפי קו החיתוך
- יש להוציא את המזרק המקורי לשימוש מהאריזה


- יש להבריג החוצה את הפוך מקצת המזרק המוכן לשימוש
- לאחר הסרת הפוך, יש להניח את המזרק על המשטח

ב. הכנת המנה במזרק לילדיים ולמתבגרים (גילאי 2-17 שנים) השוקלים 12-65 ק"ג

מידע חשוב לצוות הרפואי ולמטפלים:

כאשר המנה המיועדת להזרקה קטנה מ-30 מ"ל, הצד הבא נדרש על מנת לשאוב את המנה המתאימה להזרקה (ראה איור 1):

- מזרק מוכן לשימוש איקטיבנט טבע (המכיל את התרופה) - מסומן באות a
- מחבר (מתאים) - מסומן באות b
- מזרק של 3 מ"ל עם סימון שנתיות - מסומן באות c



איור 1

יש לשאוב תמייסה בכמות הנדרשת, בהתאם לממשק הגוף, לתוך המזרק הריק של ה-3 מ"ל המסומן בשנתיות (ראה טבלה 1).

מטופלים השוקלים יותר מ 65 ק"ג ישתמשו בתוכלה המלאה של המזרק המוכן לשימוש (3 מ"ל).

! אם אתה לא בטוח أيזה נפח של תמייסה יש לשאוב, היועץ ברופא ברוקח או באחות.

טבלה 1: משטר מינון לילדיים ולמתבגרים


משקל גוף	נפח הזרקה
12-25 ק"ג	1.0 מ"ל
26-40 ק"ג	1.5 מ"ל
41-50 ק"ג	2.0 מ"ל
51-65 ק"ג	2.5 מ"ל

יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. הסר את המכסיים משני קצוות המתאים.

! המגע מגע בקצות המתאים והמזרק, כדי שלא יזדהמו.

2. הבריג את המתאים אל מזרק איקטיבנט טבע המוכן לשימוש (ראה איור 2).




איור 2

3. חבר את המזרק המסומן בשנותות אל הקצה השני של המתאם באופן שיבטich שני החיבורים מחוברים היטב.


העברה תמייסת איקטיבנט למזרק המסומן בשנותות

4. בכדי להתחיל בהעברת תמייסת איקטיבנט, דחוף את הבוכנה של המזרק המקורי לשימוש (ראה צד שמאל באיור 3).



איור 3

5. אם התמייסה לא מתחילה לעبور אל תוך המזרק הריק (המסומן בשנותות), משור בעדינות את בוכנת המזרק המסומן בשנותות עד שתמייסת האיקטיבנט תתחילה לזרום לתוךו (ראה איור 4).




איור 4

6. המשך לדחוף את בוכנת המזרק המקורי לשימוש עד אשר הנפח הנדרש להזרקה (המונה) הועבר אל תוך המזרק המסומן בשנותות. עיין בטבלה 1 למידע על הנפח הנדרש.

אם יש אויר במזרק המסומן בשנותות:

- הרם את המזרקים המוחוברים כך שהמזרק המקורי לשימוש יהיה למעלה (ראה איור 5).




איור 5

- דחוף את הבוכנה של המזרק המסומן בשנותות כר שכל האויר יעבור חזרה אל תוך המזרק המוכן לשימוש (יתכן ויהי צריך לחזור מספר פעמים על שלב זה).
 - וודא ששאבת את הנפח הדרוש של תמייסת האיקטיבנט.
7. נתק את המזרק המוכן לשימוש ואת המתאים מהמזרק המסומן בשנותות.
8. השליך את המזרק המוכן לשימוש ואת המתאים אל תוך מיכל לחפצים חדים.
- ג. **הכנת המזרק והמחט להזרקה עבור כל המטופלים (מבוגרים, מתבגרים וילדים)**
- יש להסיר את מכסה הארץיה של המחט (ambil לשולף את המחט מריצתה) (ראה איור 6).



איור 6

- יש להחזיק את המזרק בצורה יציבה, ובזהירות לחבר/להבריג את המחט למזרק המכיל את התמייסה חסרת הצבע, כאשר המחט עדין באריזתו.



איור 7

- יש להוציא את המחט מריצתה ע"י משיכת גוף המזרק. אין למשוך את בוכנת המזרק (ראה איור 7).
- המזרק מוכן עתה להזרקה.

.ד. **הכנת מקום ההזרקה לגוף**

- בחר את מקום ההזרקה. מקום ההזרקה צריך להיות קפל עור בבטן, מתחת לטבור, למרחק של כ- 5-10 ס"מ מהטבור. המקום חייב להיות מרוחק כ- 5 ס"מ לפחות מכל צלקת. אין לבחר מקום פצע, נפוח או כאב.


- יש לנוקות את מקום ההזרקה עם אלכוהול ולתת לאזרור להתייבש (ראה איור 8).



איור 8


ה. הזרקת התרופה

- החזק את המזרק ביד אחת בין שתי אצבעות כאשר האגודל מחזיק את הבוכנה מלמטה.
- וודא שאין בוועת אויר במזרק ע"י לחיצת הבוכנה, עד שהטיפה הראשונה תופיע בקצה המחט (ראה איור 9).




איור 9

- החזק את המזרק כשהמחט מופנית אל העור בזווית של 45-90°.
- כשהמזרק נמצא ביד אחת, צבוט/ קפל את העור באזור המחווט באמצעות האגודל והאצבעות של היד השנייה.
- החזק את קפל העור, קרב את המזרק לעור ובמהירות החדר את המחט לתוך קפל העור (ראה איור 10).



- לחץ את בוכנת המזרק באיטיות וبيد יציבה עד להחדרת כל הנוזל לתוך העור. ודי שלא נשאר נוזל במזרק. זמן ההזרקה אמור לארוך כ- 30 שניות.
 - שחרר את העור ומושך בזיהירות את המחט החוצה.
- ו. **השלכת חומר הזרקה לאחר הטיפול**
יש לזרוק את המזרק, המחט ומכסה המחט לכל מיום מיוחד לפסולת חדה על מנת למנוע פגיעה אחרים (ראה איור 11).



איור 11

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באיקטיבנט טבע עשוי לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואן. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהן.
רוב החוליםים מקבלים איקטיבנט טבע יחוו תופעות לוואי במקום ההזרקה (כגון גירוי בעור, נפיחות, כאב, גרד, אדמומיות של העור ותחושת צריבה). תופעות אלה בדרך כלל מתונות וחולפות ללא צורך בטיפול כלשהו.
במידה והין מבחן בהחמרה הסימפטומים של ההתקף לאחר הזרקת איקטיבנט טבע, פנה מיד לרופא.

תופעות לוואי שכיחות מאד (מופיעות ביוטר ממטופל אחד מתוך 10 מטופלים):
תופעות נוספות במקום ההזרקה (תחושת לחץ, חבלה, ירידת בתוחשה /או קאות, פריחה מגרדת עם הרמה של העור המלאה בתחושת חום בעור).

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב-10-1 מטופלים מתוך 100):
בחילות, כאב ראש, סחרחות, חום, גרד, פריחה, אדמומיות בעור, תוצאות לא תקין של תפוקוד, כבד.

תופעת לוואי אשר שכיחותה אינה ידועה (לא ניתן להעריך את שכיחותה מטעם הנתונים הקיימים):
פריחה אלרגית בעור (אורטיקרייה).

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואן מחמירה או כאשר אתה סובל מהתופעת לוואי שלא צינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי
ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לוואי"
על בוטון **"טיפול רפואי"** שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה
לטופס המקורי לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידים וטוויה ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (date exp) המופיע על גבי האריזה.
- תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון: יש לאחסן בין 2-25°C. אין להקפיא.
- אין להשתמש בתרופה אם אריזת המזרק או המחת פגומות או אם יש סימן כלשהו לפגיעה במוצר או סימנים לקלקול, לדוגמה: אם התמיסה עכורה או אם היא מכילה חלקיקים צפים או אם צבעה השתנה.
- אין להשליך תרופות כלשהן לאשפה הביתיית או לביבוב. שאל את הרוקח איך להיפטר מתרופות שאין עוד בשימוש. אמצעים אלה יסייעו להגנת הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sodium chloride, glacial acetic acid, sodium hydroxide, water for injection, nitrogen

התמיסה אינה מכילה חומרים משמרים.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האrizah
3 מ"ל Tamishe צולולה וחסרת צבע במרקם זכוכית מוכן לשימוש. האrizah מכילה גם מחת סטרילית 25G.
קיימות אריזה של קרטון אחד ואrizah של שלושה קרטונים. כל קרטון מכיל מנת אחת של התרופה.
תיכון ולא כל גודל האrizah משווים.

שם הייצן ובבעל הרישום וכתובתו:
טבע ישראל בע"מ, רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020

עלון זה נערך באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 160-88-35235
שם הפשtotות ולהקלת הקריאה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.