

زياجن أقراص، 300 ملغ أقراص مطلية

يحتوي كل قرص على أباكافير (كسولفات) (abacavir as sulfate) 300 ملغ.

لقائمة المواد الفعالة ومسببات الحساسية في المستحضر، أنظر البند 2 - "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، توجه للطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبيّة مشابهة.

مهم - ردود فعل فرط التحسس

يحتوي زياجن على أباكافير (التي هي أيضا مادة فعّالة في أدوية مثل كفيكسا، تريومك وتريزيفير). قد يطور أشخاص معينون الذين يتناولون أباكافير رد فعل فرط التحسس (رد فعل أليرجي شديد)، الذي قد يشكل خطراً على حياتهم إذا إستمروا بتناول مستحضرات تحتوي على أباكافير.
عليك أن تقرأ بتمعن كافة المعلومات تحت عنوان 'ردود فعل فرط التحسس' ضمن الإطار في الفقرة 4.

تشمل علبة زياجن بطاقة تحذير، لتذكيرك أنت والطاقم الطبي بخصوص فرط التحسس تجاه أباكافير.
أخرج هذه البطاقة واحتفظ بها معك دائماً.
تحتوي هذه البطاقة على معلومات هامة حول الأمان، التي يتوجب عليك معرفتها قبل بدء العلاج وخلال فترة العلاج بـ زياجن والتصرف وفقها.
يجب قراءة بطاقة التحذير والنشرة للمستهلك بتمعن قبل بدء إستعمال المستحضر.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل زياجن لعلاج تلوّث HIV (متلازمة الفشل المناعي البشري).

الفصيلة العلاجية: يحتوي زياجن على المركب الفعّال أباكافير. ينتمي أباكافير إلى مجموعة أدوية مضادة للفيروسات الرجعية المسماة قرائن نوكليروزيد مثبّطات ترانسكريبيناز العكوس (NRTIs).

لا يشفي زياجن تلوّث HIV بشكل تام؛ إنه يقلل من مستوى الفيروس في جسمك، ويحافظ عليه بمستوى منخفض. إنه يرفع من تعداد خلايا CD4 الموجودة في دمك. خلايا CD4 هي نوع من خلايا دم بيضاء ذات أهمية في مساعدة جسمك على محاربة التلوّث.
لا يستجيب كل شخص للعلاج بـ زياجن بنفس الطريقة. سوف يراقب طبيبك نجاعة علاجك.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) لأباكافير (أو لكل دواء آخر يحتوي على أباكافير مثل تريزيفير، تريومك أو كفيكسا) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6).

اقرأ بتمعن كافة المعلومات عن ردود فعل فرط التحسس في الفقرة 4.

← أخبر الطبيب إذا كنت تعتقد أن أيًا من هذه ينطبق عليك.

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء

بعض الأشخاص الذين يتلقون زياچن لـ HIV معرضون لخطورة زائدة لحدوث أعراض جانبية خطيرة. عليك أن تنتبه بشكل خاص للمخاطر الإضافية:

- إذا وجد لديك مرض كبدي معتدل أو خطير
 - إذا عانيت في الماضي من مرض كبدي، يشمل إلتهاب الكبد من نوع B أو C
 - إذا كنت ذا وزن زائد بشكل ملحوظ (خاصة إذا كنت امرأة)
 - إذا كنت تعاني من مرض كلوي خطير.
- توجه إلى طبيبك إذا إنطبق عليك واحد مما ذكر. قد تكون بحاجة لفحوص إضافية، يشمل فحوص دم، في الوقت الذي تتناول دواءك. أنظر الفقرة 4 لمعلومات إضافية.

ردود فعل فرط التحسس لـ أباكافير

حتى المتعالجين الذين ليس لديهم المورثة HLA-B*5701 لا يزال بالإمكان أن يتطور لديهم رد فعل فرط التحسس (رد فعل أليرجي شديد).

اقرأ بتمعن كافة المعلومات عن ردود فعل فرط التحسس في الفقرة 4 في هذه النشرة.

خطورة حدوث نوبة قلبية

لا يمكن نفي أن أباكافير قد يزيد من الخطورة للإصابة بنوبة قلبية. إحك لطبيبك إذا كان لديك مشاكل في القلب، إذا كنت من المدخنين أو كان لديك أمراض أخرى التي قد تزيد من خطورة تعرضك لمرض قلب مثل ضغط دم مرتفع، أو سكري. لا تتوقف عن تناول زياچن إلا إذا أوصاك طبيبك بأن تقوم بذلك.

انتبه لأعراض مهمة

أشخاص معينون يتناولون أدوية لتلوث HIV يطورون حالات طبية أخرى، التي قد تكون شديدة. عليك أن تعرف علامات وأعراض مهمة لتنتبه إليها بينما تتناول زياچن. اقرأ المعلومات 'أعراض جانبية ممكنة أخرى لعلاج مشترك لـ HIV' في الفقرة 4 في هذه النشرة.

التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو للصيدلي عن ذلك. تذكر ببلاغ الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا بدأت بتناول دواء جديد في الوقت الذي تتناول زياچن.

هنالك أدوية تتفاعل مع زياچن

هذه تشمل:

- فينيتوين، لعلاج الصرع.
- إحك لطبيبك إذا كنت تتناول فينيتوين. من الجائز أن يحتاج طبيبك أن يتابع حالتك أثناء فترة تناول زياچن.
- ميتادون الذي يستعمل كبديل للهيروين. يزيد أباكافير من وتيرة طرح ميتادون من الجسم. إذا كنت تتناول ميتادون، سوف تُفحص لوجود أعراض الفطام. من الجائز أن الجرعة الدوائية للميتادون لديك تحتاج للتغيير. إحك لطبيبك إذا كنت تتناول ميتادون.
- ريوسيجوات (riociguat)، المستعمل لعلاج ضغط الدم المرتفع في الأوعية الدموية (الشرابين في الرئة) التي تنقل الدم من القلب إلى الرئتين. قد يحتاج طبيبك إلى تقليل جرعة ريوسيجوات التي تتناولها، لأن أباكافير قد يرفع مستوى ريوسيجوات في دمك.

الحمل والإرضاع

الحمل

لا يوصى باستخدام زياچن خلال فترة الحمل. زياچن وأدوية مشابهة قد تسبب أعراض جانبية في الأجنة. إذا تناولت زياچن خلال فترة الحمل الخاصة بك، فمن شأن طبيبك أن يوصي بإجراء فحوص دم إعتيادية وفحوص تشخيصية إضافية لمتابعة تطور طفلك. لدى الأطفال الذين تناولت أمهاتهم أدوية NRTIs خلال فترة الحمل، فإن أفضلية الوقاية من HIV فاقت خطورة حدوث أعراض جانبية.

الإرضاع

لا يوصى بالإرضاع للنساء اللواتي يعشن مع HIV، لأنه يمكن لتلوث HIV أن ينتقل إلى الرضيع من خلال حليب الأم. كمية صغيرة من المادة الفعالة في زياچن قد تنتقل هي أيضاً لحليب الأم. إذا كنت مرضعة أو تفكرين بالإرضاع، فيجب عليك استشارة الطبيب في أقرب وقت ممكن.

السياقة وإستعمال الماكينات

لا يجوز السياقة أو تشغيل ماكينات إلا إذا كنت تشعر على ما يرام.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملغ) في وحدة جرعة، لهذا يعتبر في الواقع "خالياً من الصوديوم".

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

يجب بلع أقراص زياچن مع القليل من الماء. يمكن تناول زياچن مع أو بدون طعام. إذا لم تستطع بلع القرص (الأقراص)، يمكنك سحقها وخلطها مع كمية صغيرة من الطعام أو الشراب، وتناول الجرعة الدوائية بكاملها حالاً. مسموح سحق/شطر/مضغ القرص.

إبق على إتصال دائم مع طبيبك

يساعد زياچن في السيطرة على حالتك. عليك أن تستمر بتناوله كل يوم لمنع تفاقم مرضك. من الجائز أنك لا تزال تطور أمراض وتلوثات أخرى تتعلق بتلوث الـ HIV. حافظ على إتصال مع طبيبك، ولا تتوقف عن تناول زياچن من دون إستشارة طبيبك.

الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة:

بالغون، مراهقون وأطفال الذين يزنون 25 كلغ على الأقل
الجرعة الدوائية الإعتيادية من زياچن هي 600 ملغ في اليوم. يمكن تناول قرص واحد من 300 ملغ مرتين في اليوم أو قرصين من 300 ملغ مرة واحدة في اليوم.

أطفال من عمر سنة الذين يزنون أقل من 25 كلغ

تتعلق الجرعة الدوائية التي تعطى لطفلك بوزن جسمه. الجرعة الدوائية الإعتيادية هي:

- أطفال الذين يزنون على الأقل 20 كلغ وأقل من 25 كلغ: المقدار الدوائي الإعتيادي من زياچن هو 450 ملغ لليوم. الذي يعطى كـ 150 ملغ (نصف قرص) في الصباح و300 ملغ (قرص واحد كامل) في المساء أو 450 ملغ (قرص ونصف) مرة واحدة في اليوم بحسب توصية طبيبك.
- الأطفال الذين يزنون على الأقل 14 كلغ وأقل من 20 كلغ: المقدار الدوائي الإعتيادي من زياچن هو 300 ملغ لليوم. الذي يعطى كـ 150 ملغ (نصف قرص) مرتين في اليوم أو 300 ملغ (قرص واحد كامل) مرة في اليوم بحسب توصية طبيبك.

بالإمكان شطر القرص لمقادير دوائية متساوية.

يتوفر أيضاً محلول للشرب (20 ملغ أبأكفير/ملل) لعلاج الأطفال فوق عمر ثلاثة أشهر الذين يزنون أقل من 14 كلغ، للأشخاص الذين يحتاجون جرعة دوائية أقل من المعتاد أو لمن لا يستطيع تناول الأقراص. لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، تناوله عندما تتذكر ذلك. من ثم تابع العلاج كالمعتاد. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء من دون إشتارة الطبيب.

من المهم تناول زياجن بشكل منتظم، نظراً لأن تناول الدواء بفترات غير منتظمة، يزيد احتمال ظهور رد فعل فرط التحسس.

إذا توقفت عن تناول الدواء

إذا توقفت عن تناول زياجن لأي سبب كان - خاصة لأنك تعتقد بأن لديك أعراض جانبية، أو لأن لديك مرض آخر:

توجه إلى طبيبك قبل أن تبدأ بتناوله ثانية. سوف يفحص طبيبك فيما إذا كانت الأعراض لديك متعلقة برد فعل فرط التحسس. إذا اعتقد الطبيب بأنه يمكن أن يكون هناك علاقة بينهما، سوف يتم توجيهك بأن لا تتناول زياجن أو كل دواء آخر يحتوي على أباكافير (مثلاً تريزيفير، تريومك أو كيكسسا) مرة أخرى أبداً. من المهم أن تتصرف حسب هذا التوجيه.

إذا وجهك طبيبك بأنه يمكنك أن تبدأ بتناول زياجن ثانية، من الجائز أن يطلب منك أن تتناول الجرعات الأولى الخاصة بك في مكان تتوفر فيه إمكانية الوصول إلى علاج طبي بشكل مريح في حال احتجت له.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، إشتش الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

خلال فترة علاج الـ HIV من الممكن حدوث زيادة في الوزن وفي مستويات الشحوم والسكر في الدم. يتعلق هذا الأمر جزئياً بالصحة وبنمط الحياة، وفي حالة الشحوم في الدم أحياناً بأدوية الـ HIV ذاتها. يفحص طبيبك هذه التغيرات.

كما بكل دواء، إن استعمال زياجن أقرص قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

أثناء فترة العلاج من تلوث HIV، قد يكون من الصعب التمييز فيما إذا العرض هو عرض جانبي لـ زياجن أو لأدوية أخرى تتناولها، أو أنه تأثير لمرض الـ HIV ذاته. لذلك من المهم جداً إبلاغ طبيبك عن كل تغيير في صحتك.

حتى المتعالجين الذين ليس لديهم المورثة HLA-B*5701 لا يزال بالإمكان أن يتطور لديهم رد فعل فرط التحسس (رد فعل أليرجي شديد)، الموصوف في هذه النشرة في إطار تحت عنوان 'ردود فعل فرط التحسس'.

مهم جداً أن تقرأ وتفهم المعلومات عن رد الفعل الشديد هذا.

إضافة للأعراض الجانبية المسجلة لاحقاً لـ زياجن، يمكن أن تتطور حالات طبية أخرى خلال علاج مشترك لـ HIV.

من المهم أن تقرأ المعلومات التي تظهر لاحقاً في هذه الفقرة تحت عنوان 'أعراض جانبية ممكنة أخرى لعلاج مشترك لـ HIV'.

ردود فعل فرط التحسس

يحتوي زياچن على أباكافير (وهو أيضا المادة الفعالة في تريزيفير، تريومك وكيفيكسا). يمكن أن يؤدي أباكافير إلى رد فعل تحسسي شديد الذي يُعرف كرد فعل لفرط التحسس.

لوحظت ردود الفعل هذه لفرط التحسس بشيوع أكبر لدى الأشخاص الذين يتناولون أدوية تحتوي على أباكافير.

من سيطور ردود الفعل هذه؟

كل من يتناول زياچن قد يطور رد فعل فرط التحسس تجاه أباكافير، الذي قد يشكل خطراً على الحياة في حال إستمر بتناول زياچن.

هناك إحتمال أعلى بأن تطور مثل رد الفعل هذا إذا كان لديك المورثة **HLA-B*5701** (لكنك قد تطور رد فعل حتى إذا لم تكن لديك هذه المورثة). كان عليك أن تخضع لفحص وجود هذه المورثة قبل أن يوصف لك زياچن. إذا كنت تعرف بأن لديك هذه المورثة، إحك لطبيبك عن ذلك قبل أن تتناول زياچن.

لقد تطور رد فعل من فرط التحسس لدى نحو 3 حتى 4 من كل 100 متعالج الذين يتعالجون بـ أباكافير ضمن تجربة سريرية ولم يكن لديهم المورثة HLA-B*5701.

ما هي الأعراض؟

الأعراض الأكثر شيوعاً هي:

- سخونة وطفح جلدي.

أعراض شائعة أخرى هي:

- غثيان، تقيؤات، إسهال، ألم في البطن، إرهاق شديد.

أعراض أخرى تشمل:

آلام في المفاصل أو في العضلات، إنتفاخ في العنق، ضيق تنفس، ألم في الحنجرة، سعال، صداع عرضي، إلتهاب في العين (إلتهاب ملتحمة العين)، تقرحات في الفم، ضغط دم منخفض، وخز أو انعدام الحس براحتي القدمين أو راحتي اليدين.

متى تظهر هذه الأعراض؟

قد تبدأ ردود فعل فرط التحسس في أي وقت خلال العلاج بـ زياچن، ولكن من المحتمل أكثر أن تظهر خلال الـ 6 أسابيع الأولى من العلاج.

إذا كنت تعتني بطفل يعالج بـ زياچن، فمن المهم أن تفهم المعلومات عن رد فعل فرط التحسس هذا. إذا كان طفلك يطور الأعراض الموصوفة أدناه من المهم أن تتابع التعليمات التي أعطيت. توجه إلى طبيبك حالاً:

1. إذا تطور لديك أو لدى طفلك طفح جلدي، أو
2. إذا تطور لديك أو لدى طفلك أعراضاً من 2 من المجموعات التالية على الأقل:

- سخونة

- ضيق تنفس، ألم في الحنجرة أو سعال

- غثيان أو تقيؤات، إسهال أو ألم بطن

- إرهاق شديد أو آلام أو شعور عام بالمرض.

قد يوجهك طبيبك بأن تتوقف عن تناول زياچن.

إذا توقفت عن تناول زياچن

إذا توقفت عن تناول زياچن بسبب رد فعل فرط التحسس، ممنوع أن تأخذ ثانية زياچن أبداً أو أي دواء آخر يحتوي على أباكافير (مثل تريزيفير، تريومك أو كيفيكسا). إذا تناولته، قد يهبط ضغط الدم لديك بشكل خطير خلال ساعات، هذا الأمر قد يسبب الوفاة.

إذا توقفت عن تناول زياچن لأي سبب كان خاصة لأنك تعتقد أن لديك أعراضاً جانبية، أو لأنك تعاني من مرض آخر:

توجه إلى طبيبك قبل أن تبدأ بتناوله ثانية. سوف يفحص طبيبك فيما إذا كانت أعراضك تتعلق برد فعل فرط التحسس. إذا اعتقد الطبيب بأنه يمكن أن تكون علاقة بينهما، سوف يتم توجيهك بعدم تناول زياچن أو أي دواء آخر يحتوي أباكافير (مثل تريزيفير، تريومك أو كفيكسا) ثانية أبداً. من المهم أن تتصرف وفقاً لهذا التوجيه.

أحياناً، تطورت ردود فعل من فرط التحسس لدى أشخاص بدأوا ثانية بتناول مستحضرات تحتوي على أباكافير، لكن كان لديهم عرض واحد من تلك التي في بطاقة التحذير قبل أن يتوقفوا عن تناولها.

في أحيان نادرة جداً، فإن متعالجين الذين تناولوا أدوية تحتوي على أباكافير في الماضي ولم تكن لديهم أية أعراض لفرط التحسس، طوروا رد فعل فرط التحسس عندما بدأوا بتناول هذه الأدوية ثانية.

إذا وجهك طبيبك بأنه يمكنك أن تبدأ بتناول زياچن ثانية، يمكن أن يطلب منك تناول الجرعات الدوائية الأولى الخاصة بك في مكان تتوفر فيه إمكانية الوصول إلى علاج طبي بشكل مريح في حال إحتجت له.

إذا وجد لديك فرط حساسية تجاه زياچن، أعد كل أقراص زياچن خاصتك المتبقية والتي لم تستعمل ليتم إتلافها بشكل آمن. إستشر الطبيب أو الصيدلي.

تحتوي علبة زياچن على بطاقة تحذير، لتذكيرك والطاقم الطبي بردود فعل فرط التحسس. أخرج هذه البطاقة واحفظها بحوزتك طوال الوقت.

أعراض جانبية شائعة

قد تظهر هذه في حتى 1 من كل 10 أشخاص:

- رد فعل فرط التحسس
- غثيان
- صداع
- تقيؤ
- إسهال
- فقدان الشهية للطعام
- إرهاق، قلة النشاط
- سخونة
- طفح جلدي.

أعراض جانبية نادرة

قد تظهر هذه في حتى 1 من كل 1,000 شخص:

- إلتهاب البنكرياس (pancreatitis).

أعراض جانبية نادرة جداً

قد تظهر هذه في حتى 1 من كل 10,000 شخص:

- طفح جلدي، الذي قد يؤدي إلى تشكل حويصلات تبدو مثل أهداف صغيرة (بقع داكنة مركزية محاطة بمنطقة أكثر شحوباً، مع حلقة داكنة حول الأطراف) (حمامى متعددة الأشكال)
- طفح منتشر مع حويصلات وتقرش في الجلد، خاصة حول الفم، الأنف، العينين والأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفن جونسون)، وشكل شديد أكثر يؤدي إلى تقرش الجلد في أكثر من 30% من مساحة سطح الجسم (toxic epidermal necrolysis).

• حماض لبني (فائض من حمض اللبني في الدم)

إذا لاحظت بكل واحد من الأعراض التالية توجه إلى الطبيب بشكل عاجل.

أعراض جانبية ممكنة أخرى لعلاج مشترك لـ HIV
قد يؤدي علاج مشترك الذي يشمل زياچن إلى تطور حالات طبية أخرى خلال معالجة HIV.

أعراض تلوث وإلتهاب

تلوثات قديمة قد تتفشي

الأشخاص المصابون بتلوث متقدم لـ HIV (AIDS) هم أصحاب جهاز مناعة ضعيف، ويميلون بشكل زائد إلى تطور تلوثات شديدة (تلوثات إنتهازية). عندما يبدأ هؤلاء الأشخاص بالعلاج، فقد يكتشفون أن تلوثات قديمة، مستترة، تهتاج وتسبب علامات وأعراض إلتهاب. تنجم هذه الأعراض على ما يبدو بسبب تقوية جهاز المناعة في الجسم، حيث يقوم الجسم بمحاربة هذه التلوثات. الأعراض عادة تشمل سخونة، وبعضاً مما يلي:

- صداع
- ألم في البطن
- صعوبة في التنفس

في أحيان نادرة، عندما يصبح جهاز المناعة قوياً، فيمكنه أيضاً أن يهاجم نسيج سليم في الجسم (إضطرابات مناعية ذاتية). إن أعراض اضطرابات المناعة الذاتية يمكن أن تتطور بعد أشهر عديدة من بدء تناولك دواء لعلاج تلوث الـ HIV لديك. الأعراض يمكن أن تشمل:

- ضربات قلب (نبض سريع أو غير منتظم للقلب) أو إرتجاف
- فرط نشاط (قلة راحة وحركة مبالغ فيهما)
- ضعف يبدأ في اليدين وفي راحتي القدمين ويتقدم نحو الأعلى باتجاه مركز الجسم.

إذا كنت تعاني من أعراض أيا كانت لتلوث أثناء فترة تناول زياچن **إحك لطبيبك حالاً**. لا تتناول أدوية أخرى ضد التلوث من دون توجيه من قبل طبيبك.

يمكن أن تعاني من مشاكل في العظام

بعض الأشخاص الذي يتلقون علاجاً مشتركاً لـ HIV يطورون حالة تسمى *osteonecrosis* (نخر العظم). في هذه الحالة، تموت أجزاء من نسيج العظم في أعقاب إنخفاض بتزويد الدم إلى العظم. أشخاص قد يكون لديهم احتمال أكبر لتطور هذه الحالة:

- إذا كانوا يتناولون علاجاً مشتركاً لفترة طويلة من الزمن
- إذا كانوا يتناولون أيضاً أدوية مضادة للإلتهاب تسمى كورتيكوستيروئيدات
- إذا كانوا يشربون الكحول
- إذا كان جهاز المناعة لديهم ضعيفاً جداً
- إذا كانوا يعانون من فرط الوزن.

تشمل علامات نخر العظم:

- تصلب المفاصل
 - آلام (خاصة في الفخذ، في الركبة أو في الكتف)
 - صعوبة في الحركة.
- إذا لاحظت إحدى هذه الأعراض: **إحك لطبيبك عن ذلك**.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

الإبلاغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إنقضاء الصلاحية الى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- لا يجوز التخزين فوق 30 درجة مئوية.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات في البيت. قم باستشارة الصيدليّ بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. إنّ ذلك سيساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

• يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً:
microcrystalline cellulose, sodium starch glycollate (Type A), magnesium stearate, colloidal anhydrous silica, methylhydroxypropylcellulose, titanium dioxide (E171), triacetin, iron oxide yellow (E172) and polysorbate 80.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
زياچن أقراص مطبوع عليها 'GX 623' من كلا الجانبين. تشمل الأقراص على خط للشرط، لونها أصفر، على شكل كبسولة وتسوق بعلب بليستر تحوي 60 قرصاً.
- صاحب الإمتياز: جلاكسو سميثكلين (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتح تكفا.
- منتج: ViiV هيلثكير UK م.ض.، برينتفورد، إنجلترا.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 112-97-29542.
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم التحرير في أيار 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات ViiV Healthcare.
©2023 مجموعة شركات ViiV Healthcare أو صاحب الإمتياز الخاص بها.