

- كنت تعاني من اضطرابات في مستوى الوعي (إذا كنت تشعر أنك على وشك الإغماء).
- كنت في حالة صدمة (من الممكن أن يكون العرق البارد إشارة لذلك).
- كنت تعاني من ضغط متزايد على الدماغ (من الممكن أن يحدث عقب إصابة في الرأس أو مرض دماغي).
- كنت تعاني من صعوبات في التنفس.
- كنت تعاني من الصرع أو ميل للاختلاجات. لأن الاختطار (احتمال الخطر) للاختلاجات من الممكن أن يزداد.
- كنت تعاني من اكتئاب وتتناول أدوية مضادة للاكتئاب لأن جزء منها من الممكن أن يتفاعل مع ترامادول (انظر لاحقًا "تفاعلات بين الأدوية").
- كنت تعاني من مرض كبد أو كلّي.

مشاكل تنفس المرتبطة بالتوم

يحتوي ترامازان **100 ملغ/مل** على المادة الفعالة التي تنتمي لفصيلة الأدوية التي تسمى أفيونيات. قد تؤدي الأفيونيات إلى مشاكل تنفس المرتبطة بالتوم. على سبيل المثال توقف التنفس أثناء النوم (تنفس سطحي)/انقطاع النفس أثناء النوم (**apnea**)، نقص تأكسج الدم المرتبط بالتوم (مستوى أوكسجين منخفض في الدم)، إن الاختطار لمعاميته توقف التنفس أثناء النوم متعلق بجرعة الأفيون. قد يأخذ طبيبك بعين الاعتبار تقليل الجرعة الكلية للأفيون التي تتناولها إذا كنت تعائش توقف في التنفس أثناء النوم.

هناك اختطار منخفض لمعايشة متلازمة السيروتونين التي من الممكن أن تحدث بعد تناول ترامادول بتوليفة مع أدوية معينة. مضادة للاكتئاب أو بعد تناول ترامادول لوحده. توجه فورًا لاستشارة طبية إذا كان لديك واحد من الأعراض المرتبطة بهذه المتلازمة الخومية (انظر للبتن 4 " الأعراض الجانبية").

تم الإبلاغ عن نوبات صرع لدى متعالجين تناولوا ترامادول بالجرعة الموصى بها. قد يزيد الاختطار عندما تكون جرعات الترامادول أعلى من الحد الأقصى للجرعة اليومية الموصى بها (400 ملغ).

إن تناول هذا الدواء بشكل ثابت، خصوصًا لفترة زمنية، من الممكن أن يؤدي للإدمان. كان يتوجب على طبيبك أن يفسر لك ما هي مدة العلاج المطلوبة، متى من المفضل التوقف وكيف يجب فعل ذلك بشكل آمن.

في أحيان نادرة، قد تؤدي زيادة جرعة الدواء لأن تجعلك أكثر حساسًا للألم. إذا عايشت ذلك، رجاء تحدث مع طبيبك بالنسبة للعلاج.

من الممكن أن يؤدي الإدمان لأعراض فطام عند التوقف عن تناول هذا الدواء. أعراض الفطام ممكن أن تشمل عدم الارتياح، صعوبات نوم، عصبية، عدم الهوء، قلق، إدراك لدقات القلب، ارتفاع بضغط الدم، غثيان أو تقيؤ، إسهال، ارتجاف أو تعرق من الممكن أن تظهر إذا توقفت عن التناول بشكل مفاجئ. يجب الاستمرار في العلاج كما أوصاك الطبيب.

يجب أن سُتعمل الأفيونيات فقط من قبل الأشخاص الذين وصفها لهم الطبيب. لا يجوز إعطاء الدواء لأي شخص آخر. إن تناول جرعة عالية أو بوتيرة عالية أكثر من الأفيونيات من الممكن أن يزيد الاختطار للإدمان. استعمال مفرد واستعمال غير صحيح من الممكن أن يؤديا لجرعة مفرطة و/أو للموت.

يمر ترامادول بمعالجة في الكبد بواسطة إنزيم. لدى جزء من الأشخاص يوجد نوع معين من الإنزيم وهذا من الممكن أن يؤثر عليهم بطرق مختلفة. لدى أشخاص معينين التأثير على الألم لا يكون محسوسًا بشكل كافٍ، بينما من الممكن أن يعاني أشخاص آخرون من أعراض جانبية وخيمة وياحتمال أعلي. إذا لاحظت وجود أحد الأعراض الجانبية التالية، يجب عليك التوقف عن تناول الدواء والتوجه حالًا للطبيب: تنفس بطيء أو سطحي، ارتباك، نعاس، حدقتان صغيرتان، الشعور بغثيان أو تقيؤ، إمساك، فقدان شهية.

تحدث إلى طبيبك إذا عانيت أيًا من الأعراض التالية أثناء تناول ترامازان **100 ملغ/مل**:

تعب شديد، فقدان الشهية، ألم شديد في البطن، غثيان، تقيؤ أو ضغط دم منخفض. قد يشير هذا إلى أن لديك قصور في الغدة الكظرية (مستويات منخفضة من الكورتيزول). إذا عانيت من هذه الأعراض، تواصل مع طبيبك، الذي سيقرر ما إذا كان عليك أن تتناول مكمل هرموني.

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو تتولت في الآونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

لا يجوز تناول ترامازان **100 ملغ/مل** سوية مع مضطبات MAO (أدوية معينة لعلاج الاكتئاب) أو إذا تناولتها خلال 14 يومًا قبل تناول ترامازان **100 ملغ/مل**.

من الممكن أن يحدث انخفاض بتأثير ترامازان **100 ملغ/مل** وقد تقصر مدة تأثيره إذا تم تناوله سويةً مع أدوية تحتوي على:

- كاربامازيبين (لعلاج نوبات الصرع)
- أوندانسيترون (لمنع الغثيان)

سيخبرك طبيبك إذا كان عليك تناول ترامازان **100 ملغ/مل** بآلية جراحة.

قد يزداد الاختطار لأعراض جانبية إذا كنت تتناول:

- مسكنات الألم الأخرى مثل مورفين وكوبيين (أيضًا للتحفيف من السعال) أو كحول بالوقت الذي تتناول فيه ترامازان **100 ملغ/مل** من الممكن أن تشعر بالنعاس أو أن تشعر أنه من الممكن أن يعمي عليك. إذا حدث لك هذا، توجه إلى طبيبك.
- استعمال متزامن ترامازان **100 ملغ/مل** مع أدوية للتهدئة أو للنوم (مثلًا بنزوديازيبينات) يزيد من الاختطار للنعاس، صعوبات التنفس (تثبيط التنفس)، الغبوية ومن الممكن أن يكون مهديدًا للحياة. لذلك، يجب أن يؤخذ الاستعمال المتزامن بعين الاعتبار فقط إذا لم تكن هناك إمكانية لبدائل دوائية أخرى. مع ذلك، إذا وصف لك طبيبك ترامازان **100 ملغ/مل** مع أدوية منومة، فيجب أن تكون الجرعة ومدة العلاج المتزامن محدوتان من قبل الطبيب. من فضلك أخير طبيبك عن كل الأدوية المنومة التي تتناولها، والترزم بتوصيات طبيبك بالنسبة للجرعة بعناية. إن الطلب من الأصدقاء أو الأقرباء أن يكونوا وواعيين للعلامات والأعراض من الممكن أن يساعد. تواصل مع طبيبك إذا كنت تعائش هذه الأعراض.
- أدوية التي من الممكن أن تسبب اختلاجات (نوبات صرع). مثلًا أنواع معينة من أدوية مضادة للاكتئاب أو أدوية مضادة للذهان. قد يكون الاختطار لحدوث نوبة أعلى إذا تناولت ترامازان **100 ملغ/مل** بنفس الوقت. سيخبرك طبيبك فيما إذا كان ترامازان **100 ملغ/مل** مناسبًا لك.
- الأدوية معينة مضادة للاكتئاب. من الممكن أن يتفاعل ترامازان **100 ملغ/مل** معها ومن الممكن أن تعائش متلازمة السيروتونين (انظر للبتن 4 "أعراض جانبية").
- مضادات لتجلط الدم من مشتقات الكومارين (أدوية لتسييع الدم)، مثل الوارفارين. فعالية هذه الأدوية في تجلط الدم من الممكن أن تكون متأثرة وبالتالي من الممكن أن يظهر تريف.

استعمال الدواء والطعام

لا يؤثر الطعام على فعالية ترامازان **100 ملغ/مل**.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا تشرب المشروبات الروحية خلال فترة العلاج ترامازان **100 ملغ/مل**، حيث أن تأثيره قد يكون أقرى.

الأطفال والمراهقين

استعمال ترامازان **100 ملغ/مل** لدى أطفال لديهم صعوبات في التنفس:

ترامادول غير موصى به لدى أطفال لديهم صعوبات في التنفس، لأن أعراض التسمم بالترامادول من الممكن أن تكون أكثر وخامة لدى هؤلاء الأطفال.

الحمل والإرضاع والخصوبة

لا تتناولِي ترامازان **100 ملغ/مل** إذا كنت حاملًا أو تعتقدين أنك حامل! إلا إذا تحدثت مع طبيبك عن ذلك وكانت الفائدة من العلاج تفوق الاختطار للتسبب بضرر للرضيع. إذا كنت تتناولين ترامازان **100 ملغ/مل** أثناء الحمل، من الممكن أن يسبب ذلك لتقلع الطفل وعيشته أعراض الفطام بعد الولادة، التي تتطلب العلاج.

لا يجوز تناول ترامازان **100 ملغ/مل** أثناء الإرضاع لأن ترامادول يفرز بحليب الأم ومن الممكن أن يؤثر على رضيعك.

استنادًا إلى التجربة على البشر ، لا يؤثر ترامادول على خصوبة المرأة أو الرجل.

القيادة واستخدام الآلات

ترامازان **100 ملغ/مل** من الممكن أن يسبب النعاس، الدوخة وتوشوش الرؤية، ولذلك من الممكن أن يضر برود ففلك. إذا كنت تشعر أن ردود ففلك متأثرة، امتنع عن قيادة السيارة أو مركبات أخرى، لا تشغيل أجهزة كهربائية أو الآت. من الممكن أن يؤثر الدواء على فتركبك على القيادة لأنه من الممكن أن يسبب لك النعاس أو الدوخة. امتنع عن القيادة خلال تناول هذا الدواء حتى تعلم كيف سيؤثر الدواء عليك.

تكلم مع طبيبك أو مع الصيدلي إذا لم تكن مقتنعًا أن القيادة آمنة لك خلال تناول هذا الدواء.

بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من ركوب الدراجات أو من الألعاب بالقرب من الشارع وما شابه.

معلومات هامة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي الدواء على السوكروز.كل مل يحتوي على 100 ملغ سوكروز.

إذا قيل لك في الماضي من قبل طبيب أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، استشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء. من الممكن أن يضر بالأسنان.

يحتوي الدواء على ماكروجول جليسيروول هيدروكسي سترات، الذي من الممكن أن يؤدي إلى عدم الراحة بالمعدة وإسهال.

يحتوي الدواء على 250 ملغ بروبيلين جليكول بكل مل (40 قطرة)

يحتوي الدواء على أقل من ١ ميليومل صوديوم (23 ملغ) بكل مل (40 قطرة)، مما يعني أنه في الواقع "خالي من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء

يجب استعمال الدواء دائمًا وفقًا لتعليمات طبيبك. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بالنسبة للجرعة وطريقة العلاج بالذواء. للجرعة وطريقة العلاج يجب أن يحدّدان من قبل الطبيب فقط. يجب أن تكون الجرعة ملاءمة لوخامة الألم وللحساسية الشخصية لديك للألم. بشكل عام، يجب تناول الجرعة الأقل التي تسكّن الألم. لا يجوز تناول أكثر من 400 ملغ ترامادول هيدروكلوريد (160 قطرة) في اليوم، إلا إذا أرتشك طبيبك لفعل ذلك.

فقط في حال تم إرشادك بطريقة أخرى من قبل طبيبك، الجرعة الاعتيادية هي:

البالغين والمراهقين من جيل 14 عام فما فوق:

100-50 ملغ ترامادول هيدروكلوريد (20-40 قطرة) كل 6-4 ساعات.

الأطفال

ترامازان **100 ملغ/مل** ليس مخصصًا للأطفال ما دون جيل 14 عام.

فئة المسنين

لدى فئة المسنين (فوق جيل 75 سنة) قد يتم تأخير إفراز ترامادول من الجسم. إذا كان ذلك ينطبق عليك، فمن الممكن أن يوصي طبيبك بإطالة الفواصل الزمنية بين الجرعات.

مرض كبد أو كلّي وخيم (قصور)/ مرضى الكبد (غسيل الكلى)

يجب أن يمتنع المتعالجون الذين لديهم قصور في الكبد وأو الكلئية بمستوى وخيم عن تناول ترامازان **100 ملغ/مل**. إذا كنت تعاني من قصور بمستوى معتدل أو متوسط، من الممكن أن يوصي الطبيب بإطالة الفاصل الزمني بين الجرعات.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة التناول

- يجب البلع مع القليل من الماء أو التظطير على القليل من السكر.
- انتبه! يجب الحرص على قياس الجرعة بقطارة القنينة.
- يوجد للقنينة عالق أمن يمنع من الأطفال فتحها.
- للتفتح: اضغط على الغطاء وقم ببرمه لإخراج القطرات. إمسك القنينة وهي مقنوبة (مع الغطاء إلى الأسفل) بصورة عمودية. بعد الإستعمال أرم الغطاء حتى الإغلاق التام.

كم من الوقت يجب عليك تناول ترامازان 100 ملغ/مل؟

على طبيبك التحدث معك بخصوص فترة العلاج المطلوبة وتحضير برنامج لإيقاف العلاج. هذا البرنامج يوضح كيفية تقليل الجرعة تدريجيًا حتى إيقاف التناول.

إذا تناولت بالخطأ جرعة أعلى
بشكل عام، إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة إضافية، لا ينبغي أن يسبب هذا أعراضًا سلبية. استمر بتناول الجرعة التالية كالمعتاد.

إذا كنت تتناول أنت (أو شخص آخر) كمية كبيرة من ترامازان **100 ملغ/مل** لُدعةً واحدة، يجب التوجه فورًا للمستشفى أو الطبيب. أحضر عبوة الدواء معك. علامات الجرعة المفرطة تشمل حدقتان صغيرتان جدًا، تقيؤات، انخفاض بضغط الدم، نبضات قلب سريعة، انهيار، فقدان الوعي، اختلاجات وصعوبات في التنفس أو تنفس سطحي.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول ترامازان **100 ملغ/مل**، من المرجح أن يعود الألم. لا تتناول جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية. ببساطة استمر بتناول الدواء كالمسابق.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز إيقاف تناول الدواء بشكل مفاجئ. إذا أردت إيقاف تناول الدواء، استشر الطبيب أو لا، سيشرح لك كيف تفعل ذلك، بشكل عام عن طريق تقليل الجرعة بالتدريج، حتى تكون أعراض الفطام الغير مرغوبة قليلة.

أعراض فطام مثل عدم راحة، صعوبات نوم، عصبية، عدم هوء، قلق، إدراك لدقات القلب، ارتفاع بضغط الدم، غثيان أو تقيؤ، إسهال، ارتجاف أو تعرق من الممكن أن تظهر إذا توقفت عن التناول بشكل مفاجئ.

يجب الاستمرار في العلاج كما أوصاك الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن بوضعك الصحي، لا يجوز إيقاف العلاج بدون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع

النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لها.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال في كل دواء، استخدام ترامازان **100 ملغ/مل** قد يؤدي إلى أعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرح من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن ألا تعاني من أي واحد منها.

يجب التوجه فورًا للطبيب إذا كنت تعائش أعراض لرد فعل تحسسي مثل انتفاخ الوجه، اللسان و/ أو الحنجرة و/أو صعوبات في البلع أو شرى (hives)، كدمات حمراء في الجلد) بالإضافة إلى صعوبات في التنفس.

أعراض جانبية شائعة جدًا (أعراض التي تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من عشرة):

- دوخة.
- غثيان.

أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 100):

- الأم رأس، نعاس.
- تعب.
- إمساك، جفاف في الفم، تقيؤات.
- تعرق.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 1,000):

- تأثيرات على القلب وعلى الدورة الدموية (إدراك لدقات القلب، نبض سريع، الشعور بالإغماء والانهيار).
- تحدث الأعراض الجانبية هذه بالأساس في وضعية الوقوف أو تحت جهد بدني.
- حاجة ملخّة للتقيؤ، مشاكل في البطن (مثل الشعور بالضغط في البطن، انتفاخ، إسهال.
- ردود فعل جلديّة (مثل حكة، طفح).

أعراض جانبية نادرة (أعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 10,000):

- ردود فعل تحسسية (مثل صعوبات في التنفس، صفير، انتفاخ في الجلد) وصدمة (فشل مفاجئ بتفق الدم).
- نبض بطيء.
- ارتفاع في ضغط الدم.
- أحاسيس غير عادية (مثل حكة، نخر، اخضرار)، ارتجاف، نوبات صرع، تشنجات في العضلات، قلة التناسق في الحركات فقدان وعي مؤقت (إغماء)، اضطرابات في الكلام.
- نوبات صرع حدثت بالأساس بجرعات عالية من ترامادول أو عندما تم تناول ترامادول بالتزامن مع أدوية أخرى التي من الممكن أن تحفز النوبات.
- تغيرات في الشهية.
- هلوسات، ارتباك، اضطرابات في النوم، غثيان، قلق وكوابيس ليلية.
- قد تظهر بعد العلاج ترامازان **100 ملغ/مل** شكوى حول مشاكل نفسية. قد تتفاوت شدتها وطبيعتها (وفقًا لشخصية المتناالج وطول العلاج). هي قد تظهر على شكل تغير في المزاج (غالبًا مزاج عالي، وأحيانًا مزاج عصبي)، تغيرات في النشاط (بشكل عام انخفاض، أحيانًا ارتفاع) وانخفاض في الإدراك المعرفي والصسي (وعي منخفض وقدرة منخفضة على اتخاذ القرارات، مما قد يؤدي إلى أخطاء في التفكير).
- تشوش الرؤية، توسع مقرف الحدقتان، تقلص الحدقتان.
- تنفس بطيء، ضيق تنفس.
- تم التبول عن تلقاف في وضع الربو، لكن لم يُثبت فيما إذا نتج من قبل ترامادول. إذا تم تجاوز الجرعات المسموحة أو إذا تم تناول أدوية أخرى مثبطة لوظيفة الدماغ بالتزامن، فمن الممكن أن يحدث تباطؤ في التنفس.
- ضعف العضلات.
- صعوبات أو ألم عند التبول، قلة البول.

أعراض جانبية نادرة جدًا (أعراض التي تظهر لدى أقل من مستخدم واحد من بين 10,000):

ارتفاع ببنزيمات الكبد.

أعراض جانبية شيوعها غير معروف (أعراض التي لم يحدد شيوعها بعد):

- مستوى منخفض جدًا من السكر في الدم.
- فواق
- متلازمة السيروتونين التي من الممكن أن تتمثل بتغير في الوضع النفسي (تشمل الأعراض التالية: عدم هوء، هلوسات، غبوية (coma)) وتأثيرات أخرى. مثل حمى، ارتفاع في نظم القلب، ضغط دم غير مستقر، تشنجات غير إرادية، تصلب في العضلات، قلة التناسق وأو أعراض البهتان الهضمي (مثل غثيان، تقيؤ، إسهال) (انظر للبتن 2 "قبل استعمال الدواء").
- تعلق وإدمان (انظر لاحقًا "كيف أعلم أنني مدمن").

فطام عن الدواء:

عندما تتوقف عن تناول ترامازان **100 ملغ/مل** من الممكن أن نعائش أعراض فطام التي تشمل عدم ارتياح، صعوبات في النوم، عصبية، قلق، إدراك لدقات القلب، ارتفاع في ضغط الدم، غثيان، إسهال، ارتجاف، تعرق.

كيف أعلم أنني مدمن؟

إذا لاحظت وجود أحد العلامات التالية أثناء تناول ترامازان **100 ملغ/مل**، فمن الممكن أن تكون هذه علامة على الإدمان:

- كنت تشعر أنك بحاجة لتناول الدواء لفترة أطول من تلك الموصى بها.
- كنت تشعر أنك بحاجة لاستعمال جرعة أكبر من الموصى بها.
- كنت تستعمل الدواء لأسباب تختلف عن تلك الموصوفة.
- عندما تتوقف عن تناول الدواء فإنك تشعر بسوء، وتُشعر بتحسن مجددًا عندما تتناول الدواء. إذا لاحظت أحد هذه الأعراض عليك التحدث مع طبيبك.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تلقفم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "ДІЮЮЧ ІН ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ" الذي يوجه إلى إسمارة. إنترنت التبلاغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الذهاب إلى الرابط: **https://sideeffects.health.gov.il/**

5. كيف تحزّن الدواء؟

- تحبب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال
- وأو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

- شروط التخزين:**
- يجب التخزين تحت 25°C
- لا يجوز استعمال الدواء أكثر من 21 شهرًا من يوم الفتح.
- يخزن في العبوة الأصلية.

لا يجوز التخلص من الأدوية في المجاري أو في سلة النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي كيف تتخلص من الأدوية التي لا تستعمل بعد. هذه الوسائل سوف تساهم بالمحافظة على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة للمركب الفعال يحتوي الدواء أيضًا على:

Glycerol, propylene glycol, sucrose, macrogolglycerol hydroxystearate, peppermint aroma, sodium cyclamate, potassium sorbate, saccharin sodium, anise aroma, purified water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

محلول شفاف حتى مائل للصفرة، لزج قليلًا.
تحتوي قنينة الدواء على قطارة لقياس دقيق لكمية الدواء، تحتوي كل قنينة على 10 مل من المستحضر.

صاحب التسجيل: رازر روكوت م.ض، جيسر هعيش، 31، المنطقة الصناعية عيفك جسر، إسرائيل.

المنتج: ABC Farmaceutici S.p.A., Italy.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 00-34205-88-154.

تم التفتيح في آذار 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلًا الجنسين.

RAZP1025-03