

يُسوق الدواء بدون وصفة طبيية پارامول، حبوسولات، 500 ملغ

تحتوي كل حبوسولة على پاراستامول (Paracetamol) 500 ملغ

المواد غير الفعالة والمسيبة الحساسية في الدواء - انظر البند 6 "معلومات إضافية" والبند 2 "معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء"

أقرأ النشرة بعناية حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كنت لديك أسئلة إضافية توجه لطبيب أو الصيدلي. يعطى هذا الدواء من دون حاجة لوصفة طبيب ومخصص للبالغين والأطفال من جيل 6 سنوات فما فوق. عليك تناول الدواء حسب التعليمات في البند 3 "كيفية استعمال الدواء" في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقم الأعراض أو لم تتحسن في غضون 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء.

1. لأي عرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لتسكين الألم وتخفيف السخونة الناتجة عن أسباب مختلفة مثل صداع الأم الأسنان زكام، الإنفلونزا، الأم ورماتيزمية والأم الدورة الشهرية (الطفث).

الفصلية العلاجية: مسكن للألم وخافض للسخونة.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجحاً) للمادة الفعالة (پاراستامول)
- أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر البند 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- إذا تطورت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحتوي على پاراستامول، فلا يجوز تناول مستحضرات تحتوي على پاراستامول.
- إذا حدثت نوبة أعراض جلدية وخيمة.
- تحتوي المستحضرات على پاراستامول الذي قد يسبب الحساسية للكبد عندما:
 - يعطى بجرعة أعلى من الموصى بها أو لفترة طويلة.
 - شرب المشروبات الكحولية خلال فترة العلاج.
 - عند تناول أدوية إضافية التي تؤثر على عمل الكبد.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء لفترات متفرقة بدون استشارة الطبيب.
- لا يجوز تناول أدوية إضافية لتخفيف السخونة وتسكين الألم، أو أدوية لتلازم بدون استشارة طبيب أو صيدلي لمنع فرط الجرعة أو تسمم بالپاراستامول.
- لا يجوز تناول أدوية إضافية من عائلة پارامول و/أو مستحضرات إضافية تحتوي على پاراستامول.
- يجب تجنب تناول جرعة عالية (بالحد الموصى به) من هذا الدواء أثناء الصوم.

احك المضي قبل بدء العلاج إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

- حساسية لخداه معين أو لدواء أيا كان
- مرض كبد أو خال في وظيفة الكبد
- خال في وظيفة الكلى
- الإنسان على الكحول
- برقان
- إذا كنت حاملاً أو مرضعة

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤزراً أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالخاص إذا كنت تتناول: أدوية ضد تخثر الدم مثل وارانين.

• مستحضرات تشتمل نتاج أنزيمات في الكبد (مثل: ريفامبين، بارينوتات).

• أدوية الصرع - فينيتوين، كاربامازين.

• مستحضرات مضادات التهاب الالتهاب الالستروئيدية.

• ميتوكلوراميد أو دومبريدون (علاج الغثيان، التقيؤات ومشاكل أخرى).

• كلورفينكول (مضاد حيوي).

• رويونيد (علاج الفترس).

• كورسترومين (التخفيف فرط دهنيات الدم).

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يجب شرب المشروبات الكحولية خلال فترة العلاج بپاراستامول بسبب زيادة الإختطار لحدوث ضرر في الكبد.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة يجب استشارة الطبيب قبل البدء في استعمال الدواء. يجب تناول الجرعة الأدنى الفعالة لديك لتسكين الألم أو لتخفيف السخونة لفترة زمنية الأقصر الممكنة. استشر طبيبك إذا لم يطرأ تحسن في الألم أو في السخونة أو إذا كنت بحاجة لتناول الدواء لفترات متفرقة أكثر.

الإرضاع

استشارة الطبيب.

السيفاق واستعمال الآلات

پاراستامول لا يؤثر على السيفاق أو استعمال الآلات.

الاستعمال لدى الأطفال

هذا الدواء مخصص للبالغين والأطفال ما فوق جيل 6 سنوات. انظر البند 3.

يجب على الوالدين تبليغ الطبيب المعالج عن جميع الأعراض الجانبية وكذلك عن كل دواء إضافي يعطى الطفل.

الدواء هامة عن قسم من مركبات الدواء

تحتوي هذا الدواء على sunset yellow FCF aluminum lake (E104) sunset yellow FCF aluminum lake (E104) من شأنه أن يسبب ردود فعل أرجية.

تحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليون (23 ملغ) صوديوم للجسولة، أي انها فعلياً "خالية من الصوديوم".

3. كيفية استعمال الدواء؟

• عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة وطريقة العلاج بالطبيب.

• في غياب توصية من الطبيب فإن الجرعة الموصى بها بشكل عام هي:

البالغون والأطفال من جيل 12 سنة فما فوق:

1-2 حبوسولات كل 4-6 ساعات حسب الحاجة. لا يجوز تجاوز جرعة 8 حبوسولات اليوم.

أطفال بعمر 6-9 سنوات: ½ حبوسولة كل 4-6 ساعات حسب الحاجة. لا يجوز تجاوز

جرعة دوامية قدرها 3 حبوسولات لليوم (1.5 غرام في اليوم) أطفال في عمر 9-12 سنوات: 1- ½ حبوسولة كل 4-6 ساعات حسب الحاجة. لا يجوز تجاوز جرعة دوامية قدرها 4 حبوسولات لليوم (2 غرام في اليوم).

لا يجوز إعطاء حبوسولة للأطفال دون عمر 6 سنوات.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

عليك التوجه للطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا لم تتفك الأعراض في غضون 5 أيام على الرغم من استعمال الدواء.

طريقة تناول:

يجب بلع الدواء مع القليل من الماء. يسمح بشطر الحبوسولات. لا توجد معلومات بالنسبة للمضع الحساسين أو المسنق.

إذا تناولت بالخطأ جرعة زائدة

إذا تناولت بالخطأ جرعة مفرطة أو إذا تناولت طفلك من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واحضر عبوة الدواء معك. لا تسبب التقيؤ دون أن تؤكل وتعالج مريضاً من الطبيب. حتى لو كان شعورك جيداً، العلاج الجراحي ضروري، بسبب الإختطار تطور ضرر وخيم للكبد. أعراض جانبية من الممكن أن تكون غثبات وتقيؤات، إسهال، فقدان الشهية، الألم في البطن، انتفاخ، تعرق زائد، ألم أو حساسية في الجزء العلوي من البطن ومن الجائر أنها لا تتعكّل الضرر الحاصل للكبد.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام لتفك من الموضع والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كنت لودك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال مع أي دواء، استعمال پارامول قد يسبب أعراضاً جانبية مثل الدوار لدى بعض المستعملين. لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تعاني من أي واحد منها.

الأعراض الجانبية قد تكون وخيمة أكثر لدى المسنين.

أعراض جانبية وخيمة:

• **ردود فعل أرجية** وخيمة مثل طفح وحكة. انتفاخ الوجه، التشنج، اللسان، الحنجرة التي من الممكن أن تؤدي إلى صعوبة في التنفس أو التلبّ انتفاخ الأظفار.

• في حالات نادرة، أمراض جلد وخيمة التي من الممكن أن تكون أعراضها: إجمار، طفح، حبوسلات، إصابة جلدية واسعة. قد تظهر أعراض جانبية جلدية وخيمة حتى لو تناولت في الماضي مستحضرات التي تحتوي على المركب الفعّال پاراستامول بدون مشكلة.

إذا ظهرت عوارض جانبية جلدية، يجب إيقاف العلاج ومراجعة الطبيب حالا.

• علامات التقيؤات في جهاز الهضم مثل: أنزفة طيور، كدمات بسهولة، تطور التهابات بسهولة أكبر نتيجة انخفاض شديد بعدد خالريا الدم البيضاء.

• ضيق تنفس (نادر).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يتفكر في النشرة: عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

من خلال تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "تقوون علأ تقوون لودأ" لعقد "سيفوق تقوون" المتواجد على الصفحة الإلكترونية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الاستشارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وهكذا. تمنع التسمم، لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات مريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (التاريخ الفصون) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• شروط التخزين: لا يجوز التخزين فوق 25°C. في عبوة قفصية، يمكن استعمال الدواء بعد فتحها بتاريخ انتهاء الصلاحية المشار إليه على العبوة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعّال يحتوي الدواء أيضاً على:

Povidone, hypromellose, titanium dioxide (E171), croscarmellose sodium, magnesium stearate, macrogol, quinoline yellow aluminum lake (E104), sunset yellow FCF aluminum lake (E110), carnauba wax

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: حبوسولة مغلفة باللون الأصفر مع خط للسطح من كلا الطرفين. من كلا اللونين أحجام العبوات المتصادق عليها: عبوة لويحة: 10، 18، 20، 50، 100، 1000 حبوسولة.

عبوة القفصية: 50 حبوسولة. قد لا تكون جميع أحجام العبوات منسقة. قد لا تتفك في حزيران 2022 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 127-96-30764-00

التبليغ وتسهيل القراءة: تمت تصبغة هذه النشرة بصيغة المتكبر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل

• **دكتور م. ص.** • علامات التقيؤات في جهاز الهضم مثل: أنزفة طيور، كدمات بسهولة، تطور التهابات بسهولة أكبر نتيجة انخفاض شديد بعدد خالريا الدم البيضاء.

شارع دكمسل 1، أور عيكفا 3060000، إسرائيل