

يُسَوَّق الدواء بدون وصفة طبيب دكسامول، حيسولات، 500 ملغ

- خلل في وظيفة الكلية
- الإدمان على الكحول
- ورفان
- إذا كنت حاملاً أو مرضعة

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تتولدت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، اذكر طبيبك أو الصيدلي عن ذلك، بالأخص إذا كنت تتناول:

- أدوية ضد تخثر الدم مثل والفرارين.
- مستحضرات تنتج إنتاج إيثيمات في الكبد (مثل: ريفامبين، مابريبيورات).
- أدوية للصرع - فينيتوين، كاربامازيبين.
- مستحضرات مضادات التهاب الالتهاب الالستروبيدية.
- ميكلوزبراميد أو دوميريون (علاج الغثيان، التقيؤات ومشاكل هضم أخرى).
- ميتوفينكول (مضاد حيوي).
- وريوبانسيد (علاج القرص).
- كورلسترامين (تخفيف فرط ضغط الدم).

استعمال الدواء وإستهلاك الكحول

لا يجوز شرب المشروبات الكحولية خلال فترة العلاج بإيستامول بسبب زيادة الإختلال لحدوث ضرر في الكبد.

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة يجب إستشارة الطبيب قبل البدء في استعمال الدواء. يجب تناول الجرعة الأدنى الفعالة لديك لتسكين الألم وأو لتخفيض السخونة للفترة الزمنية القصيرة الممكنة. إستشر طبيبك إذا لم يتراءى وتحسن في الألم أو في السخونة أو إذا كنت بحاجة لتناول الدواء لفترات متقاربة أكثر.

الإرضاع

كميات قليلة من پاراستامول تمر عبر حليب الأم. يجب إستشارة الطبيب.

السيفالة وإستعمال الالات

پاراستامول لا يؤثر على الفترة على السيفالة أو استعمال الالات.

الأستعمال لدى الأطفال

هذا الدواء مخصص للبالغين والأطفال ما فوق جبل 6 سنوات. انظر للند 3.

يجب على الوالدين تبليغ الطبيب المعالج عن جميع الأعراض الجانبية وكذلك عن كل دواء إضافي يعطى للطفل.

معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على FCF sunset yellow E110) (E110 aluminum lake، الذي من شأنه ان يسبب

ردود فعل أرجية.

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليلون (23 ملغ) صوديوم للجسولية (أي أنها فاطي"خالية من الصوديوم".

3. كيفية الإستعمال؟

عند التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذ لم تكن متأكدًا من الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

في غياب توصية من الطبيب فإن الجرعة الموصى بها بشكل عام هي:

البالغون والأطفال من جبل 12 سنة فما فوق:

1-2 حيسولات كل 4-6 ساعات حسب الحاجة. لا يجوز تجاوز جرعة 8 حيسولات اليوم.

أطفال بعمر 9-6 سنوات: ½ حيسولة كل 4-6 ساعات حسب الحاجة. لا يجوز تجاوز جرعة دوائية قدرها 3 حيسولات اليوم (1.5) غرام في اليوم.

أطفال في عمر الـ 12 سنة وما دون:

4-6 حيسولات حسب الحاجة. لا يجوز تجاوز جرعة دوائية قدرها 4 حيسولات اليوم (2) غرام في اليوم.

لا يجوز إعطاء حيسولة للأطفال دون عمر 6 سنوات. لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

عند التوجه للطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا كنت تتخفف الأعراض في غضون 5 أيام مع الرغم من استعمال الدواء.

طريقة تناول:

يجب على الدواء مع القليل من الماء. يسمح بشطر الجسولات. لا توجد معلومات بالنسبة للمضغ أو المسحق.

إذا تناولت بالخطأ جرعة زائدة

إذا تناولت بالخطأ جرعة مفرطة أو إذا تناولت طفلك من الدواء عن طريق الخطأ، فوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ أو المستشفى وأخبره بعودة الدواء.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات مريحة من الطبيب حتى لو كان شعورك جيداً. العلاج القوري ضروري. بسبب إختطار ضرر وخيم للكبد. أعراض جانبية من الممكن أن تكون غثيان وتقيؤات، إسهال، فقدان الشهية.

في الأم في البطن، الإنتفاخ، تعرق زائد، ألم أو حساسية في الجزء العلوي من البطن ومن الجائر أنها لا تعكس الضرر الحاصل للكبد.

لا يجوز تناول ادوية في الالتهاب! تحقق من الملصق بالجرعة في كل مرة لتتأكد فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كنت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال مع أي دواء، استعمال دكسامول قد يسبب أعراضاً جانبية مثل الدوار، لدى بعض المستخدمين. لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تعاني من أي واحد منها.

الأعراض الجانبية قد تكون وخيمة أكثر لدى المسنين.

أعراض جانبية وخيمة:

• يجب التوقف عن الإستعمال ومراجعة الطبيب حالاً عند ظهور:

• ردود فعل أرجية وخيمة مثل طفح وحكة إنتفاخ الوجه الشفتين، السعال، الحجرة التي من الممكن أن تؤدي لصعوبة في التنفس أو التلع، إنتفاخ الأطراف.

• في حالات نادرة، أمراض جلد وخيمة التي من الممكن أن تكون أعراضها: احمرار، طفح، حويصلات.

• إصابة جلدية واسعة. قد تظهر أعراض جانبية جلدية خفيفة حتى لو تناولت في الماضي مستحضرات التي تحتوي على المركب الفعال بإيستامول بدون مشكلة.

• إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، يجب إيقاف العلاج ومراجعة الطبيب حالاً.

• علامات لتقيؤات في جهاز الهضم مثل: إزفة، قيؤ، طور

• كدمات بسهولة. تطور التهابات بسهولة أكبر نتيجة إخفاض شديد بعدد خلايا الدم البيضاء.

• ضيق تنفس (نادر).

• إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من أعراض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

• يمكن تبليغ الزائر الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "تقارير عن دواء" على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة (www.health.gov.il)

• الموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوفى إمكانية الإبلاغ الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسخين يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال وأول الرضع وهكذا تجنب التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات مريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ الصلاحية (تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر).

• شروط التخزين: لا يجوز التخزين فوق 25°C. في تاريخ قتيبة. يمكن استعمال الدواء بعد تفحصه لغاية تاريخ انتهاء الصلاحية المشار إليه على العبوة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال يحتوي الدواء أيضاً على: Povidone, hypromellose, titanium dioxide (E171), croscarmellose sodium, magnesium stearate, macrogol, quinoline yellow aluminum lake (E104), sunset yellow FCF aluminum lake (E110), carnaubawax

• كمنت حساساً (أرجية) للمادة الفعالة (پاراستامول) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر للند 6).

• تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

• إذا تطورت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحتوي على پاراستامول، فلا يجوز تناول مستحضرات تحتوي على پاراستامول. كي لا تحدث ثانية أعراض جلدية وخيمة.

• جنوبي المستحضر على پاراستامول الذي قد يسبب الضرر للكبد عندما:

• يعطى جرعة أعلى من الموسى بها أو لفترة طويلة.

• شرب المشروبات الكحولية خلال فترة العلاج أو مع تناول ادوية إضافية التي تؤثر على عمل الكبد.

• لا يجوز استعمال هذا الدواء لفترات متقاربة بدون إستشارة الطبيب.

• لا يجوز تناول ادوية إضافية لتخفيض السخونة وتسكين الألم، أو ادوية للإكزام بدون إستشارة طبيب أو صيدلي لمنع فرط الحرارة أو تسمم بالپاراستامول.

• لا يجوز تناول ادوية إضافية من عائلة دكسامول أو مستحضرات إضافية تحتوي على پاراستامول.

• يجب تجنب تناول جرعة عالية (بالحد الموصى به) من هذا الدواء أثناء الصوم.

• اذكر لطبيبك قبل بدء العلاج إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

• حساسية لغذاء معين أو لدواء أيًا كان

• مرض كبد أو خلل في وظيفة الكبد

• مرض كبد أو خلل في وظيفة الكلية

• مرض كبد أو خلل في وظيفة الكلية

• مرض كبد أو خلل في وظيفة الكلية

• مرض كبد أو خلل في وظيفة الكلية

• مرض كبد أو خلل في وظيفة الكلية

• مرض كبد أو خلل في وظيفة الكلية

• مرض كبد أو خلل في وظيفة الكلية

المحتج وصاحب التسجيل

دكسل م.ص.

شارع دكسل 1، أور عيكفا 3060000، إسرائيل