

דקסמול®, קפליט, 500 מ"ג

לפי קפליט מכילה פראצמול (Paracetamol) 500 מ"ג.
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה –
ראה סעיף 6 מידע נוסף* ובסעיף 7 מידע
חשוב על חלק מהתרכיבים של התרופה.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש
בתרופה. עלון זה מביא מידע ומציע על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל
הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא והיא
מיועדת למבוגרים וילדים מגיל 6 שנים ומעלה.
לפי ליטול את התרופה על פי ההוראות בסעיף
3 "כיצד תשתמש בתרופה?" בעלון זה. היועץ
ברוקח או אתה זקוק למידע נוסף.
יש לפנות לרופא אם החום ממשיך יותר מ-3 ימים
ואם אתה הסתמיים מתגברים או אינם
חולפים תוך 5 ימים למרות השימוש בתרופה.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול כאבים ולהורדת חום
הנגרמים מסיבות שונות, כגון כאבי ראש, כאבי
שיניים, הצטננות, שפעת, כאבים מרומטיזם
(ראומטיזם) וכאבי מחזור.

2. קבוצה תרופתית: משכך כאבים ומומדיד חום.

3. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל
- פראצמול או לכל אחד מהמרכיבים
- הסתמיים אתה מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
אם פיתחה בעבר תופעות ליווי שונות
כתוצאה מנטילת תכשירים המכילים
פראצמול, אין לנטילת תכשירים המכילים
עוריות ומורות.

- התכשיר מכלי פראצמול העלול לגרום לנזק
כבד כמובן:
- ניתן מאיברי גבוה מהמומלץ או לתקופה
ממושכת.
- בזמן טיפול שרתיים משקאות אלכוהוליים.
- סטילים תרופות נוספות המשפיעות על
פעילות הכבד.
- פיתחה בעבר תרופה זו לעיתים קרובות בלי
היועץ בתרופה.
- אין ליטול תרופות נוספות לרדת חום לשינוי
כאבים או תרופות להצטננות ללא היועץ
עם הרופא או רוקח למניעת מינון יתר או
הרעף של פראצמול.
- אין ליטול תרופות נוספות ממשפחת דקסמול
או לכשירים נוספים המכילים פראצמול.
יש להימנע מלקחת מינון גבוה (בגבול
המומלץ) של תרופה זו בזמן עיסוק.

ספר לרופא לפני התחלת השימוש אם אתה
סובל או סבלת בעבר מ:
• גרישות למזון כלשהו או תרופה כלשהי
• מחלת כבד או ליקוי בתפקוד הכבד

המרכיב הפעיל פראצמול ללא
ביעה.
אם מפועלת תופעות לוואי
עוריות, יש להפסיק הטיפול
ולפנות לרופא באופן מיידי.

- סימנים של שינויים במערכת הדם כגון:
דלדמות בירת חבורות בקלות, הפתחות
במספר תאי דם הלבנים.
- קוצר נשימה (נדיר).

אם הפגיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות
הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות
לוואי שלא ציננה בעלון, עליך להתייעץ עם
הרופא.

ידווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות
באמצעות הדפיסה על הקישור "ידווח על תופעות
לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית
של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il)
המפנה לטופס המוקדן לידווח על תופעות לוואי,
על ידי כניסה לקישור:
<https://sideeffects.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה: תרופה זו ללא תרופה אחרת יש
לשמור בתנאים גבוה מחוץ להישג ידם וטווח
ארוכים של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כי
מתנע הרעלה. אל גרום להרעלה לילדים
מפורשת מהרפוא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה
המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה
מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
במקביל, אין להשתמש בתרופה לאחר פתיחתה
במקביל, אין להשתמש בתרופה לאחר פתיחתה
במקביל, אין להשתמש בתרופה לאחר פתיחתה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
 titanium dioxide, hydrophillose, croscarmellose
sodium, magnesium stearate,
macrogol, quinoline yellow aluminum lake (E104), sunset yellow FCF
aluminum lake (E110), carnauba wax

כיצד נראית התרופה ומה נותן האריזה:
קפליטה מאורכת בצבע צהוב עם קו חצייה בשני
הצדדים.

- גודל אריזה מאושרים:
- אריזות מגישה 10, 16, 20, 32, 50, 64, 66, 100 קפליטות.
- אריזות בקבוק: 50 קפליטות.
- ייתכן שלא כל גודל האריזה משוקם.
- מספר ביוני 2022 בהתאם להחלטת משרד הבריאות.
- מספר רישום התרופה בפקטס התרופות
הממלכתית במשרד הבריאות:
039-64-25921-00
- לשם הפטנט ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח
בשני עמודים. עלון זה, התרופה מיועדת לילדים
בשינויים.

יצרן ובעל רישום:

דקסלס ב.מ.ס

רח' דקסלס 1, אור עקיבא 306000, ישראל

מבוגרים וילדים מגיל 12 שנים ומעלה:

1-2 קפליטות כל 4-6 שעות לפי הצורך. אין
לעבור על מינון של 8 קפליטות בלימה.
ילדים בגיל 6-9 שנים: ½ קפליטה כל 4-6
שעות לפי הצורך. אין לעבור על מינון של 3
קפליטות בלימה (1.5 גרם ביום).
ילדים בגיל 9-12 שנים: 1-½ קפליטה כל 4-6
שעות לפי הצורך. אין לעבור על מינון של 4
קפליטות בלימה (2 גרם ביום).
אין לתת קפליטה לילדים מתחת לגיל 6 שנים.

אין לעבור על המנה המומלצת.

עלִיך לפנות לרופא אם החום ממשיך יותר מ-3 ימים
ואם אתה הסתמיים או חולפים תוך 5 ימים
אלמרות השימוש בתרופה.

צורת הנטילה:

יש לבלוע את התרופה עם מעט מים. מותר
לחצות את הקפליטה. אין מידע לגבי לעיסה או
כתישה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת יותר או אם בטעות בלי יד
מן התרופה, נע מיד לרופא או לחדר מיון
של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. מין
תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרפוא!
גם אם גרשתך טובה, טיפול מיידי הוא חיוני,
בגלל הסיכון להתפתחות נזק חמור לכבד.
תופעות לוואי יכולות להיות ביחלה והקאה,
שלשול, אובדן תיאבון, כאבי בטן, נפיחות,
הדעה מוגברת, כאב או גרישות בבטן העליונה
וייתכן שהן לא משקפות את חומרת הנזק לכבד.

אין ליטול תרופות בחושה! **תופעות לוואי**
והנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה, הרוב
משקפים אם אתה לוקח להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש
בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בדקסמול עלול
לגרום לתופעות לוואי כגון סחרחורת, בחילות
לרמת השתמשות. אל תיבהל למקרא רשימת
תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מראש אחת
מן:

- תופעות הלוואי עלולות להיות חמורות יותר
בקשישים.

5. שימוש לוואי מורחב:

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא
תופעות:

- תגובות אלרגיות חריפות כגון פריחה וגודר,
התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון,
הגרון אשר עלולים לגרום לקשיי נשימה או
"ביעה", התנפחות הגפיים.
- במקרים נדירים, יכולות עור חריפות
סהימיים שלהן ימולד להיות אודם,
פריחה, שלפוחיות, פגיעה עורית נרחבת.
תופעות לוואי עוריות חריפות עלולות להופיע
גם אם עבר נטלת תכשירים המכילים את

- ליקוי בתפקוד הכליה
 - אלכוהוליים
 - צרבת
 - כאב את במריון או מניקה
- ### תגובות בלתי תרופתיות
- אם אתה לוקח, או אם אתה לוקח לארוחה,
 - תרופות אחרות כוללות תרופות ללא מרשם
 - ותופות זחונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
 - במומדיד את הרוקח
 - תרופות נגד קרישת דם כגון וורפרין
 - תכשירים המפזרים ייצור אדנימים בכבד
 - (לדוגמה: היפרמינים, ברוטיטוסים).
 - תרופות לאפילפסיה - פריטואין, קרבמזפיין.
 - תכשירים מוגדי דלקת שאינם סטרואידים.
 - מוטוקולוראמיד או זומפרידון
 - (לטיפול בחבלה, הקאה ובעיות עיכול
 - נוספות).

- כלורופניקול (אנטיביוטיקה).
 - פרופנדיד (טיפול בגידומים).
 - מולטימיקאן (הפתחת ידן שומני דם).
- ### שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול
- אין לצרוך אלכוהול בזמן הטיפול בפראצמול
בגלל עליה בסיכון לנזק לכבד.

הריגון והקאה

אם את במריון או מניקה יש להיועץ ברופא
לפני תחלת השימוש בתרופה. יש ליטול את
התרופה המומלצת ביותר היעילה עבור לשינוי
הוא/או להורדת החום, למשך הזמן הקצר
יבותר האפשרי. היועץ ברופא אם אין הקלה
בבאב או בחום אם את צריכה ליטול את
התרופה לעיתים תכופות יותר.

הקאה:

כמויות קטנות של פראצמול עוברות לחלב
אם יש להיועץ ברופא.

נהיגה ושימוש במכוניות

פראצמול אינו משפיע על היכולת לנהוג או
לפעול במכונית.

השימוש בילדים

תרופה זו מיועדת למבוגרים וילדים מגיל 6
שנים, ראה סעיף 3.
על הרוקח לדווח לרופא המטפל על כל תופעות
הלוואי שיש לך לרופא נוספת הינתנת לילד.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
תרופה זו מכילה FCF sunset yellow (E110)
aluminum lake, העלול לגרום
לרגובות אלרגיות.
תרופה זו מכילה חותם מ-1 מילימול (23 מ"ג)
נתרן לקפליטה, כלומר היא למעשה "נטולת
נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלִיך לבלוק עם הרופא או הרוקח אם איך
לשון בנוגע לזמן ומינון הטיפול בתרופה.
הקערה הוראה אחרת מהרופא המינון
המוקבל בדרך כלל הוא: