

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

ספטידין

תמיסה

הרכב:

החומרים הפעילים וריכוזם:

כלורהקסידין גלוקונאט 0.5% w/v

(Chlorhexidine Digluconate 0.5 w/v)
אלכוהול 70% v/v (Alcohol)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים:
ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם
תשתמש בתרופה.**

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש
לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עלִיךְ להשתמש בתכשיר בצורה נכונה. היוועץ
ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לחיטוי מהיר של הידיים,
גם לפני פעולות רפואיות חודרניות.

קבוצה תרפויטית - תכשירים אנטיספטיים.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשימת החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
- על רקמות המוח, קרום המוח והאוזן התיכונה.
- בתינוקות מתחת לגיל חודשיים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש

בתרופה:

- יש להימנע ממגע עם העיניים.
- במקרה של מגע, יש לטשוף עם הרבה מים.
- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עלִיךְ להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
- אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד יבוש מוחלט של התכשיר.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה: מכיל אלכוהול, חומר דליק.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלִיךְ לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

אופן השימוש:

צוק 3 מ"ל מהתכשיר על ידיים נקיות,

פזר התמיסה על כל משטחי היד וחקך הידיים עד התנדפות מוחלטת של החומר.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבלוע.

התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חוליית וטבא איריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושרך בדיקת התונית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים

אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בספטידין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל

למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא:

• במקרה של רגישות בעור (נדיר)

תופעות לוואי נוספות:

אדממיות וגירוי מקומי.
אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא הזכרנה בעלון,

עלִיךְ להתייעץ עם הרופא.

לדיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד

הבריאות www.health.gov.il

או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה

ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופיע על גבי האריזה.

תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• אחסן במקום קריר, מתחת ל - 25°C.

• סגור היטב.

• זהירות! חומר דליק, הרחק מאש.

• אחסן באריזה המקורית.

• לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק ניתן להשתמש במשך 3 חודשים, אך לא יאוחר מפג התוקף של התכשיר.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

Glycerin, Propylene Glycol, Brilliant blue, Purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

תמיסה בצבע כחול

תכולה: 500 מ"ל, 1000 מ"ל.

היצרן ובעל הרישום:

בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.ב. משגב 2017400.

עלון זה נערך ב- 05/2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 1085829253

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

