



سيبتادين محلول

التركيب:

المواد الفعالة والتركيز:
غلوكونات كلور هكسدين 0.5% w/v
Chlorhexidine Digluconate 0.5% w/v
كحول 70% v/v (Alcohol 70%)

لقائمة المواد غير الفعالة: انظر البند ٦ "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

عليك استخدام المستحضر بشكل صحيح.

استشر طبيباً إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

! لماذا مُعدّ الدواء؟

الدواء مُعدّ لتطهير اليدين بسرعة.

أيضاً قبل العمليات الطبية الباضعة

الفصيلة العلاجية مستحضرات تطهير.

٢ قبل استخدام الدواء

يُمنع استخدام الدواء :

- إذا كانت لديك حساسية للمواد الفعالة أو لأي من المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء. لقائمة المواد غير الفعالة - انظر البند ٦ "معلومات إضافية".
- عن الأنسجة الدماغية، غشاء المخ، والاذن الوسطى هذا الدواء ليس مخصصاً للرضع دون عمر شهرين •

! تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء

- يجب الامتناع عن ملاصقة العينين.
- في حال الاملاسة، يجب الغسل باستخدام الكثير من الماء. إذا كانت لديك حساسية لطعام أو دواء أيًا كان ، عليك إبلاغ الطبيب قبل تناول الدواء.
- يمنع اشعال سيجارة أو التعرض للنار قبل جفاف المستحضر بشكل تام.

! إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما

فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر

الطبيب أو الصيدلي بذلك.

! معلومات هامة عن قسم من مكونات الدواء
يحتوي على الكحول، مادة قابلة للاشتعال.

٣ كيف تستعمل الدواء؟

عليك أن تخصص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

طريقة الاستعمال المتبعة غالبًا:

ضع ٣ مليلتر من المستحضر على يدين نظيفتين،

قم بتمرير السائل على مسطحات اليدين،

وبفرك اليدين معاً حتى تتطاير المادة كلياً.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها .

يُمنع الابتلاع. الدواء مُعدّ للاستخدام الخارجي فقط.

إذا أقرطت في استعمال الجرعة الدوائية أو إذا ابتلع الولد

بالخطأ من هذا الدواء، توجهَ حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة

الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحباً معك عبوة الدواء.

لا تتناول الدواء في الظلمة! افحص الالصقة والوجة

في كل مرة تتناول فيها الدواء. استخدم النظارات إذا كنتَ

تحتاجها. إذا كانت لديك أسئلة أخرى فيما يتعلق باستخدام

الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

؟ الأعراض الجانبية:

مثل أيّ دواء، يمكن أن يسبب استخدام سيبتادين

أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرغ لذي

قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فقد لا تعاني من أي

منها.

يجب التوقف عن الاستخدام والتوجه للطبيب:

• في حالة حدوث حساسية في الجلد (نادر)

أعراض جانبية أخرى

احمرار وتهيج موضعي .

إذا تفاقم أيّ من الأعراض الجانبية ،

أو حين تعاني من أعراض جانبي لم يُذكر أعلاه ،

عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة عن الأعراض الجانبية عبر

الاستمارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية،

الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة:

www.health.gov.au او عن طريق الدخول الى الرابط:
/https://sideeffects.health.gov.au

٥ كيف تخزن الدواء؟

• امنع التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر

في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو

الرضع، وذلك لتفادي التسمم. لا تسبب التغيير دون

تعليمات صريحة من الطبيب.

• يُمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية

(exp. Date) الظاهر على ظهر العبوة. تاريخ انتهاء

الصلاحية هو اليوم الأخير من الشهر المُشار إليه.

• احفظه في مكان بارد، في درجة حرارة تقل عن ٢٥

درجة مئوية.

• أغلقه بإحكام .

• تحذير! مادة قابلة للاشتعال، أبعد عن النار!

• احفظه في العبوة الأصلية.

• بعد فتح القبنة لأول مرة يمكن استخدام المستحضر مدة ٣ أشهر،

ولكن ليس بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

٦ معلومات إضافية

فضلاً عن المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على

Glycerin, Propylene Glycol,

Brilliant blue, Purified water.

كيف يبدو الدواء ، وماذا تحوي العبوة

محلول ذو لون أزرق

المحتوى: 500 مليلتر، 1000 مليلتر

المنتج وصاحب التسجيل :

بن شمعون فلوريش م ض ، المنطقة الصناعية

مسغاف، بريد متجول مسغاف 2017400.

تم إعداد هذه النشرة بتاريخ 05/2023 وفقاً لتعليمات

وزارة الصحة

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في

وزارة الصحة: 1085829253

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت إضافة هذه النشرة بصيغة المتر

على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين .