

Инструкция по применению в соответствии с Положением о фармацевтах (препараты) 1986 г.

Препарат распространяется без рецепта врача

Септадин

Раствор

Состав:

Активные ингредиенты и их концентрация:

Хлоргексидина биглюконат 0,5% (Chlorhexidine Digluconate w/v 0.5%)
Спирт 70% (Alcohol 70%).

См. список неактивных ингредиентов в п. 6: "Дополнительная информация"
Перед использованием препарата внимательно прочтите инструкцию до конца.

Данный вкладыш содержит краткую информацию о препарате.

Если у вас имеются дополнительные вопросы, обращайтесь к врачу или к фармацевту. Вы должны использовать данный препарат правильным образом. Если вам необходима дополнительная информация, проконсультируйтесь с фармацевтом.

1. Для чего предназначен данный препарат?

Препарат предназначен для быстрой дезинфекции рук, включая предоперационную обработку

Терапевтическая группа
Антисептические препараты.

2. Перед использованием препарата

- Не используйте препарат:**

 - если у вас имеется чувствительность (аллергия) к активному ингредиенту или к любому из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате.

Для информации о неактивных ингредиентах см. пункт 6:

"Дополнительная информация"

 - на мозговой ткани, мозговой оболочке и в среднем ухе.
 - Младенцам в возрасте до двух месяцев.

!!! Особые предостережения относительно применения данного препарата

Избегайте контакта с глазами. В случае контакта с глазами тщательно промойте глаза большим количеством воды.

- Если у вас имеется чувствительность к какому-либо пищевому продукту или лекарству, сообщите об этом врачу перед применением препарата.
- Не зажигать сигарету и не подвергать воздействию огня до полного высыхания продукта.

Если вы принимаете или недавно принимали другие препараты, включая безрецептурные препараты и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Важная информация о некоторых ингредиентах лекарства
Содержит спирт - горючий материал.

3. Использование лекарственного препарата

Если вы не уверены в том, как надо использовать препарат, обращайтесь к врачу или фармацевту.

Инструкция по применению:

Налейте 3 мл препарата на чистые руки, распределите его по всей поверхности рук и растирайте до полного испарения.

Не превышайте рекомендуемую дозу.
Не глотать. Препарат предназначен только для наружного применения.

В случае передозировки или если препарат случайно проглотил ребенок, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы и принесите с собой упаковку препарата.

Не принимайте лекарства в темноте!
Проверяйте этикетку и дозу при каждом приеме препарата. Наденьте очки, если вы в них нуждаетесь.

Если у вас имеются дополнительные вопросы в отношении использования препарата, обращайтесь к врачу или к фармацевту.

4. Побочные явления:

Как и любое другое лекарство, "Септадин" может вызвать у некоторых людей побочные явления.

Не пугайтесь, читая список побочных явлений. Возможно, ни одно из них у вас не проявится.

Прекратите использование и обратитесь к врачу:
• в случае чувствительности на коже (редко).

Дополнительные побочные явления:
покраснение и местное раздражение.

Если одно из побочных явлений усиливается или если вы страдаете от побочных явлений, не упоминаемых в инструкции, просьба проконсультироваться с врачом. О побочных явлениях можно сообщить посредством специализированной он-лайн формы, которая находится на домашней странице сайта Министерства здравоохранения www.health.gov.il или перейти по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. Как хранить препарат?

- Избегайте отравления! Данный препарат и любые другие лекарства необходимо хранить в закрытом и недоступном для детей и/или младенцев месте во избежание отравления. Не вызывайте вроту без четкого указания врача.
- Не используйте лекарство после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

- Храните препарат в прохладном месте при температуре ниже 25°C.
- Плотно закрывайте, чтобы избежать проникновения и влажности.
- Осторожно! Горючее вещество. Хранить вдали от огня.
- Хранить в оригинальной упаковке.
- После вскрытия флакона можно использовать препарат в течение трех месяцев, но не позднее даты истечения срока действия

6. Дополнительная информация
Помимо активных веществ, препарат содержит также:
Глицерин, пропиленгликоль, бриллиантовый синий, дистиллированная вода.

Внешний вид раствора и содержание упаковки
Раствор синего цвета
Упаковка по 500 мл, 1000 мл

Производитель и владелец лицензии:
"Бен - Шимон Флорис" Птд.,
промышленный парк Мисгав,
ПОС: Мисгав 2017400.

Данная инструкция отредактирована министерства здравоохранения в соответствии с указаниями: 05.2023

Номер регистрации фармацевтического препарата в государственном реестре лекарственных препаратов Министерства здравоохранения
Израиля: 1085829253

