

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משוקלת ללא מרשם רופא

אלקוספט

תמיסה

הרכב:

החומרים הפעילים וריכוזם:
כלורהקסידין גלוקונאט 0.5%

(Chlorhexidine Gluconate 0.5%)
אלכוהול 70% (Alcohol 70%)
לרשימת החומרים הבלתי פעילים:
ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך להשתמש בתכשיר בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לחיטוי העור.

קבוצה תרפויטית - תכשירים אנטיספטיים.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשימת החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
- על רקמות המוח, קרום המוח והאוזן התיכונה.
- בתינוקות מתחת לגיל חודשיים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש

בתרופה:

- יש להימנע ממגע עם העיניים.
- במקרה של מגע, יש לשטוף עם הרבה מים.
- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.
- השימוש בתכשיר אינו מהווה תחליף לכפפות סטריליות.

• אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד "בוש מוחלט של התכשיר".

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה מכיל אלכוהול, חומר דליק.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבלוע.

התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אופן השימוש:

יש לנגב את האזור המיועד לחיטוי בצמר גפן ספוג באלקוספט נוזלי כל פעם שנדרש, אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע יד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויה והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש באלקוספט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא:

- במקרה של רגישות בעור (נדיר)
- במקרה של גירוי או נפיחות מתמשכים (נדיר)

תופעות לוואי נוספות:

פריחה, אדמומיות וגירוי מקומי. אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרנו בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

תופעות לוואי בילדים:

על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד. ראה לעיל תופעות לוואי מיוחדות שפורטו.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות www.health.gov.il או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה:

• מנע הרעלה!
תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה.

• תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• אחסן במקום קריר, בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.

• גמור היטב.

• זהירות! חומר דליק, הרחק מאש.

• אחסן באריזה המקורית.

• לאחר פתיחה ראשונה של הבקבוק ניתן להשתמש למשך 3 חודשים, אך לא יאוחר מפג התוקף של התכשיר.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם Tartrazine, Purified water

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

תמיסה אלכוהולית בצבע צהוב. תכולה: 100 מ"ל, 300 מ"ל, 500 מ"ל, 1000 מ"ל.

היצרן ובעל הרישום:

בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.ג. משגב 2017400.

עלון זה נערך ב-05.2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 00 30806 67 129

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בשלש זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

