



الإبلاغ عن الأعراض الجانبية
يمكن إبلاغ وزارة الصحة عن الأعراض الجانبية عبر
الاستمارة الإلكترونية لتبليغ عن أعراض جانبية،
الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة:
www.health.gov.il، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:
/https://sideeffects.health.gov.il/

٥. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امنع التسمم!
يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق
بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك
لتفادي التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة
من الطبيب.
- يُمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية
(exp. Date) الظاهر على ظهر العبوة. تاريخ انتهاء
الصلاحية هو اليوم الأخير من الشهر المشار إليه.
- احفظه في درجة حرارة الغرفة، في درجة حرارة
تقل عن ٢٥ درجة مئوية.
- اغلقه بأحكام.
- تحذير! مادة قابلة للاشتعال، أبعد عن النار!
- احفظه في العبوة الأصلية.
- بعد فتح القنينة لأول مرة يمكن استخدام المستحضر
مدة 3 أشهر، ولكن ليس بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

٦. معلومات إضافية

فضلاً عن المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على
Tartazine, Purified water

كيف يبدو الدواء، وماذا تحوي العبوة

محلول كحولي بلون أصفر.
المحتوى: 100 مليلتر، 300 مليلتر، 500 مليلتر،
1000 مليلتر.

المنتج وصاحب التسجيل:

بن شمعون فلوريش م ض، المنطقة الصناعية
مسغاف، بريد متجول مسغاف 2017400.

تم إعداد هذه النشرة بتاريخ 05/2023 وفقاً لتعليمات
وزارة الصحة

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة
الصحة: 129 67 30806 00

من أجل التبسيط وتسجيل القراءة، تمت صياغة هذه
النشرة بصيغة المذكّر. رغم ذلك، فهي موجهة إلى
أبناء الجنسين على حد سواء.

• يمنع أشغال سيطرة أو التعرض للنار قبل جفاف
المستحضر بشكل تام .

□ إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى،
بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية،
أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

معلومات هامة عن قسم من مكونات الدواء
يحتوي على الكحول، مادة قابلة للاشتعال.

٣. كيف تستخدم الدواء؟

عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن
متأكدًا.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.
يُمنع الإبتلاع. الدواء معدّ للاستخدام الخارجي فقط.

طريقة الاستعمال:

يجب تنظيف المنطقة المعدّة للتطهير بقطن طبي منقوع
بألكوسبيت سائل كل مرة يُطلب فيها ذلك.
إذا أفرطت في استعمال الجرعة الدوائية أو إذا ابتلع
الولد بالخطأ من هذا الدواء، توجّه حالاً إلى الطبيب أو
إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحباً معك
عبوة الدواء.

لا تتناول الدواء في الظلمة! افحص اللاصقة والوجبة
في كل مرة تتناول فيها الدواء. استخدم النظارات إذا
كنت تحتاجها.
إذا كانت لديك أسئلة أخرى فيما يتعلّق باستخدام الدواء،
استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، يمكن أن يسبّب استخدام الألكوسبيت
أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع لدى
قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فقد لا تعاني من أيّ
منها.

يجب التوقّف عن الاستخدام والتوجّه للطبيب:

- في حالة حدوث حساسية في الجلد (نادر)
- في حالة حدوث حكة أو انتفاخ متواصلين (نادر)

أعراض جانبية أخرى:

طفح جلدي، احمرار، وإثارة موضعية.
إذا تفقّمت أي من الأعراض الجانبية، أو حين تعاني من
عروض جانبية لم يُذكر أعلاه، عليك استشارة الطبيب.

الأعراض الجانبية لدى الأولاد:

على الوالدين إبلاغ الطبيب المعالج بأيّ عارض
جانبية، وكذلك بأيّ دواء آخر يتناوله الولد. انظر أعلاه
تفصيل الأعراض الجانبية الخاصة.

نشرة للمستهلك وفق أنظمة الصيدلة (مستحضرات) ١٩٨٦

يجري تسويق الدواء دون وصفة طبية

الألكوسبيت محلول

التركيب:

المواد الفعالة والتركيز:
جلوكونات كلور هيكسدين 0.5%
(Chlorhexidine Gluconate 0.5%)
كحول 70% (Alcohol 70%)

لقائمة المواد غير الفعالة: انظر البند 6
"معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجّه إلى الطبيب أو إلى
الصيدلي.
عليك استخدام المستحضر بشكل صحيح.
استشر صيدلياً إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

١. لماذا معدّ الدواء؟

الدواء معدّ لتطهير الجلد.
الصيدلة العلاجية
مستحضرات تطهير.

٢. قبل استخدام الدواء

☒ يُمنع استخدام الدواء:

- إذا كانت لديك حساسية للمواد الفعالة أو لأي من
المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء. لقائمة
المواد غير الفعالة: انظر البند 6
"معلومات إضافية".
- عن الأنسجة الدماغية، غشاء المخ، والأذن الوسطى.
هذا الدواء ليس مخصصاً للرضع دون عمر شهرين.

□ تحذيرات خاصة متعلّقة باستخدام الدواء

- يجب الامتناع عن ملامسة العينين. في حال الملامسة،
يجب الغسل باستخدام الكثير من الماء.
- إذا كانت لديك حساسية لطعام أو دواء أيّ كان، عليك
إبلاغ الطبيب قبل تناول الدواء.
- لا يشكل استخدام المستحضر بديلاً للفحازات المعقّمة.