

Инструкция по применению в соответствии с Положением о фармацевтах (препараты) 1986 г.

Препарат распространяется без рецепта врача

Алкосепт

Раствор

Состав:

Активные ингредиенты и их концентрация:

Хлоргексидин глюконат 0,5%

(Chlorhexidine gluconate 0.5%)

Спирт 70% (Alcohol 70%)

Неактивные ингредиенты:

см. пункт 6 "Дополнительная информация". Перед использованием препарата внимательно прочтите инструкцию до конца.

Данный вкладыш содержит краткую информацию о препарате.

Если у вас имеются дополнительные вопросы, обращайтесь к врачу или к фармацевту.

Вы должны использовать данный препарат правильным образом. Если вам необходима дополнительная информация, проконсультируйтесь с фармацевтом.

1. Для чего предназначен данный препарат?

Данный препарат предназначен для дезинфекции кожи.

Терапевтическая группа

Антисептические препараты.

2. Перед использованием препарата

Не используйте препарат:

- если у вас имеется чувствительность (аллергия) к активным ингредиентам или к любому из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате. Для информации о неактивных ингредиентах обращайтесь к пункту 6: "Дополнительная информация"
- на мозговой ткани, мозговой оболочке и в среднем ухе
- Младенцам в возрасте до двух месяцев.

Общие предостережения относительно использования данного препарата

- Избегайте контакта с глазами. В случае контакта - тщательно промойте глаза большим количеством воды.
- Если у вас имеется чувствительность к какому - либо пищевому продукту или лекарству, сообщите об этом врачу перед приемом препарата.
- Использование данного препарата не заменяет собой стерильные перчатки.
- Не зажигать сигарету и не подвергать воздействию огня до полного высыхания продукта.

Если вы принимаете или недавно принимали другие препараты, включая безрецептурные препараты и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Важная информация о некоторых ингредиентах лекарства

Содержит спирт - горючий материал.

3. Как использовать лекарственный препарат?

Если вы не уверены в том, как надо использовать препарат, обращайтесь к врачу или фармацевту.

Не превышайте рекомендуемую дозу. Не глотать. Препарат предназначен только для внешнего применения.

Инструкция по применению:

При необходимости протирайте участок, подлежащий дезинфекции, ватным тампоном, смоченным раствором "Алкосепт".

В случае передозировки или если препарат случайно проглотил ребенок, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы и принесите с собой упаковку препарата.

Не принимайте лекарства в темноте! Проверьте этикетку и дозу при каждом приеме препарата. Наденьте очки, если вы в них нуждаетесь.

Если у вас имеются дополнительные вопросы в отношении использования препарата, обращайтесь к врачу или к фармацевту.

4. Побочные явления:

Как и любое другое лекарство, "Алкосепт" может вызвать у некоторых людей побочные явления. Не пугайтесь, читая список побочных явлений. Возможно, ни одно из них у вас не проявится.

Прекратите использование и обратитесь к врачу:

- в случае чувствительности на коже (редко)
- в случае длительного раздражения или припухлости (редко)

Дополнительные побочные явления

Сыпь, покраснение и местное раздражение. Если одно из побочных явлений усиливается или если вы страдаете от побочных явлений, не упомянутых в инструкции, просьба проконсультироваться с врачом.

Побочные явления у детей

Родители должны сообщать лечащему врачу о любом побочном явлении и о любом дополнительном препарате, который получает ребенок. Обратитесь к списку особых побочных явлений выше.

Сообщение о побочных явлениях

О побочных явлениях можно сообщить посредством специализированной он-лайн формы, которая находится на домашней странице сайта Министерства здравоохранения www.health.gov.il

5. Как хранить препарат?

- Избегайте отравления! Данный препарат и любые другие лекарства необходимо хранить в закрытом и недоступном для детей и/или младенцев месте во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без четкого указания врача.
- Не используйте лекарство после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.
- Храните препарат при комнатной температуре, ниже 25°C.
- Плотно закрывайте, чтобы избежать проникновения воздуха и влажности.
- Осторожно! Горючее вещество. Хранить вдали от огня
- Хранить в оригинальной упаковке.
- После вскрытия флакона можно использовать препарат в течение трех месяцев, но не позднее даты истечения срока действия

6. Дополнительная информация

Помимо активных веществ, препарат содержит также: тартазин, дистиллированную воду.

Внешний вид раствора и содержание упаковки Желтый спиртовой раствор.

Упаковка по 100 мл, 300 мл, 500 мл, 1000 мл.

Производитель и владелец лицензии: "Бен - Шимон Флорид" Лтд., промышленный парк Мисгав, П.О.С: Мисгав 2017400.

Данная инструкция была отредактирована в соответствии с требованиями Министерства Здравоохранения Израиля 05.2023

Номер регистрации фармацевтического препарата в государственном реестре лекарственных препаратов Министерства здравоохранения Израиля: 129 67 30806 00

