

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

פוליסקין תמיסה

תמיסה

הרכב:

החומרים הפעילים וריכוזם:

פובידיון יודין 10% השווה ל- יודין 1%

(Povione Iodine 10% equivalent to iodine 1%)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים:

ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.

אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר בצורה נכונה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

לחיטוי בדיהומי העור - לפצעים וכוניות שטחיות.

קבוצה תרפויטית - תכשירים אנטיספטיים.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל יוד או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשימת החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- יש להימנע משימוש על איזורים נרחבים של עור פגוע.
- יש להיוועץ ברופא לפני טיפול בפצעים עמוקים.
- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, עליך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופה.

יש להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם אתה סובל או סבלת בעבר מ:

- ליקוי בתפקוד בלוטת התריס (תירואיד).

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה: החומר פובידיון יודין הנמצא בתכשיר עלול להכתיים את הבגדים.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

יש למרוח פוליסקין תמיסה על עור פגוע

4-5 פעמים ביום, עד ריפוי הפצע.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבלוע.

התרופה מיועדת לשימוש חיצוני בלבד. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לאחד מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושרן! בדוק התוויה והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה.

הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בפוליסקין תמיסה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי.

ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא:
• במקרה של גירוי או נפיחות מתמשכים (נדיר)

תופעות לוואי נוספות:

פריחה.

אם אתה מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעות לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות - <http://www.health.gov.il>
או ע"י כניסה לקישור:

[/https://sideeffects.health.gov.il/](https://sideeffects.health.gov.il/)

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה.

• תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• אחסן במקום קריר, מתחת ל- 25°C .

• סגור היטב.

• אחסן באריזה המקורית.

• ניתן להשתמש במוצר לאחר הפתיחה, עד שפג תוקפו.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

Disodium Hydrogen Phosphate, Citric Acid, Water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

תמיסה צלולה בצבע חום כהה

תכולה: 20 מ"ל

היצרן ובעל הרישום:

בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב,

ד.ג. משגב 2017400.

העלון זה נערך ב-08.23 בהתאם להנחיות

משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות

הממלכתי במשרד הבריאות: 134073167-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח

בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

