

## بوليسكين محلول

### التركيب:

#### المواد الفعالة والتركيز:

بوفيون بودي 10% يعادل يُود 1%

(Povione Iodine 10% equivalent to iodine 1%)

لقائمة المواد غير الفعالة: انظر البند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

عليك استخدام المستحضر بشكل صحيح.

استشر صيدلياً إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية.

#### 1. لماذا مُعدّ الدواء؟

الدواء مُعدّ لتطهير التلوثات الجلدية، الجروح والحروق السطحية.

الفصلية العلاجية مستحضرات تطهير.

#### 2. قبل استخدام الدواء

يُمنع استخدام الدواء:

- إذا كانت لديك حساسية للمادة الفعالة يود أو لأي من المكونات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء.
- لقائمة المواد غير الفعالة - انظر البند 6 "معلومات إضافية".

#### ⚠ تحذيرات خاصة متعلقة باستخدام الدواء

- يجب الامتناع عن الاستعمال على جلد مُصاب في مناطق واسعة.
- عليك استشارة الطبيب قبل بدء علاج جروح عميقة.
- إذا كانت لديك حساسية لطعام أو دواء أياً كان، عليك إبلاغ الطبيب قبل تناول الدواء.
- عليك استشارة الطبيب إذا كنت تعاني حاليًا أو عانيت سابقاً من اضطراب في أداء الغدة الدرقية (التايروئيد) قبل بدء العلاج.

⚠ إذا كنت تتناول، أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

⚠ معلومات هامة عن قسم من مكونات الدواء قد تتترك مادة بوفيون بودي الموجودة في المُستحضر يُعْمَأ على الملابس.

#### 3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

#### طريقة الاستعمال المتبعة غالبًا:

يجب دهن بوليسكين محلول على الجلد المُصاب 4 حتى 5 مرات يوميًا، حتى شفاء الجرح.

لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

يُمنع الابتلاع. الدواء مُعدّ للاستخدام الخارجي فقط.

إذا أفرطت في استعمال الجرعة الدوائية أو إذا ابتلع الولد بالخطأ من هذا الدواء، توجه حاليًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحبًا معك عبوة الدواء.

لا تتناول الدواء في الظلمة! افحص اللاصقة والوجبة في كل مرة تتناول فيها الدواء. استخدم النظارات إذا كنت تحتاجها.

إذا كانت لديك أسئلة أخرى فيما يتعلق باستخدام الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، يمكن أن يسبب استخدام بوليسكين محلول أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفرح لدى قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فقد لا تعاني من أي منها.

يجب التوقف عن الاستخدام والتوجه للطبيب:

- في حالة حدوث تهيج أو انتقال مواصلين (نادر)
- أعراض جانبية أخرى: طفح.

إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو حين تعاني من أعراض جانبي لم يُذكر أعلاه، عليك استشارة الطبيب.

يمكنك إبلاغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية باستخدام النموذج الإلكتروني للإبلاغ عن الأعراض الجانبية الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة <http://www.health.gov.il>

أو عن طريق إدخال الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

#### 5. كيف تخزن الدواء؟

• امنع التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء وأيّ دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لنفاذي التسمّم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.

• يُمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على ظهر العبوة.

• تاريخ انتهاء الصلاحية هو اليوم الأخير من الشهر المُشار إليه.

• احفظه في مكان بارد، في درجة حرارة تقل عن 25 درجة مئوية.

• أغلقه بأحكام،

• احفظه في العبوة الأصلية.

• يمكن استخدام المنتج بعد فتحه، حتى تاريخ انتهاء الصلاحية.

#### 6. معلومات إضافية

فضلاً عن المواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على

Disodium Hydrogen Phosphate, Citric Acid, Water.

#### كيف يبدو الدواء، وماذا تحوي العبوة

محلول صافٍ ذو لون بني غامق

المحتوى: 20 مليلتر.

#### المُنتج وصاحب التسجيل:

بن شمعون فلوريش مرضء، المنطقة الصناعية مسغاف، بريد متجول مسغاف 2017500.

تم إعداد هذه النشرة بتاريخ 08.2023 وفقا لتعليمات وزارة الصحة

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 134073167-00

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المنكر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.