

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים  
(תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

## ספיריט סליציל 2%

נוזל

**FLORIS**

**הרכב:**

החומרים הפעילים וריכוזם:

חומצה סליצילית 2% (Salicylic acid 2%)

**לרשימת החומרים הבלתי פעילים:**  
ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.**

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה, אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זאת ניתנת ללא צורך במרשם רופא ואינה מיועדת בדרך כלל לילדים ולתינוקות מתחת לגיל שנתיים.

עליון להשתמש בתכשיר בצורה נכונה, היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

### 1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לחיטוי ולקילוף העור.

**קבוצה תרפויטית - תכשיר קרטאולטי**  
מקבוצת הסליצילאטים.

### 2. לפני שימוש בתרופה

**X אין להשתמש בתכשיר אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, לרשימת החומרים הבלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
- אין למרוח על שטח גדול של העור, על עור פצוע, בהרות, כתמי לידה ויבלות שיערות.

**Ⓜ אזרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:**

- יש להימנע ממגע עם עיניים, רקמות ריריות, אם נוצר מגע כזה, יש לשטוף היטב במים
- אין להשתמש בו זמנית בתכשירים המייבשים את העור, כגון: תכשירים המבוססים על אלכוהול, סבונים או תכשירים לפצעי ברות.
- אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד יבוש מוחלט של התכשיר.

**Ⓜ לפני הטיפול בספיריט סליציל 2%, ספר לרופא אם:**

- אם הנך סובל מסוכרת.
- אם הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי.

**Ⓜ אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.**

**Ⓜ היריון והנקה**

אם הנך בהיריון שליש ראשון/אחרון או מיניקה יש היוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

**Ⓜ שימוש בילדים**

התרופה אינה מיועדת בדרך כלל לילדים ולתינוקות מתחת לגיל שנתיים, על ההורים לדווח לרופא המטפל על כל תופעת לוואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד.

**Ⓜ מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:** מכיל אלכוהול, חומר דליק.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליון לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

המינון המקובל בהעדר הוראה אחרת מרופא הוא: לרחוץ ולייבש את העור, למרוח על העור 1-3 פעמים ביום במצעות צמר גפן ספוג בחומר.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

אין לבלוע, תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעם** שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

### 4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בספיריט סליציל 2% עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למוקד רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא אם מופיעים:**

• דלקת או גירוי מקומי (נדיר).

**תופעות לוואי נוספות:**

פריחה. אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרתי בעלון, עליון להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הטופס המקוון הבית על תופעות לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il) או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. איך לאחסן את התרופה?

- תמנע הרעלה!
- תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה, תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• אחסן בטמפרטורת החדר, מתחת ל- 25°C

• מגור היטב.

• זהירות! חומר דליק, הרחק מאש.

• אחסן באריזה המקורית.

• ניתן להשתמש במוצר לאחר הפתיחה, עד שפג תוקפו.

### 6. מידע נוסף:

**נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה:**  
Alcohol, Purified water.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**  
תמיסה אלכוהולית צלולה.

תכולה: 100 מ"ל

**היצרן ובעל הרישום:**

בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב, ד.ג. משגב 2017400.

עלון זה נערך ב-05.23 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 609227486

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר, על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

