

**Инструкция по применению в  
соответствии с Положением  
о фармацевтах (препараты) 1986 г.**

Препарат распространяется без  
рецепта врача

# Спирит Салицил 2% Жидкость FLORIS

## Состав:

Активный ингредиент и его концентрация:  
салициловая кислота 2% (Salicylic acid 2%).

Неактивные ингредиенты:  
см. пункт 6 "Дополнительная информация".  
Перед применением препарата  
внимательно прочтите инструкцию  
до конца.

Данный вкладыш содержит краткую  
информацию о препарате. Если у вас  
имеются дополнительные вопросы,  
обращайтесь к врачу или к фармацевту.  
Данный препарат распространяется без  
рецепта. Обычно он не предназначен для  
детей и младенцев в возрасте до двух лет.  
Вы должны использовать данный препарат  
правильным образом. Если вам необходимо  
дополнительная информация,  
проконсультируйтесь с фармацевтом.

## 1. Для чего предназначен данный препарат?

Данный препарат предназначен для  
дезинфекции и отшелушивания кожи.

### Терапевтическая группа

кератолитический препарат из группы  
салициловых.

## 2. Перед использованием препарата

### ☒ Не используйте препарат:

- Если у вас имеется чувствительность (аллергия) к активному ингредиенту или к любому из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате. Для информации о неактивных ингредиентах см. пункт 6: "Дополнительная информация"
- Не наносите препарат на обширную поверхность кожи, на поврежденную кожу, пигментные пятна, родинки и бородавки, поправьте волосами.

### ☒ Особые предостережения относительно применения данного препарата

- Избегайте контакта с глазами и слизистыми оболочками. В случае такого контакта - тщательно промойте место контакта водой
- Не используйте одновременно с препаратами, подсушивающими кожу, например: препараты на спиртовой

основе, мыла или препараты для лечения  
акне.

- Не зажигать сигарету и не  
подвергать воздействию огня до  
полного высыхания продукта.

☒ Перед использованием препарата  
"Спирит Салицил 2%" сообщите  
врачу, если:

- вы страдаете сахарным диабетом.
- у вас имеется чувствительность к  
какому-либо продукту питания или  
лекарственному препарату.

☒ Если вы принимаете или недавно  
принимали другие препараты, включая  
безрецептурные препараты и пищевые  
добавки, сообщите об этом врачу или  
фармацевту.

☒ Беременность и грудное вскармливание  
Проконсультируйтесь с врачом или  
фармацевтом перед использованием  
препарата, если вы находитесь в  
первом/последнем триместре  
беременности или кормите грудью.

### ☒ Применение на детях

Обычно препарат не предназначен для  
детей и младенцев в возрасте до двух лет.  
Родители должны сообщать  
лечащему врачу о любом побочном  
явлении и о любом дополнительном  
препарate, который получает ребенок.

☒ Важная информация о некоторых  
ингредиентах лекарства

Содержит спирт, горючее вещество.

### 3. Инструкция по применению

Если вы не уверены в том, как надо  
использовать препарат, обращайтесь  
к врачу или фармацевту.

#### Обычная доза при отсутствии иных указаний врача:

Вымойте и осушите кожу. Наносите на кожу  
от одного до трех раз в день, с помощью  
ватного тампона, смоченного препаратом.  
**Не превышайте рекомендованную дозу.**  
Не глотать. Препарат предназначен  
только для наружного применения.

В случае передозировки или если  
препарат случайно проглотил ребенок,  
немедленно обратитесь к врачу или  
в приемный покой больницы и  
принесите с собой упаковку препарата.  
Не принимайте лекарства в темноте!  
Проверяйте этикетку и дозу при каждом

приеме препарата. Наденьте очки,  
если вы в них нуждаетесь.

Если у вас имеются дополнительные  
вопросы в отношении использования  
препарата, обращайтесь к врачу или  
к фармацевту.

### 4. Побочные явления:

Как и любое другое лекарство,  
"Спирит Салицил 2%" может вызвать у  
некоторых людей побочные явления.  
Не пугайтесь, читая список побочных явлений.  
Возможно, ни одно из них у вас не проявится.  
**Прекратите использование и обратитесь**  
к врачу **в случае:** воспаления или  
местного раздражения (редко).

### Дополнительные побочные явления: сывь.

Если одно из побочных явлений усиливается или  
если вы страдаете от побочных явлений, не  
упомянутых в инструкции, просьба  
проконсультироваться с врачом. О побочных  
явлений можно сообщить посредством  
специализированной он-лайн формы, которая  
находится на домашней странице сайта  
Министерства здравоохранения [www.health.gov.il](http://www.health.gov.il) ся.  
или перейти по ссылке <https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. Как хранить препарат?

• Избегайте отравления! Данный препарат  
и любые другие лекарства необходимо хранить  
в закрытом и недоступном для  
детей и/или младенцев месте избежание  
отравления. Не вызывайте рвоту без четкого  
указания врача.

• Не используйте лекарство после истечения  
срока годности (exp. date), указанного на  
упаковке. Срок годности относится к  
последнему дню указанного месяца.

• Храните препарат при комнатной  
температуре, ниже 25°C.

• Плотно закрывайте.

• Осторожно! Горючее вещество.

Хранить вдали от огня.

• Хранить в оригинальной упаковке.

• После вскрытия упаковки можно  
использовать препарат до истечения  
срока годности.

### 6. Дополнительная информация

Помимо активных веществ, препарат  
содержит также:

спирт, дистиллированную воду.

**Внешний вид раствора и содержание упаковки**  
Прозрачный спиртовой раствор.

Упаковка по 100 мл

**Производитель и владелец лицензии:**  
"Бен - Шимон Флориш" Ltd., промышленный  
парк Мишав, ПОС: Мишав 2017400.

Данная инструкция была проверена и  
утверждена Министерством здравоохранения Израиля 05/2023.

Номер регистрации фармацевтического  
препарата в государственном реестре  
лекарств в Министерстве здравоохранения  
Израиля: 609227486

