

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ז - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

ספיריט ויטפילד

נוזל

FLORIS

הרכב:

החומרים הפעילים וריכוזם:
חומצה בנזואית 6%, חומצה סליצילית 3%
(Benzoic Acid 6%, Salicylic Acid 3%)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים:
ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם
תשתמש בתרופה.**

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש
לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זאת ניתנת ללא צורך במרשם רופא ואינה
מיועדת בדרך כלל לילדים ולתינוקות מתחת לגיל
שנתיים.

עליך להשתמש בתכשיר בצורה נכונה.
היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת לטיפול בפטריות.

קבוצה תרפויטית

- תכשירים אנטי-פטריותיים

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר:

• אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים
או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר
מכילה התרופה. לרשימת החומרים הבלתי
פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
• אם הנך סובל מסוכרת.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש

בתרופה:

• אין להשתמש על פני שטח גדול של העור.
• אין להשתמש על עור פצוע, בהרות, כתמי
לידה ויבלות שעירות.

• אם הינך סובל מליקוי בתפקוד כלי הדם או
אם הנך סובל מסוכרת יש להיוועץ ברופא לפני
השימוש בתרופה.

• יש להימנע ממגע עם עיניים ורקמות ריריות.
אם נוצר מגע כזה יש לטשוף היטב במים.
• אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד
ייבוש מוחלט של התכשיר.

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה,
תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם
ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

היריון והנקה

אם הנך בהריון שליש ראשון/אחרון או מיניקה
יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש
בתרופה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים

של התרופה: מכיל אלכוהול, חומר דליק.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח
אם אינך בטוח.

אופן השימוש:

יש למרוח על העור פגוע 1-3 פעמים ביום,
באמצעות צמר גפן ספוג בחומר ולהניח
לחומר להתייבש.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבלוע, תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני
בלבד.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן
התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית
חולים והבא איתך התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה
בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים
אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש
בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בספיריט ויטפילד
עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק
מהשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת
תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת
מהן.

יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא:

• במקרה של דלקת או גירוי מקומי (נדיר).

תופעות לוואי נוספות: פריחה.

אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר
אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון,
עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות
באמצעות הטופס המקוון לדיווח על תופעות
לוואי שנמצא בדף הבית של אתר משרד
הבריאות www.health.gov.il
או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה!

תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום
סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות
ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה
ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה
(exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך
התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• אחסן בטמפרטורת החדר, מתחת ל - 25°C.
• סגור היטב.

• זהירות! חומר דליק, הרחק מש.

• אחסן באריזה המקורית.

• ניתן להשתמש במוצר לאחר הפתיחה,
עד שפג תוקפו.

6. מידע נוסף:

**נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה
גם:** Ethanol, Purified water

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

נוזל צלול חסר כבע.

תכולה: 100 מ"ל

היצרן ובעל הרישום:

בן-שמעון פלוריש בע"מ, פארק תעשייה משגב,
ד.נ. משגב 2017400.

עלון זה נערך ב-08.2022 בהתאמה להנחיות
משרד הבריאות

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות
הממלכתי: משרד הבריאות: 609127485

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח
בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני
המינים.

