

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) השנת 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

נוקסידיל 5% תמיסה לטיפול מקומי בקרקפת

הרכב:
החומר הפעיל: מינוקסידיל 5% Minoxidil.
חומרים בלתי פעילים: ואלרגניים בתכשיר – ראה פרק 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בעלון זה. היועץ בקרקפת או הנר זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.

התכשיר מיועד לגברים בגילאי 18-65 שנים במקרים של התקררות מהסוג התורשתי בלבד. אם לא תחווה שיפור בצמיחת השיער לאחר שנה אחת של שימוש, עליך להפסיק את הטיפול.

1. למה מיועדת התרופה?

התכשיר מיועד להצמחת שיער הקרקפת אצל גברים בריאים בגילאי 18-65 שנים במקרים של התקררות מהסוג התורשתי בלבד. יש להיוועץ ברופא המטפל על מנת לוודא שסוג הנשירה שלך מתאים לטיפול בתכשיר זה.

קבוצה תרופתית: מרחיבי כלי דם, במתן מקומי, לטיפול בנשירת שיער.

התרופה מכילה מינוקסידיל, אשר נחשב לחומר שפועל באמצעות סיוע לזרימת הדם אל זקיקי השיער בקרקפת.

יעילותה של התרופה היא הגבוהה ביותר בגברים הסובלים מנשירת שיער או שיער דליל בחלק העליון של הקרקפת.

הסבירות לתוצאות טובות היא הגבוהה ביותר בגברים צעירים, גברים שלהם נשירת שיער זמן קצר או שיש להם אזורי צמיחה קטנים. אם אתה קירח במשך שנים רבות או שיש לך שטח התקררות גדול, הסבירות שהתרופה תועיל לך היא נמוכה.

נשירת שיער תורשתי ניתן לזהות על פי הסימנים הבאים:

- דפוס נשירת השיער (ראה אירום).
- היא מתחילה בהדרגה ומתקדמת.
- יש לך היסטוריה משפחתית של נשירת שיער.
- נשירת השיער אינה מלווה בתסמינים אחרים.



מה עליך לדעת לפני תחילת השימוש בתרופה זו
תרופה זו מתאימה לרוב האנשים, אם לאנשים מסוימים אסור להשתמש בה. במקרה של ספק, שוחח עם הרופא או הרוקח.

2. לפני השימוש בתרופה: אין להשתמש בתרופה אם:

- הנך אישה.
- גילך קטן מ-18 שנים או גדול מ-65 שנים.
- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל מינוקסידיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).
- אינך בטוח אם הנשירה ממנה אתה סובל על רקע תורשתי.
- יש לך נשירת שיער הנגרמת על ידי טיפול תרופתי.
- אתה קירח לחלוטין או שכל שיער הגוף שלך נשר. הגורם לנשירת השיער שלך אינו ידוע או שההתקררות פתאומית ובלתי צפויה.
- אתה סובל מייתר לחץ דם, גם אם אינו מטופל.
- אתה סובל מבעיה כלשהי המשפיעה על עור הקרקפת (כגון: כווית שמש, פסוריאזיס וכיוצא בזה).
- אתה מגלח את הקרקפת שלך.
- אתה משתמש בקורמים, משחות או תרופות למיניהם שנועדו לטפל בבעיות קרקפת, כגון: דיטרנול - לטיפול בפסוריאזיס, טרטינואין הנועד לטיפול באקנה או בעיות עור אחרות, קורטקוסטרואידים - חומרים אנטי-דלקתיים, פטרולוסט - מרכיב נפוץ בשמנים או ג'ל לשיער.
- יש לך חבישה או תחבושת מכל סוג שהוא על הקרקפת.
- אינך בטוח שעור הקרקפת שלך בריא ותקין.
- אם אחד הסמנים שלעיל רלוונטי לגביך כעת או שהיה רלוונטי בעבר יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח לפני השימוש.

זהירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח במקרים הבאים:
- אם אינך בטוח לחלוטין טרם שימוש בתרופה שעור הקרקפת שלך בריא
- אם הינך סובל מליקוי בתפקוד הלב לרבות הפרעות קצב או מהירות, תעוקת זהה או כאבים בחזה ו/או בעיות בזרימת הדם.

זהירות נוספות

- אם מינוקסידיל חודר לגורם הדם, הוא יכול לגרום לתופעות לוואי מסוימות הנוגעות מולחץ דם נמוך, כגון כאבים בחזה, קצב לב מהיר, תחושת עילפון, סחרחורת, נפיחות של כפות הידיים והרגליים, אדמומיות שאינה חולפת או גירוי של הקרקפת. אם אתה חווה תופעות לוואי מתוך רשימה זו, הפסק את השימוש בתרופה ופנה לרופא.
- בעת השימוש בתרופה על פי ההמלצות, מאוד לא סביר שתופעות לוואי אלה יופיעו. עם זאת, ישנו סיכון שהתרופה עלולה להיכנס לרדם הדם אם נעשה בשימוש מופרז או אם קיימת בקרקפת בעיה כגון פסוריאזיס. סרטן חשוב מאוד שתשתמש בתרופה בהתאם להמלצה ותקפיד לפעול על פי ההוראות. ראה פרק 3.
- זהירות: נוזל דליק, יש להרחיק מחום/ניצוצות/להבה פתוחה/משתחים חמים. אסור לעשן בקרבנות. הימנע מחשיפה של המכל והתכולה שלו ללהבות חשופות במהלך השימוש, האחסון וההשלכה. הקפד לשמור את המכל כשהוא סגור היטב. יש לאחסן במקום מאוורר היטב.
- הימנע ממגע עם העיניים, הפה, עור פגום ואזורים רגישים. אם מרחת את התמיסה בשוגג על אזורים אחרים בגוף חוץ מהקרקפת, שטוף את האזורים היטב עם כמות רבה של מים.
- אין למרוח על אזורים אחרים בגוף חוץ מהקרקפת. בליעה בשוגג עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות בלב. לכן יש לשמור על מוצר זה מחוץ להישג ידם של ילדים.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח לגבי תרופות מהקבוצות הבאות:

- תרופות מסוימות הורדת לחץ דם (אזודילורטם) – מרחיבי כלי דם, למשל הידרלזין. קיים סיכון לנך שמינוקסידיל, המרכיב הפעיל בתרופה, יגיב עם תרופות אלו ויגביר את השפעתן.
- אם אינך בטוח לגבי התרופה שאתה משתמש בה הראה את האריזה לרוקח.
- אם אחד מהסמנים שלעיל רלוונטי כעת או שהיה רלוונטי בעבר, יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח.

עישון

התכשיר דליק, לכן אין לעשן בקרבנות.

הריון, הנקה ופוריות

התרופה מיועדת לגברים בלבד ואינה מיועדת לשימוש על ידי נשים. אין מידע בנוגע להשפעת השימוש בתרופה לנושא הפוריות.

נהיגה ושימוש במכוונת

התרופה עלולה לגרום לסחרחורת או ללחץ דם נמוך. אם אתה חווה את תופעות הלוואי האלו, הימנע מנהיגה או מפעלת מכוונת.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התכשיר מכיל 523 מ"ג פרופילן גליקול ב 1 מ"ל תמיסה אשר עשוי לגרום לגירוי עור הקרקפת. התכשיר מכיל גם 258 מ"ג אלכוהול ב 1 מ"ל תמיסה, שווה ערך ל 25.8% W/W במגעם בעיניים או במגע עם עור פגוע עשוי לגרום לצריבה ולגירוי. במידה והתרופה נכנסת לעיניים, לפה או באה במגע עם עור פגום או חתך בעור, יש לטשוף את האיזור תחת מי ברז זורמים קרים.

3. כיצד שתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה. יש להשתמש בתרופה אח ורק בשימוש מקומי וחיצוני, ישירות על הקרקפת.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

הכמות המסוימת לטיפול הינה 2 מ"ל ביום: 1 מ"ל בבוקר ו-1 מ"ל בערב (1 מ"ל = 1 חתכות). יש לרווח לפחות 12 שעות בין שימוש אחד לשי. שימוש תכוף ו/או בכמות גדולה יותר לא יגביר את צמיחת השיער אך עלול לגרום לתופעות לוואי חמורות יותר, לכן יש להקפיד על מידת המנה באמצעות מספר הליציאות המומלץ. אין לעבור על המנה המומלצת.

יש להשתמש בתכשיר על שיער וקרקפת בשיים, בכמות כוללת של 1 מ"ל על כל אזורי ההתקררות. אם ניתן, יש להתחיל במרכז ההתקררות ובאצבע נקייה יש לפזר את החומר. לאחר המרחיח יש לטשוף היטב את הידיים וכל איזור שבא במגע עם התמיסה. יש להימנע מטשטוף התרופה על הפנים או על אזורי עור שמחוץ לאזור ההתקררות. במידה ונשפך כמות על אזור שאינו הקרקפת יש לטשוף היטב עם הרבה מים. יש להיזהר מלשאוף את התרסיס בעת התזתו על הקרקפת.

לאחר השימוש בתרופה: יש להימנע מחפיפת הראש

במשך כשעתיים. אין להשתמש במיבש שיער לזירוז ייבוש השיער מהתמיסה. אין להניח את הראש על הכר לפחות שעה אחרי מרחיח הקרקפת. יש להימנע מחשיפת השיער לשמש.

אופן השימוש:

א. יש להסיר את מכסה הפלסטיק ולהרכיב במקומו את המתז.



ב. יש להחזיק את הבקבוק בצורה אנכית ולהתיז את התמיסה על האזור המטופל ולפזרה על כל האזור הרצוי בעזרת קצות האצבעות. כמות התמיסה הכוללת שישעה בה שימוש (על כל אזורי ההתקררות יחד) היא 7 חתכות לכל היותר.



ג. יש לנגב את המתז לאחר השימוש.

יש לטשוף את הידיים ביסודיות תמיד לאחר המרחיח, ובמקרה שמרחת את התמיסה בטעות על חלקים בגופך מלבד הקרקפת, שטוף אותם היטב עם כמות רבה של מים.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול?

יש למרוח את התכשיר רק כאשר הקרקפת והשיער יבשים לגמרי. יש להתייז בטיפול על פי ההוראות.

משתמשים צעירים ו/או שתהליך התקררותם החל לפני זמן לא רב ו/או שאזור ההתקררות אצלם אינו נרחב עשויים להיות ממוצאות טובות יותר. אם תהליך ההתקררות החל לפני שנים רבות ו/או שטח ההתקררות נרחב, יסיוני הצלחת הטיפול נמוכים.

שימוש ממושך בתכשיר:

- ייתכן שתצטרך להשתמש בתרופה זו פעמיים ביום למשך חודשים לפחות לפני שתראה צמיחת שיער חדשה, זאת מכיוון שצמיחת השיער היא תהליך איטי.
- השיער שיצמח בהתחלה עשוי להיות רך ופולמוטי, אך בסופו של דבר הוא אמור להפוך להיות זהה לשיער רגיל.
- לאחר שהשיער יתחיל לצמוח מחדש, עליך להמשיך להשתמש בתרופה פעמיים ביום כדי שהצמיחה תימשך. בניסויים קליניים עם מינוקסידיל, 3 מתוך 5 גברים דיווחו על צמיחת שיער מחודשת לאחר 48 שבועות של שימוש מתמשך בתרופה זו.
- כאשר אתה מפסיק להשתמש בתרופה, השיער שצמח מחדש עלול להיעלם לאחר 3-4 חודשים ותהליך נשירת השיער וההתקררות ימשך.
- אם לא תחווה שיפור בצמיחת השיער לאחר שנה אחת של שימוש, עליך להפסיק את הטיפול.
- אם בכל עת במהלך השימוש יהיו לך חששות לשהם, עליך להתייעץ עם הרופא או הרוקח.

אם נטלת תרופה מינון יתר או אם בטעות בלע ילד או מבוגר מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא איריות התרופה איתך (עם בקבוק התרופה מכיוון שיתכן שהרופא ירצה לקבל מושג על כמות החומר שנבלעה).

אם שכחת למרוח מנה של התרופה

אם תחמיץ מריחה אחת או שתיים, פשוט המשך את הטיפול כרגיל, כאילו לא החמצת את המנה - אין להכפיל את המינון או את תדירות השימוש. **שים לב: לא בליעם.** תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד על הקרקפת. יש להימנע משיאפת התרסיס. בליעת התכשיר עלולה לגרום לבעיות קשות בתפקוד הלב.

אין ליטול תרופה בחושך! בודק תהוית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בתרופה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרה רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא מיד אם מתפתחת אחת או יותר מהתופעות הבאות:

- כאב בחזה.
- נפיחות בפנים, בשפתיים, בפה, בלשון או בגרון

שלוליה לגרום לקושי בבליעה או בנשימה.

יש להפסיק את השימוש ולהתייעץ עם הרופא אם מתפתחת אחת או יותר מהתופעות הבאות:

- תגובות אלרגיות הכוללות נפיחות בפנים, אדמומיות או גירוד בעור או לחץ בגרון.
- לחץ דם נמוך.
- פעימות לב מהירות או מודעות מוגברת לדופק (דפיקות לב).
- תחושת עילפון או סחרחורת.
- נפיחות בכפות הידיים או הרגליים, קוצר נשימה.
- עלייה תאומית ללא מוסברת במשקל.
- אדמומיות או פריחה מקומית שאינן חולפות.

נשירת שיער שעשויה להופיע בתחילת הטיפול (2-6 שבועות ראשונים לטיפול) תופעה זו עשויה לקרות כתוצאה משינוי במחזור הצמיחה והיא אמורה לחלוף בתוך שבועיים. אם נשירת שיער זו נמשכת מעל שבועיים, הפסק להשתמש בתרופה ושוחח עם הרופא.

שינוי במרקם השיער (נדיד- עשוי להופיע בעד משתמש אחד מתוך 1,000) או בצבע השיער (שכיחות אינה ידועה). אם זה קורה, עליך להפסיק להשתמש בתרופה.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות מאוד (עשויות להופיע ביותר ממשתמש אחד מתוך 10):

- כאב ראש.

תופעות לוואי שכיחות (עשויות להופיע בעד משתמש אחד מתוך 10):

- צמיחת שיער לא רצויה באיברי גוף אחרים, כולל על הפנים.
- גרד או דלקת עור (דרמטיטיס).

תופעות לוואי לא שכיחות (עשויות להופיע בעד משתמש אחד מתוך 100):

- בחילה.

תופעות לוואי שכיחות אינה ידועה (תופעות שכיחותות טרם נקבעו):

- מזב רוח דיכאון.
- גירוי בעיניים.
- הקאה.

גירוי בקרקפת, כגון אדמומיות מקומית, יובש וקשקשיים בעור. יכול להתרחש בגלל החומר פרופילן גליקול שבתרופה. לרוב מדובר בהשפעה זמנית בלבד, אך אם היא אינה חולפת עליך להפסיק להשתמש בתרופה זו.

פריחה דמית אקנה, פריחה מגרדת, שלפוחיות, דימום או כיב.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מהמרחיח, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרנו בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שממצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המוקן לדיווח על תופעות לוואי, או ע"כ ניסה לקישור: <http://sideeffects.health.gov.il>

בנוסף, ניתן לדווח להברת פאדאגיס ישראל פרמצבטיקה בע"מ באמצעות הכתובת הבאה: Padagis.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגורם להקאה לרוב היא הוראה מפורשת מהרופא.
- אם להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה והבקבוק, תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש. יש לאחסן מתחת ל-25°C.
- המוצר דליק. יש להרחיק ממקור אש ו/או חום. אין להדליק סיגריה או להחשיף לאש עד ליבוש מוחלט של התכשיר.
- לאחר הפתיחה הראשונה יש להשתמש בתוך חודש, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה, המופיע על אריזת התרופה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Propylene glycol, alcohol, purified water

כיצד רואית תרופה ומה תוכן האריזה? האריזה מכילה בקבוק אחד או שני בקבוקים. כל בקבוק מכיל 60 מ"ל תמיסה. האריזה מכילה גם מזה.

נערך ביוני 2023 על פי הנחיות משרד הבריאות. מספר רישום התרופה בפקט התרופות הממלכתי משרד הבריאות: 144-70-33300.

היצרן ובעל הרישום וכותבתו: פאדאגיס ישראל פרמצבטיקה בע"מ, רחוב רקפת 1, שוהם.

לשם הפטנט והלקחת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.

22.06.2023

30202863