

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986
يُسوّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

أوفلوكسTM

محلول للعينين

المادة الفعّالة وتركيزها:

Ofloxacin 0.3% w/v

أوفلوكساسين 0.3% w/v

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية في المستحضر: أنظر الفصل 2 البند 'معلومات مهمة عن قسم من مركّبات الدواء' والفصل 6 'معلومات إضافية'.

اقرأ النشرة بتمعّن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك/من أجلك، لا تعطه للآخرين. لأنّه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك أن مرضهم/حالتهم الصحيّة متشابهة/متشابهة.

هذا الدواء غير معدّ للأطفال أو للمراهقين.

1. لم أعد هذا الدواء؟

أوفلوكس يُستعمل لعلاج أنواع عدوى خارجية في العين، الناجمة عن كائنات حية (متعضيات) الحساسة لأوفلوكساسين. المجموعة العلاجيّة: مضادّ عدوى من مجموعة الفلوروكوينولونات.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وُجدت لديك حساسيّة (أرجية) للمادّة الفعّالة أوفلوكساسين أو لأيّ واحد من المركّبات الإضافية التي يحتويها الدواء التي تظهر في الفصل 6 (مثلاً، كلوريد البنز الكونيوم)، أو لكوينولونات أخرى.
- لدى الأطفال والمراهقين.
- كنت حاملاً، من المحتمل أن تكوني حاملاً أو مرضعة.

تحذيرات خاصّة متعلّقة باستعمال الدواء

قبل العلاج بـ أوفلوكس، أخبر الطبيب إذا كان لديك أو إذا كنت تعاني من:

- ضرر أو تقرّح في سطح العين.
- صرع أو اضطرابات دماغيّة أخرى أو مشاكل عصبية.
- مشاكل في الكبد أو في الكلى.
- جفاف شديد.

غير موصى باستعمال عدسات لاصقة للمتعالجين الذين يحصلون على علاج لإلتهاب العينين، لكن إذا كان يجب عليك استعمال عدسات لاصقة، اقرأ البند 'معلومات مهمة عن قسم من مركّبات الدواء'.

تمّ التبليغ عن مشاكل جلد خطيرة عند استعمال مستحضرات أخرى التي تحتوي على أوفلوكساسين. من الممكن أن يزيد أوفلوكس الحساسية لأشعة الشمس. يجب عليك الإمتناع عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة أو للشمس خلال استعمال أوفلوكس.

مشاكل قلب:

يجب عليك اتخاذ الحذر عند استعمال دواء من هذا النوع، إذا:

- كان لديك تاريخ عائليّ أو إذا وُلدت مع مسافة QT مطوّلة (التي تظهر في تخطيط كهربيّة القلب - ECG، الذي يُسجل فعالية القلب الكهربائيّة).
- كان لديك نقص في توازن الأملاح في الدم (خاصة مستوى منخفض من البوتاسيوم أو المغنيسيوم في الدم).
- كانت لديك وتيرة نظم قلب بطيئة جداً (تدعى 'bradycardia').
- كان قلبك ضعيفاً (قصور عمل القلب).
- أصبت في الماضي بنوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب).
- أنت امرأة، أو أنت مسنّة، أو تتناول أدوية أخرى التي تسبب تغييرات غير سليمة في ECG (تمعّن في بند 'التفاعلات بين الأدوية').

الأطفال والمراهقون
لا يجوز استعمال أوفلوكس لدى الأطفال أو المراهقين.

التفاعلات بين الأدوية
إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص، إذا كنت تتناول:
عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت تتناول أدوية أخرى التي بإمكانها أن تؤثر في نظم القلب: أدوية التي تنتمي إلى مجموعة مضادات اضطرابات نظم القلب (مثل كويندين، هيدروكويندين، ديسوبيراميد، أمبودارون، سوتالول، دوفيتيليد، إيبوتيليد)، مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، أدوية معينة مضادة للجراثيم (التي تنتمي إلى مجموعة الماكروليديات)، أدوية معينة مضادة للذهان.

الحمل والإرضاع
يُمنع استعمال أوفلوكس أثناء الحمل أو إذا كنت مرضعة. إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تظننين أنك قد تكونين حاملاً، أو تخططين للحمل، عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

السياقة واستعمال الماكينات
أوفلوكس ممكن أن يؤدي إلى تشوش الرؤية على مدى قصير من الوقت أثناء الاستعمال. يُمنع السياقة وتشغيل الماكينات الخطيرة، إلا إذا كانت رؤيتك واضحة.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء
يحتوي أوفلوكس على كلوريد البنزوكونيوم.
يحتوي هذا الدواء على 0.05 ملغ كلوريد البنزوكونيوم في كل 1 ملل محلول، ما يعادل 0.005% w/v.

كلوريد البنزوكونيوم هو مادة حافظة قد تمتصها العدسات اللاصقة اللينة وهو قد يغير لونها. يوصى بعدم استعمال العدسات اللاصقة أثناء استعمال هذا المستحضر. ولكن، قد تكون هناك حالات لا يمكن فيها تجنب استعمال العدسات اللاصقة. في هذه الحالات، عليك إزالة العدسات اللاصقة قبل استعمال هذا الدواء وإعادتها إلى العينين بعد مرور 15 دقيقة.

قد يسبب كلوريد البنزوكونيوم أيضاً تهيجاً في العين، تحديداً إذا كنت تعاني من جفاف العينين أو من اضطرابات في القرنية (الطبقة الشفافة في مقدمة العين). إذا كان لديك شعور شاذ في العين، وخز أو ألم في العين بعد استعمال هذا الدواء، تحدث مع الطبيب.

3. كيف تستعمل الدواء؟





يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.

البالغون

الجرعة المتبعة عادة هي:
قطرة واحدة أو قطرتين، ثلاث أو أربع مرّات في اليوم، في العين/العينين المصابة/المصابتين. في معظم الحالات، يجب الامتناع عن الاستمرار في العلاج لأكثر من عشرة أيام. تحدث مع الطبيب إذا استمرت الأعراض أكثر من عشرة أيام.
يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.
يُمنع البلع.

تعليمات الاستعمال:

يسوق أوفلوكس على شكل قطرات عيون. يظهر في الوصفة الطبية الخاصة بك عدد القطرات التي يتعين عليك استعمالها في كل جرعة.
يُمنع وضع عدسات لاصقة أثناء تقطير الدواء. بعد التقطير، يجب الانتظار على الأقل 15 دقيقة قبل إعادة وضع العدسات اللاصقة.
يجب تقطير قطرات العينين بالطريقة التالية:

1.		يجب غسل اليدين. وإمالة الرأس للخلف ومن ثم النظر باتجاه السقف.
2.		يجب سحب الجفن السفلي نحو أسفل برفق حتى يتشكل جيب صغير.
3.		يجب قلب القنينة والضغط، حتى تتحرر قطرة واحدة إلى داخل كل عين تحتاج إلى العلاج.
4.		حرّر الجفن السفلي، واغمض العين لمدة 30 ثانية.

يجب الامتناع من ملامسة طرف القطارة للعين أو أي شيء آخر.
احرص على إغلاق القنينة جيدا بعد الاستعمال فورا.
من المهم جدا تقطير قطرات العيون بشكل صحيح. إذا كانت لديك أسئلة، اسأل الطبيب أو الصيدلي.
استعمال لمدى طويل ممكن أن يؤدي إلى عدوى جرثومية جديدة التي لا يمكن علاجها بنجاح بواسطة أوفلوكس.

إذا تناولت جرعة أعلى عن طريق الخطأ

من المستبعد أن يُسبب تقطير قطرات كثيرة إلى أعراض جانبية غير مرغوبة. إذا قطرت عن طريق الخطأ الكثير من القطرات في العين/العينين، يجب تقطير الجرعة التالية في موعدها الاعتيادي.
إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه، فوراً، إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول الدواء، قَطُر فور تذكرك. إلا إذا كان قد حان موعد الجرعة التالية، في هذه الحالة يجب عليك تخطي الجرعة المنسية والاستمرار في روتين العلاج العادي.
يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.
حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن استعمال هذا الدواء قبل استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

يجب استعمال أوفلوكس وفق تعليمات الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية متعلقة باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال أوفلوكس أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

أعراض جانبية شديدة:

إذا ظهرت لديك أي أعراض جانبية لها علاقة برد فعل تحسسي، فيجب التوقف عن استعمال أوفلوكس والتوجه فوراً إلى الطبيب.
علامات وأعراض رد فعل تحسسي مبينة فيما يلي:

ردود فعل تحسسية:

- نسبة شيوها غير معروفة (أعراض لم يتم تحديد تواترها بعد)
- ردود فعل تحسسية في العين (بما في ذلك حكة في العين و/أو في الجفن).
- التهاب الجلد نتيجة حساسية (بما في ذلك طفح جلدي، حكة أو شرى).
- رد فعل تحسسي فجائي خطير ومهدد للحياة (رد فعل تأقي) الذي يظهر كانتفاخ تحت الجلد، والذي ممكن أن يظهر في مناطق مثل الوجه، الشفتين أو أجزاء أخرى من الجسم، انتفاخ الفم، اللسان أو الحلق، ممكن أن يؤدي إلى إنسداد مجاري التنفس الذي بدوره ممكن أن يؤدي إلى صفير، صعوبات في البلع، صعوبات في التنفس أو ضيق تنفس.
- لقد تم التبليغ عن طفح جلدي الذي ممكن أن يشكل خطراً على الحياة (متلازمة ستيفن جونسن، تقشر الأنسجة المتموتة البشورية التسممي) نتيجة استعمال أوفلوكس، في البداية، يظهر على شكل بقع مائلة للأحمر شبيهة بلوحة الهدف أو بقع دائرية، وفي حالات كثيرة مع بثور في وسطها، في القسم المركزي من الجسم.

معروف أيضاً عن حدوث الأعراض الجانبية التالية:

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض تظهر لدى 10-1 مستعملين من بين 100

- تهيج في العين
- شعور غير مريح في العين

نسبة شيوها غير معروفة (أعراض لم يتم تحديد تواترها بعد)

أعراض جانبية التي تؤثر في العين:

- اضطرابات في الرؤية
- تدميع
- التهاب
- إحمرار
- حساسية للضوء

- شعور بوجود جسم غريب في العين
- انتفاخ في العين
- انتفاخ حول العين (يشمل انتفاخ الجفن)
- ألم في العين
- جفاف (وخز أو حرقاة خفيفان)
- أعراض جانبية التي تؤثر في الجسم:

- دوام
- صداع
- إنعدام الشعور
- غثيان

أعراض جانبية التي تؤثر على القلب:

- وتيرة نظم قلب سريعة وغير سليمة
- وتيرة نظم قلب غير منتظمة تشكل خطرا على الحياة
- تغيير في وتيرة نبض القلب (يدعى 'مساافة QT مطوّلة'، الذي يظهر في نشاط القلب الكهربائي - ECG).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن أعراض جانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة علاج بالأدوية" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى إستمارة خاصة معدة للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقبؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- يجب الحفظ ما دون الـ 25°C.
- أبعد عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على ملصق القنينة وعلى الكرتون الذي يحتوي على القنينة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. يُمنع استعمال هذا المنتج إذا كان ختم حماية القنينة مكسوراً. تخلص من القنينة بعد مرور 28 يوماً على فتحها، حتى إذا تبقى فيها محلول. يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحي أو حاوية النفايات المنزلية. يجب استشارة الصيدلي لمعرفة كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستعملها. هكذا تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء، أيضاً على:

Sodium chloride, benzalkonium chloride, hydrochloric acid (for pH adjustment), sodium hydroxide (for pH adjustment) and purified water.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

أوفلوكس هو مستحضر قطرات عينين ومتوفر في قنينة 5 ملل. المحلول هو شفاف حتى أصفر-أخضر فاتح.

اسم المنتج وعنوانه: أليرجان فارماسوتيكالز إيرلندا، طريق كاستل بار، ويست پورت، مقاطعة مايو، إيرلندا.

صاحب التسجيل وعنوانه: أبفي بيوفارما م.ض.، شارع هشارش 4، هود هشارون، إسرائيل.

تمّ التحرير في آذار 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 117-23-27973
لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.