

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

אופלוקסTM

תמייסה לעיניים

חומר פעיל ורכיבים:
Ofloxacin 0.3% w/v
אופלוקסצין w/v 0.3%

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 2 סעיף 'מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה' ופרק 6 'מידע נוסף'.

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלות/עבורה, אל תעבור אורה אותה אחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם/מצבם הרפואי דומה.
תרופה זו אינה מיועדת **ליילדים או למתבגרים**.

1. למה מיועדת התרופה?

אופלוקס משמש לטיפול בזיהומי חיצוניים של העין, הנגרמים על ידי יצורים חיים (אורגניזמים) הריגשים לאופלוקסצין.

קבוצה רפואיית: נגד זיהום מקבוצת הפלואורוקווינולונים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל אופלוקסצין או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה המופיעים בפרק 6 (לדוגמה, בנזילקוניאם קלורייד), או לקוינולוניים אחרים.
- בילדים ובמתבגרים.
- הינך בהריון, יתכן והינך בהריון או מניקה.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול באופלוקס ספר לרופא אם יש לך או אם הנך סובל מ:

- פגם או כיב בפני השטח של העין.
- אפילפסיה או הפרעות מוחיות אחרות או בעיות עצביות.
- בעיות בכבד או בכליות.
- התיבשות חמורה.

שימוש בעדשות מגע אינו מומלץ למטופלים המקבלים טיפול לדלקת עיניים, אך אם עליך להשתמש בעדשות מגע, קרא את סעיף 'מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה'.
בעיות עור חמורות דוחו בשימוש בתכשירים אחרים המכילים אופלוקסצין.

אופלוקס עלול להגבר את הריגשות לאור שימוש. עליך להימנע מחשיפה לאור שימוש ישיר או לשימוש במהלך

השימוש באופלוקס.

בעיות לב:

עליך לנקוט זהירות בשימוש בתרופה מסווג זה, אם:

- יש לך היסטוריה משפחתית או שנולדת עם מרוחQT מוארך (הנראת באק"ג, הרושם את הפעולות החשמליות של הלב).
- יש לך חסור איזון מלחים בدم (במיוחד רמה נמוכה של אשלגן או מגנזיום בדם).
- יש לך קצב לב איטי מאד (נקרא 'ברדי-קרדיה').
- יש לך לב חלש (אי ספיקת לב).
- אם עברת בעבר התקף לב (אוטם שריר הלב).
- את אישת, או את/ה קשיש/ה, או נוטל תרופות אחרות הגורמות לשינויים בלתי תקינים באק"ג (עין בסעיף 'תגובהות בין-תרופתיות').

ילדים ומתבגרים

אין להשתמש באופלוקס ילדים או במתבגרים.

תגובהות בין-תרופתיות

אם אתה לוקח או אם لكחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או ברוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

אתה חייב לספר לרופא אם אתה נוטל תרופות אחרות שיכולות להשפיע על קצב הלב: תרופות השיכוכת לקבוצת נוגדי הפרעות קצב (לדוגמה, קוינידין, הידרוקווינידין, דיזופיראמיד, אמיודארון, סוטולול, דופטיליד, איבוטיליד), נוגדי דיכאון טריציקליים, תרופות אנטי-מיקרוביאליות מסוימות (השיכוכת לקבוצת המקרולידיים), תרופות אנטי-פסיכוכיות מסוימות.

הירון והנקה

אין להשתמש באופלוקס במהלך הירון או אם מתנתקה. אם את בהריון או מניקה, חשוב שיתacen שאתה בהריון או מתנתקה להרות, היועץ ברופא או ברוקח לפני נטילת תרופה זו.

נהיגה ושימוש במכונאות

אופלוקס עלול לגרום לטעות ראייה לטוח זמן קצר בזמן השימוש. אל תנגע ואל פעולה מכונות מסוכנות, אלא אם כן ראייתך ברורה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

אופלוקס מכיל בנזלקוניום כלורייד.

תרופה זו מכילה 0.05 מ"ג בנזלקוניום כלורייד בכל 1 מ"ל תמיישה, שהוא שווה-ערך ל- 0.005% .

בNazalekoniom כלורייד הוא חומר משמר העולול להיספג על ידי עדשות מגע רכות ועלול לשנות את צבע עדשות המגע. מומלץ לא להשתמש בעדשות מגע בזמן הטיפול בתכשיר זה. אולם, ניתן מצבים שבהם לא ניתן להימנע משימוש בעדשות מגע. במקרה אלה, עליך להסיר את עדשות המגע לפני השימוש בתרופה זו ולהחזיר אותן לעיניים בעבר 15 דקות.

בNazalekoniom כלורייד עלול גם לגרום לגירוי בעין, במיוחד אם יש לך עיניים יבשות או הפרעות בקרנית (השכבה השקופה בקדמת העין). אם יש לך תחושה מזורה בעין, עקצוץ או כאב בעין לאחר השימוש בתרופה זו, דבר עם הרופא.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בונגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

מבוגרים

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

טיפול אחת או שתי טיפולות, שלוש או ארבע פעמיים ביום, בעין/عينים הנגועה/ות. ברוב המקרים אין להמשיך טיפול במשך יותר מעשרה ימים. דבר עם הרופא אם התסמים נמשכים יותר מעשרה ימים.

אין לעبور על המנה המומלצת.

אין לבלווע.

הוראות שימוש:

אופולקס מגיע בצורת טיפולות עיניים. במרשם שלך כתוב כמה טיפולות להשתמש בכל מנה. אין להרכיב עדשות מגע בזמן הצלפת התרופה. לאחר הצלפה יש להמתין לפחות 15 דקות לפני הרכבת העدسות בחזרה.

יש להזיף את טיפולות העיניים בדרך הבאה:

.4.		.3.		.2.		.1.	
שחרר את העפוף התחתון, ועוזם את העין למשך 30 שניות.	יש להפוך את הבקבוק וללחוץ על מנת לשחרר טיפולת לתוכ כל עין הΖקוקה לטיפול.	יש למשוך בעדינות את העפוף התחתון כלפי מטה עד לצירת כיס קטן.	יש לשטוף ידיים. יש להתוט את הראש לאחור ולהביט בתקרה.				

יש להימנע מגע של קצה הטעפה בעין או בכל דבר אחר. הקפד לסגור את הבקבוק היטב מיד לאחר השימוש. חשוב מאד להזיף את טיפולות העיניים כראוי. אם יש לך שאלות, שאל את הרופא או הרוקח. שימוש ארוך טווח עלול לגרום לזמן חידקי חדש, אשר לא יהיה ניתן לטפל בו בהצלחה באמצעות אופולקס.

אם נטلت בטעות מינון גבוהה יותר

לא סביר שהצלפה של טיפולות רבות מדי תגרום לתופעות לוואי לא רצויות. אם בטעות הצלפת טיפולות רבות מדי, לעין/ים, יש להזיף את המנה הבאה בזמן הרגיל. אם בטעות בלע' לצד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה אליו.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול את התרופה, הצלף מיד כשנזכרת. אבל אם מועד המנה הבאה קרוב, יש לדלג על המנה שנשכח והמשיך בשגירה הרגילה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את השימוש בתרופה זו לפני התיעצות עם הרופא.

**אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
יש להשתמש באופלוקס על פי הנחיות הרופא.
אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך
זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.**

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש באופלוקס עשוי לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשיימת תופעות הללו. יתכן שלא תסבול מכך אחת מהם.

תופעות לוואי חמורות:

אם יופיעו תופעות לוואי כלשהן הקשורות לתגובה אלרגית, **יש להפסיק את השימוש באופלוקס ולפנות מיד לרופא. הסימנים והתסמינים של תגובה אלרגית מוצגים כאן:**

תגובה אלרגיות:

שכיחות לא ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה)

- **תגובה אלרגיות בעין** (לרבות גרד בעין /או בעוף).

- **דלקת של העור עקב אלרגיה** (לרבות פריחה, גרד או סרפת).

תגובה אלרגית פתאומית חמורה מסכנת חיים (תגובה אנafilקטית) המתבטאת בנפיחות מתחת עור, העשויה להופיע באזוריים כמו הפנים, השפתיים או חלקיים אחרים בגוף, נפיחות של הפה, הלשון או האגרון, היכולה לגרום לחסימת דרכי הנשימה שולולה לגרום לצפיפות, קשיים בבליעה, קשיי נשימה או קוצר נשימה.

- **פריחה בעור שולולה לסיכון חיים** (תסמנות סטיבנס-ג'ונסון, נמק אפידרמי רעלני) דווחה בעקבות השימוש באופלוקס, בתחילת מופיעה בצורה כתמים אדמדמים דמי' לוח מטרה או כתמים עגולים, במקרים רבים עם שלפוחיות במרכזן, בפלג הגוף המרכזי.

דוע גם על התרחשותן של תופעות לוואי הבאות:

توفעות לוואי שכיחות (common) תופעות שכיחות ב-1-10 משתמשים מתוך 100

- **גירוי בעין**
- **תחושה לא נוכה בעין**

שכיחות לא ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה)

תופעות לוואי המשפיעות על העין:

- **הפרעות בראיה**

- **דמיה**

- **דלקת**

- **אדמומיות**

- **רגישות לאור**

- **הרגשה של אוף זר בעין**

- **נפיחות בעין**

נפיחות סביב העין (כולל נפיחות של העוף)

- **כאב בעין**

- **יובש (עקבוץ או צריבה קלים)**

תופעות לוואי המשפיעות על הגוף:

- סחרחות
- כאב ראש
- חוסר תחושה
- בחילה

תופעות לוואי המשפיעות על הלב:

- קצב לב מהיר בלתי תקין
- קצב לב לא סדיר מסכן חיים
- שינוי בקצב הלב (נקרא 'מרוחQT' מוארך, הנראה בפעולות החשמלית של הלב באק"ג).

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דוחות תופעות לוואי

ניתן לבדוק על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקיים לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישורו: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוויח ראייתם של ילדים /או תינוקות, ועל-ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא. יש לאחסן מתחת ל- 25°C .

הרחק מהישג ידם וטוויח ראייתם של ילדים.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי התווית שעל הבקבוק ובקרטון שבו ארוז הבקבוק. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.

אין להשתמש במוצר זה אם חותם ההגנה של הבקבוק שבור.

השלך את הבקבוק 28 ימים לאחר פתיחתו גם אם נשארה תמיישה.

אין להשליך תרופות לביב או לפחות אשפה ביתית. יש להתייעץ עם הרוקח כיצד יש להיפטר מתרופה שאינן זקופה לה יותר. כך תסייע לשימירה על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Sodium chloride, benzalkonium chloride, hydrochloric acid (for pH adjustment), sodium hydroxide (for pH adjustment) and purified water.

כיצד נראה תרופה ומה תוכן האזינה:

אופלוקס הוא תכשיר טיפות עיניים המגיע בבקבוק של 5 מ"ל. התמיסה הינה שקופה עד צהובה-ירוקה בהירה.

שם הייצור וכתובתו: אלרגן פארמהצואוטיקלוס אירלנד, דרך קוסטלבר, ווסטפורט, מחוז מאיו, אירלנד.

בעל הרישום וכתובתו: אבובי ביופרמזה בע"מ, רח' החרש 4, הוד השרון, ישראל.

נערך במרץ 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 117-23-27973
לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.