

نشرة طبيّة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالئة
(مستحضرات) 1986

يُسوَّق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

ديباليبيت محلول 200 ملغ/مل
صوديوم فالبروات 200 ملغ/1 مل
Sodium Valproate 200 mg/1 ml

انتبه: ديباليبيت المحلول مركز أكثر بـ 5 أضعاف من ديباليبيت بالشراب.
قبل إعطاء الدواء يجب التأكد من أن الجرعة الدوائية التي حددها الطبيب هي للمحلول.

المواد الفعالة ومستيبات الأرحية في المستحضر - انظر البند 6 والبند 2 "معلومات هامّة عن بعض مركبات الدواء."
حساسا لدواء آخر من فصيلة فالبروات (فالبروات سيميوصوديوم، فالبروميد).
عن تعاني من مرض في الكبد (التهاب الكبد الحاد أو الزمن).
لقد وصُف هذا الدواء من أجلك. لا تعطله لأخريين. قد يضرّك هذا الدواء حتّى لو بدا لك أنّ مرضهم مشابه. الدواء غير مخصّص للولاد الذين وزنهم أقل من 17 كغم.

تحذير
قد يسبب ديباليبيت ضررا شديداً للجنين عند استعماله خلال فترة الحمل
مواليد الأمهات اللواتي تتناولن فالبروات خلال فترة الحمل هم أكثر عرضةً لخطر الاضطرابات التنويرية الشديدة (العقلية والجسدية) والاضطرابات السلوكية (حوالي 30% إلى 40% من الحالات) وأو العيوب الخلقية (حوالي 11% من الحالات).
فصيص لك الطبيب فالبروات فقط إذا كانت العلاجات الأخرى غير ملائمة.
لا يجوز إعطاء الدواء للنساء في سنّ الحوامل، إلا إذا تبين أن العلاجات البديلة غير ملائمة.
يتوجب على النساء اللواتي يتلقين العلاج بالدواء إذا حملت دون تخطيط على الرغم من استعمال وسائل منع الحمل، فتوجب فوراً إلى الطبيب المعالج من أجل مناقشة إمكانيّات العلاج البديل إذا أمكن ذلك. لا يجوز التوقّف عن استعمال الدواء دون استشارة الطبيب المعالج لأنّ وضعك قد يتأخّر.

بالإضافة إلى النشرة الطبّيّة، فإنّه يوجد للمستحضر ديباليبيت بطاقة معلومات وقائيّة ملقّنة للعلاج. تحتوي هذه البطاقة على معلومات وقائيّة هامّة، يتوجب عليك معرفتها، قبل البدء بالعلاج بديباليبيت وعلاّه وعليك اتّباعها. يجب معانيه بطاقة المعلومات ملقّنة للعلاج ونشرة المستهلك الطبّيّة.

قبل البدء باستعمال المستحضر. يجب الاحتفاظ بالبطاقة لمعانيه اضافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

1. لأي غرض مخصّص هذا الدواء؟

الدواء مضاد للاختلاج، ويعطى لعلاج أنواع معيّنة من مرض الصرع (إيبيليبسي).

الفصيلة العلاجية: تنتمي المادة الفعالة إلى فصيلة المواد المضادة للاختلاج.

2. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت:

- حساسا (لديك أرحية) للمادة الفعالة أو لأحد مركبات الدواء (انظر البند 6 – معلومات هامّة إضافية).
- حساسا لدواء آخر من فصيلة فالبروات (فالبروات سيميوصوديوم، فالبروميد).
- تعاني من مرض في الكبد (التهاب الكبد الحاد أو الزمن).
- أو أن أحد أفراد عائلتك عانى في الماضي أو يعانى الآن من مرض خطير في الكبد، خاصة إذا نجح من استعمال الأدوية.
- تعاني من البريفيرية الكبدية (مرض وراثي في الكبد).
- تعاني من مشكلة جينية تسبب اضطرابا ميتوكونديا، مثلا متلازمة Alpers-Huttenlocher.
- تعاني من اضطراب استقلابي، مثل: الاضطراب في دورة البولة (اليوريا).
- تستعمل الآن أحد الأدوية التالية:
 - St. John's wort (لعلاج الاكتئاب).

تحذيرات خاصة تتعلّق باستعمال الدواء

- لا يجوز إعطاء الدواء للبنات، الفتيات، النساء في سنّ الخصوبة والنساء الحوامل، إلا إذا تبين أن العلاجات البديلة غير ملائمة.
- يتوجب على النساء اللواتي يتلقين العلاج بالدواء ومن في سنّ الخصوبة أن يستعملن وسائل فعالة لمنع الحمل. إذا كانت المرأة التي تستعمل الدواء تحطط للحمل، فإن عليها استشارة الطبيب المعالج بالنسبة لإمكانيّة الانتقال إلى علاج بديل.

قد يؤدّي هذا الدواء في حالات نادرة جدّا إلى الإضرار بالكبد (التهاب الكبد) أو بالبنكرياس (التهاب البنكرياس)، مما قد يكون خطيرا وشكّل خطرا على الحياة. سيحيك طبيبك إجراء فحوص الدم من أجل تقييم وظائف الكبد، خاصة في الأشهر الـ 6 الأولى من العلاج. يتوجب عليك معرفتها، قبل البدء بالعلاج بديباليبيت وعلاّه وعليك اتّباعها. يجب معانيه بطاقة المعلومات ملقّنة للعلاج ونشرة المستهلك الطبّيّة.

- تعب فجائي، انعدام الشهية، إرهاق، نعاس، انتفاخ في الرجلين، ضعف عام.
- تقيّوات متكررة، غثيان، ألم في البطن، اصفرار الجلد أو بياض العين (يرقان).
- عوردة الوريدات الصرعيّة، بالرغم من أنك تتناول الدواء بشكل صحيح.

• قبل العلاج بديباليبيت، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من مرض في الكليتين (قصور الكليتين)، من الذئبة الحماميّة (systemic lupus erythematosus) أو من نقص إنزيمي وراثي، خاصة نقص في الإنزيمات في دورة البولة (اليوريا) قد يؤدّي إلى ارتفاع مستويات الأمونيوم في الدم، أو كنت تعاني من مشكلة جينية تسبب اضطرابا ميتوكونديا (بما في ذلك لدى أفراد عائلتك).

قبل إجراء أي نوع من العمليات الجراحية يجب إبلاغ الطاقم الطبي بأنك تستعمل ديباليبيت.
قبل البدء بالعلاج، سيأخذ الطبيب من لك لمست حاملا ومن أنك تستعملين وسيلة لمنع الحمل.

كما هو الحال مع الأدوية الأخرى المضادة للصرع، فإن استعمال هذا الدواء قد يؤدّي إلى تقاّم التوابع أو إلى زيادة في شوبعها. بل قد يصيبك نوع مختلف من التوابع. إذا حدثت هذه الأعراض، فيجب استشارة الطبيب بشكل فوريّ.

قد يسبب هذا الدواء ارتفاعا في الوزن. استشر طبيبك بالنسبة لوسائل المحافظة على وزن الجسم السليم.

قد يؤدي استعمال الأدوية المضادة للتشنجات إلى زيادة خطر حدوث أفعال أو أفكار انتحارية. عليك وعلى أفراد عائلتك الانتباه إلى التغيرات في المزاج، في أنماط التصرّف وفي الأفعال. يجب متابعة العلامات التي تدل على خطر الانتحار مثل: أقوال أو أفكار عن نية الإضرار بنفسك، التباعد عن العائلة والأصدقاء، اكتئاب أو تقاّم الاكتئاب القاتم، انشغال في موضوع الموت، التخلّي عن أملاك ثمينة أو تسليمها. إذا ظهرت أفكار من هذا النوع، فيجب التوجّه فوراً إلى الطبيب.

- إذا كنت تعاني من نقص في إنزيمات carnitine type II (CPT) (palmitoyltransferase) (مرض استقلابي وراثي، فينبغك حظر متزايد لانحلال العضل عند استعمال ديباليبيت.
- أخير الطبيب إذا كنت تشعّر بأعراض مثل: الارتجاج، تصلّب الأطراف والصعوبات في المشي (اضطرابات خارج السبيل الهرمي) أو اضطرابات في الذّاكرة أو في الوظيفة العقلية (بما في ذلك الأسبيرين).
- ساليبيلات (بما في ذلك الأسبيرين).
- كاتانيبيول (علاج الصرع وحالات مرّضية إضافية).

بالأخص لدى الولاد دون سن الـ 3، يجب الامتناع عن استعمال الأدوية التي تحتوي على ساليبيلات (بما في ذلك الأسبيرين) خلال فترة العلاج بالدواء.
على البصر لدى الولاد الذين تعرّضوا فالبروات في الرحم.

مرض عصبيّ أو استقلابيّ أو من أشكال شديدة من الصرع.

الفحوص والمتابعية

قبل البدء بالعلاج وفي الأشهر الستة الأولى من العلاج بهذا الدواء يجب إجراء فحوص للدم لوظائف الكبد.

إن فالبروات ضار للجنين إذا استُعمل خلال فترة

سنتور أدوية معينة على فعالية فالبروات، والعكس صحيح.

لا يجوز استعمال ديباليبيت، إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:

- St. John's wort - عشبة طبية لعلاج الاكتئاب.
- لا يجوز تناول ديباليبيت:
 - إذا كنت حاملا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.
 - إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

لا يجوز تناول ديباليبيت:

- إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

إذا كنت تستعمل الآن، أو قد استعملت مؤخرا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فإخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.
خاصة إذا كنت تستعمل:
أدوية تحتوي على أستينازولاميد (لخفض الضغط داخل العين أو مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم).

- مضادات حيوية (أدوية تحتوي على أزيثرويام أو ريفامبيسين).
- أدوية أخرى لعلاج الصرع (أدوية تحتوي على كاربامازيبين، فينوبرامات، روفيناميد، توپيرامات أو زونيساميد).
- نيوميوين - يستعمل لمنع المضاعفات التي قد تحدث بعد الزيف العموي الدماغيّ. قد يزيد ديباليبيت من تأثير نيوميوين.
- أدوية تحتوي على الإيستروجين (بما في ذلك أنواع معينة من حبوب منع الحمل).
- بريوفول (نواء للتخدير).
- أدوية تحتوي على زيدوفدين (علاج HIV).
- أدوية تحتوي على الليثيوم (لموازنة المزاج). أدوية تحتوي على ميتاميزول/بيبيرون (لعلاج الحمى والألام).
- ساليبيلات (بما في ذلك الأسبيرين).
- كاتانيبيول (علاج الصرع وحالات مرّضية إضافية).

أدوية تحتوي على زيدوفدين (علاج HIV).
أدوية تحتوي على الليثيوم (لموازنة المزاج).
أدوية تحتوي على ميتاميزول/بيبيرون (لعلاج الحمى والألام).

ساليبيلات (بما في ذلك الأسبيرين).
كاتانيبيول (علاج الصرع وحالات مرّضية إضافية).

بالأخص لدى الولاد دون سن الـ 3، يجب الامتناع عن استعمال الأدوية التي تحتوي على ساليبيلات (بما في ذلك الأسبيرين) خلال فترة العلاج بالدواء.

على البصر لدى الولاد الذين تعرّضوا فالبروات في الرحم.

مرض عصبيّ أو استقلابيّ أو من أشكال شديدة من الصرع.
يُفضّل تناول الدواء في وقت تناول وجبات الطعام.

استعمال الدواء والطعام

يُفضّل تناول الدواء في وقت تناول وجبات الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يؤسي بشرب المشروبات الكحوليّة في فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إن فالبروات ضار للجنين إذا استُعمل خلال فترة

سنتور أدوية معينة على فعالية فالبروات، والعكس صحيح.

لا يجوز استعمال ديباليبيت، إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:

- St. John's wort - عشبة طبية لعلاج الاكتئاب.
- لا يجوز تناول ديباليبيت:
 - إذا كنت حاملا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.
 - إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

لا يجوز تناول ديباليبيت:

- إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

استعمال الدواء والطعام
يُفضّل تناول الدواء في وقت تناول وجبات الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يؤسي بشرب المشروبات الكحوليّة في فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إن فالبروات ضار للجنين إذا استُعمل خلال فترة

سنتور أدوية معينة على فعالية فالبروات، والعكس صحيح.

لا يجوز استعمال ديباليبيت، إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:

- St. John's wort - عشبة طبية لعلاج الاكتئاب.
- لا يجوز تناول ديباليبيت:
 - إذا كنت حاملا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.
 - إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

لا يجوز تناول ديباليبيت:

- إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

استعمال الدواء والطعام
يُفضّل تناول الدواء في وقت تناول وجبات الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يؤسي بشرب المشروبات الكحوليّة في فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إن فالبروات ضار للجنين إذا استُعمل خلال فترة

سنتور أدوية معينة على فعالية فالبروات، والعكس صحيح.

لا يجوز استعمال ديباليبيت، إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:

- St. John's wort - عشبة طبية لعلاج الاكتئاب.
- لا يجوز تناول ديباليبيت:
 - إذا كنت حاملا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.
 - إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

لا يجوز تناول ديباليبيت:

- إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

استعمال الدواء والطعام
يُفضّل تناول الدواء في وقت تناول وجبات الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يؤسي بشرب المشروبات الكحوليّة في فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة
إن فالبروات ضار للجنين إذا استُعمل خلال فترة
سنتور أدوية معينة على فعالية فالبروات، والعكس صحيح.

لا يجوز استعمال ديباليبيت، إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:

- St. John's wort - عشبة طبية لعلاج الاكتئاب.
- لا يجوز تناول ديباليبيت:
 - إذا كنت حاملا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.
 - إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

لا يجوز تناول ديباليبيت:

- إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

استعمال الدواء والطعام
يُفضّل تناول الدواء في وقت تناول وجبات الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يؤسي بشرب المشروبات الكحوليّة في فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إن فالبروات ضار للجنين إذا استُعمل خلال فترة

سنتور أدوية معينة على فعالية فالبروات، والعكس صحيح.

لا يجوز استعمال ديباليبيت، إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:

- St. John's wort - عشبة طبية لعلاج الاكتئاب.
- لا يجوز تناول ديباليبيت:
 - إذا كنت حاملا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.
 - إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

لا يجوز تناول ديباليبيت:

- إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

استعمال الدواء والطعام
يُفضّل تناول الدواء في وقت تناول وجبات الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يؤسي بشرب المشروبات الكحوليّة في فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إن فالبروات ضار للجنين إذا استُعمل خلال فترة

سنتور أدوية معينة على فعالية فالبروات، والعكس صحيح.

لا يجوز استعمال ديباليبيت، إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:

- St. John's wort - عشبة طبية لعلاج الاكتئاب.
- لا يجوز تناول ديباليبيت:
 - إذا كنت حاملا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.
 - إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

لا يجوز تناول ديباليبيت:

- إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

استعمال الدواء والطعام
يُفضّل تناول الدواء في وقت تناول وجبات الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يؤسي بشرب المشروبات الكحوليّة في فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إن فالبروات ضار للجنين إذا استُعمل خلال فترة

سنتور أدوية معينة على فعالية فالبروات، والعكس صحيح.

لا يجوز استعمال ديباليبيت، إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:

- St. John's wort - عشبة طبية لعلاج الاكتئاب.
- لا يجوز تناول ديباليبيت:
 - إذا كنت حاملا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.
 - إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

لا يجوز تناول ديباليبيت:

- إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

استعمال الدواء والطعام
يُفضّل تناول الدواء في وقت تناول وجبات الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يؤسي بشرب المشروبات الكحوليّة في فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إن فالبروات ضار للجنين إذا استُعمل خلال فترة

سنتور أدوية معينة على فعالية فالبروات، والعكس صحيح.

لا يجوز استعمال ديباليبيت، إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:

- St. John's wort - عشبة طبية لعلاج الاكتئاب.
- لا يجوز تناول ديباليبيت:
 - إذا كنت حاملا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.
 - إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

لا يجوز تناول ديباليبيت:

- إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

استعمال الدواء والطعام
يُفضّل تناول الدواء في وقت تناول وجبات الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يؤسي بشرب المشروبات الكحوليّة في فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إن فالبروات ضار للجنين إذا استُعمل خلال فترة

سنتور أدوية معينة على فعالية فالبروات، والعكس صحيح.

لا يجوز استعمال ديباليبيت، إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:

- St. John's wort - عشبة طبية لعلاج الاكتئاب.
- لا يجوز تناول ديباليبيت:
 - إذا كنت حاملا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.
 - إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

لا يجوز تناول ديباليبيت:

- إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

استعمال الدواء والطعام
يُفضّل تناول الدواء في وقت تناول وجبات الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يؤسي بشرب المشروبات الكحوليّة في فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إن فالبروات ضار للجنين إذا استُعمل خلال فترة

سنتور أدوية معينة على فعالية فالبروات، والعكس صحيح.

لا يجوز استعمال ديباليبيت، إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:

- St. John's wort - عشبة طبية لعلاج الاكتئاب.
- لا يجوز تناول ديباليبيت:
 - إذا كنت حاملا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.
 - إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

لا يجوز تناول ديباليبيت:

- إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

استعمال الدواء والطعام
يُفضّل تناول الدواء في وقت تناول وجبات الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يؤسي بشرب المشروبات الكحوليّة في فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إن فالبروات ضار للجنين إذا استُعمل خلال فترة

سنتور أدوية معينة على فعالية فالبروات، والعكس صحيح.

لا يجوز استعمال ديباليبيت، إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:

- St. John's wort - عشبة طبية لعلاج الاكتئاب.
- لا يجوز تناول ديباليبيت:
 - إذا كنت حاملا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.
 - إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

لا يجوز تناول ديباليبيت:

- إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

استعمال الدواء والطعام
يُفضّل تناول الدواء في وقت تناول وجبات الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يؤسي بشرب المشروبات الكحوليّة في فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إن فالبروات ضار للجنين إذا استُعمل خلال فترة

سنتور أدوية معينة على فعالية فالبروات، والعكس صحيح.

لا يجوز استعمال ديباليبيت، إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:

- St. John's wort - عشبة طبية لعلاج الاكتئاب.
- لا يجوز تناول ديباليبيت:
 - إذا كنت حاملا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.
 - إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

لا يجوز تناول ديباليبيت:

- إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

استعمال الدواء والطعام
يُفضّل تناول الدواء في وقت تناول وجبات الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يؤسي بشرب المشروبات الكحوليّة في فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إن فالبروات ضار للجنين إذا استُعمل خلال فترة

سنتور أدوية معينة على فعالية فالبروات، والعكس صحيح.

لا يجوز استعمال ديباليبيت، إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:

- St. John's wort - عشبة طبية لعلاج الاكتئاب.
- لا يجوز تناول ديباليبيت:
 - إذا كنت حاملا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.
 - إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

لا يجوز تناول ديباليبيت:

- إذا كنت امرأة في سنّ الخصوبة، فيصعب لك الحمل، لأنّ هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

استعمال الدواء والطعام
يُفضّل تناول الدواء في وقت تناول وجبات الطعام.

استعمال الدواء واستهلاك الكحول

لا يؤسي بشرب المشروبات الكحوليّة في فترة العلاج بالدواء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إن فالبروات ضار للجنين إذا استُعمل خلال فترة