

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

קלגרין® מנטה קלגרין® תות קלגרין® תפוז טבליות מציצה

החומרים הפעילים:

כל טבלית מציצה מכילה:

1.25 מ"ג צטילפירידיניום כלוריד 1-4 מ"ג

לידוקאין הידרוכלוריד.

Cetylpyridinium chloride (CPC) 1.25 mg

and Lidocaine hydrochloride 1 mg

לרשימת המרכיבים הנוספים ראה סעיף 6.

ראה גם "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של

התרופה" בסעיף 2.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש

בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם

יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל

הרוקח.

עלִיך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף

המינון בעלון זה. היועץ ברקוח אם הינך זקוק

למידע נוסף.

עלִיך לפנות אל הרופא אם תסמינים

(סימפטומים) לא משתפרים תוך 3 ימים,

אם הם מחמירים או אם אתה חש בתסמינים

חדשים.

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12

שנים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה מיועדת להקלה בכאבי גרון חזקים

ולהקלה בזיהומים בחלל הפה והגרון.

קבוצה תרופוטית:

צטילפירידיניום כלוריד – מחטאט מלול אמוניום

רבעוני.

לידוקאין – מאלחש מקומי.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים, לחומרים מאלחשים אחרים, לחומרים מחטאטים מסוג אמוניום רבעוני, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (לרשימת המרכיבים הנוספים, ראה סעיף 6).
- ביילדים מתחת לגיל 12.

אזהרות מיוחדות המנועות לשימוש בתרופה:

אפולות האלוטוש של התרופה עלול להפריע

לבלעיה ולגרום לשאיפת מזון (אספירציה)

במהלך הארוחה (יכול להתבטא בשיעול), או

לגרום לנשיכת הלשון, ולכן יש לנקוט זהירות

בשימוש בה. כמו כן אין להשתמש בתרופה

לפני אכילה או שתייה. ראה גם בסעיף

"שימוש בתרופה ומזון".

יש לפנות לרופא במקרה של חום, ליחה,

אי נוחות בבלעיה, במקרה של החמרה או

במקרה ואין שיפור לאחר 3 ימים של טיפול.

הלידוקאין שבתכשיר עלול להוביל לתוצאה

חיובית בבדיקת סמים (doping) המבוצעת

לעיתים בספורטאים.

יש להזהר במקרים של פצעים מדממים

בריריות הפה – אם חייבים לטול את

הטבליות, הפצעים עלולים להגביר את ספיגת

החומרים הפעילים לזרם הדם. הדבר לרלוטני

בפרט בקרב מטופלים הסובלים מעביות לב

וכלי דם או בעלי נטייה להתכווצויות שרירים.

• נדרשת זהירות במקרים של אי-ספיקת כבד

ו/או כליות, מכיוון שמגבלות אלה עלולות

לגרום לעלייה בריכוז החומרים הפעילים

בדם.

שימוש בילדים

תרופה זו אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12

שנים.

התגובות בין תרופות

אם אתה לוקח או אם לוקחת לאחרונה תרופות

אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי

תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש

ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה משתמש

בתרופות נוספות המכילות חומרים מחטאטים

ומאלחשים מקומיים.

שימוש בתרופה ומזון

אין לאכול או לשתות לאחר השימוש בתרופה

חל עוד השפעת האלוטוש קיימת. לפיכך אין

להשתמש בתרופה בסמוך לזמני ארוחות. ראה

גם "אזהרות" לעיל.

הריון והנקה

• אם אתה בהריון, מתכננת הריון, או מניקה,

יש להיוועץ ברופא או רוקח. מומלץ לא

להשתמש בתרופה בהריון.

• אין להשתמש בתרופה אם את מניקה היות

שהחומר הפעיל ליידוקאין עובר לחלב האם.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

• התרופה מכילה את הממתיק קסיליטול ואינה

מכילה סוכר, ולכן מותרת לשימוש בחולי

סוכרת.

• טבליות מציצה קלגרין מכילות חומרי צבע

(ראה סעיף 6). חומרי הצבע עלולים לגרום

לתגובות אלרגיות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עלִיך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך

בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

• הטבליות מיועדות למציצה.

יש להחזיק בפה את הטבליה ולתת לה

להתמוסס בפה באטיות.

• אין ללעוס או לבלוע את הטבליה.

• אין להשתמש בתרופה לפני אכילה או

שתייה. ראה גם סעיף 2.

• יש להקפיד על הפרש של שתיים לפחות בין

טבליה אחת לשניה.

שימוש בילדים מגיל 12 ובמבוגרים

המינון המקובל בדרך כלל הוא: טבליה אחת

למציצה כל 3 עד 4 שעות. לפי הצורך.

אין להשתמש ביותר מ-6 טבליות ב-24 שעות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

עלִיך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך

בטוח.

• אם לא חל שיפור במצבך תוך 3 ימים, או

אם חלה החמרה כלשהי, יש לפנות לרופא

שעשוי להמליץ על טיפול נוסף.

• אין להשתמש בתרופה יותר מ-3 ימים

ברציפות בלי להתייעץ עם הרופא.

• אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר: אם

ניטלה מנת יתר, פנה לרופא או לחדר מיון של

בית-חולים, והבא אריזת התרופה איתך.

אין להשתמש או לטול תרופות בחושה בודק

התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה.

הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש

בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקלגרין עלול לגרום

לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. לא תיבהל

למקרה רשימת תופעות הלוואי, יתכן ולא

תסבול מאף אחת מהן.

הפסק את השימוש בתרופה ופנה מיד לרופא

אם אתה חש בתגובה אלרגית שיכולה

להתבטא בתופעות הבאות:

• קושי בנשימה או בבלעיה.

• פריחתות של הפנים, השפתיים, הלשון או

הגרן.

• גרד חמור בעור המלווה בפריחה אדומה או

בליטות בעור.

הפסק את הטיפול ופנה לרופא במקרים

הבאים:

• בהופיע אספירציה וליקויים בבלעיה (ראה גם

"אזהרות").

תופעות לוואי נוספות:

• גירוי מקומי.

• סיכון לדימום אם קיים פצע טרי בפה.

תופעות לוואי נדירות (מופיעות בפחות

מ 10,000 משתמשים מתוך 10,000):

• חוסר תחושה בלשון.

• שינויים בחוש הטעם.

תופעות נדירות מאוד (מופיעות בפחות

ממשתמשי 1 מתוך 10,000):

• תגובות רגישות יתר או הגברת רגישות בחלל

הפה (בדרך כלל תופעות אלה נעלמות מהר).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות

הלוואי מחמירה, או אם אתה סובל מתופעת

לוואי שלא צוינה בעלון, עלִיך להתייעץ עם

הרופא.

ביתן לדיווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות

באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות

לוואי" עקב טיפול תרופות". שנמצא בדף הבית

של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il)

המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,

או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת

יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם

וטווח אריזתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי

כך תמנע הרעלה. לא תגרום להקאה ללא

הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה

(exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך

התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו

חודש.

• תנאי אחסון: יש לאחסן מתחת ל-25°C.

6. מידע נוסף

• נוסף על החומרים הפעילים, קלגרין תות

מכיל גם:

Xylitol, cellulose microcrystalline, citric

acid anhydrous, magnesium stearate,

ponceau 4R, povidone K90, strawberry

flavor.

• נוסף על החומרים הפעילים, קלגרין מנטה

מכיל גם:

Xylitol, cellulose microcrystalline, citric

acid anhydrous, novochrom B green

powder, magnesium stearate, povidone

K90, frescofort flavor.

• נוסף על החומרים הפעילים, קלגרין תפוז

מכיל גם:

Xylitol, cellulose microcrystalline, citric

acid anhydrous, magnesium stearate,

povidone K90, orange flavor, sunset

yellow AL lake E110.

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?

טבליות עם הטבעה של סמלית RAFA- בצד

אחד.

• תות, ורוד, מנטה – ירקרק, תפוז – כתום.

הטבליות ארוזות במגשיט, באריזות 24

טבליות בקופסה.

• בעל הרישום: מעבדות רפא בע"מ, ת.ד. 405,

ירושלים 9100301

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות

הממלכתי במשרד הבריאות:

קלגרין תות: 163-61-35351

קלגרין מנטה: 163-62-35352

קלגרין תפוז: 163-63-36018

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח

בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני

שני המינים.

נערך בפברואר 2026.