

טפקינולי® 48 מ"ג

תמיסה להזרקה

החומר הפעיל וריכוזו:

אפקוריטמאב 60 מ"ג/מ"ל.

כל בקבוקון של 0.8 מ"ל מכיל 48 מ"ג של אפקוריטמאב.

Epcoritamab 60 mg/ml.

Each 0.8 ml vial contains 48 mg of epcoritamab.

לרשימת המרכיבים הבלתי פעילים, אנא ראה סעיף 6 "מידע נוסף" וסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" בעלון זה.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.

אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

בנוסף לעלון, לתכשיר טפקינולי קיים 'כרטיס מידע בטיחותי למטופל'. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב, שעליך לדעת, לפני התחלת הטיפול ובמהלך הטיפול בטפקינולי ולפעול על פיו. יש לעיין ב'כרטיס מידע בטיחותי למטופל' ובעלון לצרכן בטרם תחילת השימוש בתכשיר. יש לשמור את הכרטיס לעיון נוסף במידת הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

טפקינולי מיועדת לטיפול במבוגרים עם לימפומה ממושטת של תאי B גדולים (Diffuse – DLBCL Large B-Cell Lymphoma) חוזרת או עמידה לטיפול, שלא הוגדרה אחרת, כולל DLBCL הנובעת מלימפומה אינדולנטית (איטית) ולימפומה של תאי B בדרגת ממאירות גבוהה לאחר לפחות שני קווי טיפול סיסטמיים קודמים.

טפקינולי, בשילוב עם לנלדומיד וריטוקסימאב, מיועדת לטיפול במבוגרים עם לימפומה פוליקולרית (Follicular Lymphoma) חוזרת או עמידה לטיפול.

טפקינולי כטיפול יחיד מיועדת לטיפול במבוגרים עם לימפומה פוליקולרית (Follicular Lymphoma) חוזרת או עמידה לטיפול, לאחר לפחות שני קווי טיפול סיסטמיים קודמים.

קבוצה תרפויטית: תכשירים אנטינאופלסטיים.

כיצד טפקינולי פועלת

אפקוריטמאב תוכנן במיוחד כדי לסייע למערכת החיסון שלך לתקוף תאי סרטן (לימפומה). אפקוריטמאב פועל על-ידי היצמדות לתאי מערכת החיסון ולתאי הסרטן בגופך, מקרב אותם אחד לשני, כך שמערכת החיסון שלך יכולה להרוס את התאים הסרטניים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאפקוריטמאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המופיעים בסעיף 6).
- אם אינך בטוח, שוחח עם הרופא שלך או האחיות לפני שטפקינלי תינתן לך.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בטפקינלי, ספר לרופא אם:

- יש לך או היו לך בעבר בעיות במערכת העצבים שלך – כגון פרכוסים.
 - יש לך זיהום.
 - אתה אמור לקבל חיסון או שאתה יודע שייתכן שתצטרך לקבל חיסון בעתיד הקרוב.
- אם אחד מהמצבים מעלה חל עליך (או שאינך בטוח), שוחח עם הרופא שלך או האחיות לפני שתתחיל טיפול עם טפקינלי.

הרופא או האחיות שלך יבצעו בדיקות דם, לפני ובמהלך הטיפול שלך באפקוריטמאב, כדי לבדוק את רמות הנוגדנים שלך, אשר עשויות להצביע על הסיכון שלך לזיהום ועל הצורך בטיפול מסוים.

ספר לרופא שלך מיד אם אתה חווה תסמינים של אחת מתופעות הלוואי המפורטות מטה, במהלך או לאחר הטיפול בטפקינלי. ייתכן שתזדקק לטיפול רפואי נוסף.

- תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS [Cytokine Release Syndrome])** – מצב מסכן חיים הגורם לחום, הקאות, קשיי נשימה/קוצר נשימה, צמרמורות, דופק מהיר, כאב ראש וסחרחורת או תחושת סחרור, הקשור לתרופות המעוררות תאי T.
 - לפני כל הזרקה תת-עורית, ייתכן שייתנו לך תרופות שמסייעות להפחית תופעות אפשריות של תסמונת שחרור ציטוקינים.
- המופוגציטיק-לימפופהיסטיוציטוזיס (HLH [Haemophagocytic lymphohistiocytosis])** – מצב נדיר בו מערכת החיסון מייצרת יותר מדי תאים הנלחמים בזיהומים, אשר בדרך כלל נחשבים לתאים תקינים, הנקראים היסטיוציטים ולימפוציטים. זה יכול להוביל לכבד ו/או לטחול מוגדלים, לבעיות לב ולהפרעות בכליות. התסמינים עשויים לכלול חום, פריחה בעור, בלוטות לימפה נפוחות, בעיות נשימה והופעת חבורות בקלות. ספר לרופא שלך מיד אם אתה חווה תסמינים אלה בו זמנית.
- תסמונת רעילות נוירולוגית (ICANS [Immune Effector Cell-Associated Neurotoxicity Syndrome])** – תסמינים העשויים לכלול בעיות בשימוש בשפה (כולל דיבור, הבנה, כתיבה וקריאה), ישנוניות, בלבול/חוסר התמצאות, חולשת שרירים, פרכוסים, נפחות של חלק מהמוח ואובדן זיכרון.
- זיהומים** – אתה עלול לפתח סימנים של זיהום, כגון חום של 38°C ומעלה, צמרמורות, שיעול או כאב במתן שתן, שיכולים להשתנות בהתאם למקום הזיהום בגוף. לפירוט התסמינים, אנא ראה סעיף 4 "תופעות לוואי" בעלון זה.
- ליקואנצפלופתיה רב מוקדית מתקדמת (PML [Progressive Multifocal Leukoencephalopathy])** – תסמינים של מצב מוחי חמור זה, שעלול להיות קטלני, עשויים לכלול ראייה מטושטשת, אובדן ראייה או ראייה כפולה, קושי בדיבור, חולשה או מגושמות של יד או רגל, שינוי באופן ההליכה שלך או בעיות בשיווי המשקל שלך, שינויים באישיות, שינויים בחשיבה, בזיכרון ובהתמצאות המובילים לבלבול. תסמינים אלו עשויים להופיע מספר חודשים לאחר סיום הטיפול והם בדרך כלל מתפתחים לאט ובהדרגתיות במשך שבועות או חודשים.

חשוב שגם קרובי משפחתך או המטפלים שלך יהיו מודעים לתסמינים אלו, מכיוון שהם עשויים להבחין בתסמינים שאינם מודע אליהם.

- **תסמונת פירוק הגידול (TLS [Tumor Lysis Syndrome])** – אנשים מסוימים עלולים לחוות רמות חריגות של מלחים מסוימים בדם - הנובעות מהפירוק המהיר של תאים סרטניים במהלך הטיפול. מצב זה מכונה 'תסמונת פירוק הגידול'. לפירוט התסמינים, אנא ראה סעיף 4 "תופעות לוואי" בעלון זה.
- 0 הרופא שלך או האחות יבצעו בדיקות דם כדי לבדוק מצב זה. לפני כל הזרקה תת-עורית עליך לשותות הרבה מים וייתכן שיתנו לך תרופות נוספות שיכולות לעזור להפחית רמות גבוהות של חומצה אורית ויעזרו להפחית תופעות אפשריות של תסמונת פירוק הגידול.
- **התלקחות הגידול** – ככל שהסרטן שלך נהרס, הגוף עלול להגיב ולהדגים מצב שנראה כהחמרה – מצב זה מכונה 'תגובת התלקחות הגידול'. לפירוט התסמינים, אנא ראה סעיף 4 "תופעות לוואי" בעלון זה.

ילדים ומתבגרים

טפקינלי אינה מיועדת לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים, מאחר שלא קיים מידע לגבי יעילות ובטיחות השימוש בתכשיר בקבוצת גיל זו.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

היריון, הנקה ופוריות

היריון

אם את בהיריון, חושבת שאת עלולה להיות בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, היוועצי ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה זו. אל תיקחי טפקינלי במהלך ההיריון, מאחר שזה עלול להשפיע על העובר. ייתכן שהרופא שלך יבקש ממך לבצע בדיקת היריון לפני תחילת הטיפול.

אמצעי מניעה

אם את אישה בגיל הפוריות ועשויה להרות עליך להשתמש באמצעי מניעה יעיל כדי למנוע כניסה להיריון במהלך נטילת טפקינלי ובמשך 4 חודשים לפחות אחרי מנת הטפקינלי האחרונה שלך. עליך לספר לרופא שלך מיד אם נכנסת להיריון במהלך תקופה זו. שוחחי עם הרופא שלך או האחות בנוגע לאמצעי מניעה מתאימים.

הנקה

אסור להניק במהלך הטיפול עם טפקינלי ובמשך 4 חודשים לפחות אחרי המנה האחרונה. לא ידוע אם טפקינלי עוברת לחלב האם והאם זה עלול להשפיע על תינוקך.

פוריות

ההשפעה של טפקינלי על פוריות בגברים ובנשים אינה ידועה.

נהיגה ושימוש במכונות

בשל תסמינים אפשריים של תסמונת רעילות נוירולוגית (ICANS) עליך להיות זהיר במהלך נהיגה, רכיבה על אופניים או שימוש במכונות כבדות או כאלו העלולות להיות מסוכנות. אם יש לך כעת תסמינים כאלה, הימנע מפעילויות אלה וצור קשר עם הרופא שלך, האחות או הרוקח. למידע נוסף אנא ראה סעיף 4 "תופעות לוואי" בעלון זה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

טפקינלי מכילה נתרן

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בכל בקבוקון, כך שלמעשה הינה 'נטולת-נתרן'.

טפקינלי מכילה סורביטול

תרופה זו מכילה 28.8 מ"ג סורביטול בכל בקבוקון, אשר שווה ערך ל-27.33 מ"ג/מ"ל.

טפקינלי מכילה פוליסורבט

תרופה זו מכילה 0.42 מ"ג של פוליסורבט 80 בכל בקבוקון, אשר שווה ערך ל-0.4 מ"ג/מ"ל. פוליסורבטים עלולים לגרום לתגובות אלרגיות. ספר לרופא שלך אם יש לך אלרגיות ידועות כלשהן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד. טפקינלי תינתן לך על-ידי רופא או אחות כזריקה תת-עורית.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

טפקינלי תינתן לך במחזורים של 28 ימים, על פי תוכנית הטיפול שניתנה לך על-ידי הרופא שלך.

אתה תקבל טפקינלי כטיפול יחיד בהתאם ללוח הזמנים הבא:

מחזור	תדירות המתן
מחזורים 1 עד 3	שבועי
מחזורים 4 עד 9	כל שבועיים
מחזורים 10 והלאה	כל ארבעה שבועות

אתה תקבל טפקינלי, בשילוב עם לנלידומיד וריטוקסימאב, בהתאם ללוח הזמנים הבא:

מחזור	תדירות המתן
מחזורים 1 עד 3	שבועי
מחזורים 4 עד 12	כל ארבעה שבועות

אתה תקבל לנלידומיד (בימים 1 עד 21) במהלך הטיפול שלך (מחזורים 1 עד 12).

אתה תקבל ריטוקסימאב במהלך הטיפול שלך (מחזורים 1 עד 5).

ייתכן שייתנו לך תרופות אחרות לפני שתקבל טפקינלי, כדי לסייע במניעת תגובות כגון תסמונת שחרור ציטוקינים וחום במחזור 1 (ייתכן שייתנו גם במחזורים עתידיים). תרופות אלו עשויות לכלול:

- קורטיקוסטרואידים – כגון דקסמטזון, פרדניזולון או תרופה דומה
- אנטיהיסטמין – כגון דיפנהידרמין
- פראצטמול

במהלך החודש הראשון (מחזור 1) שבו ניתן לך טפקינלי:

- חשוב שתהיה רגועה היטב בנוזלים. מסיבה זו הרופא שלך עשוי להורות לך לשתות הרבה מים ביום שלפני וביום שאחרי קבלת טפקינלי. ביום שבו אתה מקבל טפקינלי, הרופא שלך עשוי לתת לך עירוי נוזלים באמצעות מחט דרך הווריד (מתן תוך-וריד).
- אם אתה נוטל תרופה לטיפול בלחץ דם גבוה, הרופא שלך עשוי לבקש ממך להפסיק ליטול אותה לפרק זמן קצר בזמן שאתה מטופל בטפקינלי.

אם יש לך לימפומה ממושטת של תאי B גדולים (DLBCL)

מנות התחלת טיפול:

המנה הראשונית (0.16 מ"ג) של טפקינלי תינתן לך במחזור 1 ביום הראשון.
המנה השנייה (0.8 מ"ג) של טפקינלי תינתן לך במחזור 1 ביום השמיני.

מעבר למתן מנה מלאה:

המנה המלאה הראשונה (48 מ"ג) של טפקינלי תינתן לך במחזור 1 ביום ה-15. הרופא שלך יינטר את השפעת הטיפול שלך ויבקש ממך להישאר בבית החולים ל-24 שעות אחרי המנה המלאה הראשונה (48 מ"ג), מפני שזהו הזמן בו הסיכוי להופעת תגובות כגון תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS), תסמונת רעילות נוירולוגית (ICANS) וחום הוא הגבוה ביותר.

אם יש לך לימפומה פוליקולרית (FL)

מנות התחלת טיפול:

המנה הראשונית (0.16 מ"ג) של טפקינלי תינתן לך במחזור 1 ביום הראשון.
המנה השנייה (0.8 מ"ג) של טפקינלי תינתן לך במחזור 1 ביום השמיני.
המנה השלישית (3 מ"ג) של טפקינלי תינתן לך במחזור 1 ביום ה-15.

מעבר למתן מנה מלאה:

המנה המלאה הראשונה (48 מ"ג) של טפקינלי תינתן לך במחזור 1 ביום ה-22. הרופא שלך עשוי לבקש ממך להישאר בבית החולים או להיות במעקב אמבולטורי ל-24 שעות אחרי המנה המלאה הראשונה (48 מ"ג), מפני שזהו הזמן בו הסיכוי להופעת תגובות כגון תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS), תסמונת רעילות נוירולוגית (ICANS) וחום הוא הגבוה ביותר.

כאשר תקבל טפקינלי כטיפול יחיד, טפקינלי יינתן כל עוד הרופא שלך חושב שאתה מפיק תועלת מהטיפול.

כאשר תקבל טפקינלי בשילוב עם לנלידומיד וריטוקסימאב, טפקינלי יינתן לך ל-12 מחזורי טיפול.

ייתכן שהרופא שלך ידחה או יפסיק לגמרי את הטיפול שלך עם טפקינלי אם מופיעות אצלך תופעות לוואי מסוימות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם שכחת לקחת טפקינלי

אם שכחת או פספסת את התור שלך במרפאה, צור מיד קשר עם הרופא שלך לקבלת הנחיות. חשוב מאוד לא לפספס אף מנה על מנת שלטיפול תהיה יעילות מלאה. יש להתמיד בטיפול כפי שנקבע על-ידי הרופא.

אם אתה מפסיק לקחת טפקינלי

אל תפסיק את הטיפול עם טפקינלי אלא אם שוחחת על כך עם הרופא שלך. הסיבה לכך היא שהפסקת הטיפול עלולה להחמיר את מצבך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בטפקינלי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות

ספר לרופא שלך מיד אם אתה מבחין באחד מהתסמינים של תופעות הלוואי החמורות הבאות. ייתכן שיופיעו אצלך רק אחד או חלק מתסמינים אלו. לפירוט נוסף אנא ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה".

תסמונת שחרור ציטוקינים (CRS) (תופעת לוואי שכיחה מאוד: תופעות שמופיעות ביותר

ממשתמש אחד מעשרה)

התסמינים יכולים לכלול:

- חום
- הקאה
- סחרחורת או תחושת סחרור
- צמרמורות
- דופק מהיר
- קשיי נשימה/קוצר נשימה
- כאב ראש

תסמונת רעילות נוירולוגית (ICANS) (תופעת לוואי שכיחה: תופעות שמופיעות ב-10-1

משתמשים מתוך 100)

• השפעות על מערכת העצבים שלך, כאשר התסמינים לכך עלולים להופיע ימים או שבועות לאחר קבלת הזריקה. ההשפעות עשויות להיות קלות בהתחלה. חלק מהתסמינים הללו יכולים להיות סימנים לתגובה חיסונית חמורה המכונה "תסמונת רעילות נוירולוגית" (ICANS).

התסמינים יכולים לכלול:

- קושי בדיבור או בכתיבה
- ישנוניות
- בלבול/חוסר התמצאות

- חולשת שרירים
- פרכוסים
- אובדן זיכרון

תסמונת פירוק הגידול (TLS) (תופעת לוואי שכיחה: תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100)

התסמינים יכולים לכלול:

- חום
- צמרמורות
- הקאה
- בלבול
- קוצר נשימה
- פרכוסים
- פעימות לב לא סדירות
- שתן כהה או עכור
- עייפות חריגה
- כאבי שרירים או מפרקים

המופגוציטיק-לימפופהיסטיוציטוזיס (HLH) (תופעת לוואי שאינה שכיחה: תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000)

- מצב בו מערכת החיסון מייצרת יותר מדי תאים הנלחמים בזיהומים, אשר בדרך כלל נחשבים לתאים תקינים, הנקראים היסטיוציטים ולימפוציטים.
- התסמינים יכולים לכלול:

- חום
- פריחה בעור
- בלוטות לימפה נפוחות
- בעיות נשימה
- הופעת חבורות בקלות

תופעות לוואי אחרות

ספר מיד לרופא שלך או לאחות אם אתה מבחין באחת מתופעות הלוואי הבאות או אם הן מחמירות:

טפקינלי כטיפול יחיד בחולי לימפומה ממושטת של תאי B גדולים (DLBCL) ולימפומה פוליקולרית (FL):

תופעות לוואי שכיחות מאוד: תופעות המופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה

- זיהום ויראלי
- דלקת ריאות (זיהום בריאה)
- זיהומים בדרכי הנשימה העליונות (זיהום של דרכי הנשימה)
- ירידה בתיאבון
- כאבים בעצמות, במפרקים, ברצועות ובשרירים

- כאבים באזור הבטן
- כאב ראש
- בחילה
- שלשול
- פריחה
- עייפות
- תגובות באזור ההזרקה
- חום
- נפיחות

תופעות לוואי שנצפו בבדיקות דם :

- רמות נמוכות של סוג של תאי דם לבנים הנלחמים בזיהום (נויטרופניה)
- רמות נמוכות של תאי דם אדומים, מצב שעלול לגרום לעייפות, עור חיור וקוצר נשימה (אנמיה)
- רמות נמוכות של טסיות דם, מצב שעלול להוביל לדימום ולחבורות (תרומבוציטופניה)
- ירידה בסוג של תאי דם לבנים הנקראים לימפוציטים, מצב שעלול להשפיע על יכולת הגוף להילחם בזיהום (לימפופניה)
- רמות נמוכות של נוגדנים (אימונוגלובולינים), אשר עלולות להוביל לזיהומים

תופעות לוואי שכיחות: תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100

- חום הנגרם מזיהום כאשר יש לך רמות נמוכות של תאי דם לבנים (חום נויטרופני)
- בלוטות לימפה נפוחות ורגישות, כאבים בחזה, שיעול או קושי לנשום, כאבים במקום הגידול (התלקחות הגידול)
- זיהומים פטרייתיים (הנגרמים על-ידי סוג של מיקרואורגניזם הנקרא פטרייה)
- זיהומים בעור
- תגובה מסכנת חיים של הגוף לזיהום (ספסיס)
- פירוק מהיר של תאי הגידול הגורם לשינויים כימיים בדם ולפגיעה באיברים, כולל הכליות, הלב והכבד (תסמונת פירוק הגידול)
- פעימות לב לא סדירות
- הצטברות נוזל סביב הריאות שיכול להקשות על הנשימה (תפליט פלאורלי)
- הקאה
- גירוד (גרד)

תופעות לוואי שנצפו בבדיקות דם :

- רמה נמוכה בדם של פוספטים, אשלגן, מגנזיום או נתרן
- עלייה ברמת הקראטינין בדם, תוצר פירוק של רקמת שריר
- עלייה ברמת חלבוני הכבד בדם, שעלולה להעיד על בעיות עם הכבד

טפקנילי, בשילוב עם לנלדומיד וריטוקסימאב, בחולי לימפומה פוליקולרית (FL):

תופעות לוואי שכיחות מאוד: תופעות המופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה

- זיהומים בדרכי הנשימה העליונות (זיהום של דרכי הנשימה)
- וירוס הקורונה (COVID-19)
- דלקת ריאות (זיהום בריאה)
- קשיי שינה

- השפעות על מערכת העצבים שלך (שינויים נוירולוגיים)
- כאב ראש
- שלשול
- עצירות
- בחילה
- פריחה
- עייפות
- תגובות באזור ההזרקה
- חום
- דלקת של הריאות, שהן השכבה הלחה המצפה את מערכות העיכול, הנשימה, השתן והמין
- כאב בטן
- כאבים בשרירים או במפרקים
- נפיחות
- נוירופתיה פריפרית (היקפית)
- תופעות לוואי שנצפו בבדיקות דם :
 - רמות נמוכות של סוג של תאי דם לבנים הנלחמים בזיהום (נויטרופניה)
 - רמות נמוכות של תאי דם אדומים, מצב שעלול לגרום לעייפות, עור חיור וקוצר נשימה (אנמיה)
 - רמות נמוכות של טסיות דם, מצב שעלול להוביל לדימום ולחבורות (תרומבוציטופניה)
 - ירידה בסוג של תאי דם לבנים הנקראים לימפוציטים, מצב שעלול להשפיע על יכולת הגוף להילחם בזיהום (לימפופניה)
 - רמה נמוכה בדם של אשלגן, זרחן ונתרן
 - עלייה ברמת חלבוני הכבד בדם, שעלולה להעיד על בעיות עם הכבד

תופעות לוואי שכיחות: תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100

- זיהום ויראלי העלול לגרום לחום, כאב, אודם ו/או קושי בנשימה (זיהום של ציטומגלו-וירוס (CMV)
- זיהום ויראלי בפה או באיברי המין (זיהום מנגיף ההרפס)
- חום הנגרם מזיהום כאשר יש לך רמות נמוכות של תאי דם לבנים (חום נויטרופני)
- הקאות
- כאב במפרקים
- סחרחורת
- אלח דם (ספסיס)
- בלוטות לימפה נפוחות ורגישות, כאבים בחזה, שיעול או קושי לנשום, כאבים במקום הגידול (התלקחות הגידול)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור :

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא. טפקינלי תאוחסן על-ידי הרופא, האחיות או הרוקח בבית החולים או במרפאה. כדי לאחסן כראוי את התכשיר:

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי תווית הבקבוקון ואריזת הקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן ולהוביל בקירור (2°C - 8°C).
- אין להקפיא.
- יש לשמור את הבקבוקון באריזת הקרטון החיצונית על מנת להגן מפני אור.
- אם לא נעשה שימוש מיידי, ניתן לאחסן את התמיסה המוכנה (לאחר הפתיחה) עד ל-24 שעות ב- 2°C - 8°C מרגע ההכנה.
- במהלך 24 השעות הללו, ניתן לאחסן את התמיסה המוכנה למשך עד 12 שעות בטמפרטורת החדר (20°C - 25°C) מתחילת הכנת המנה ועד למתן.
- יש לאפשר לתמיסה להגיע לטמפרטורת החדר לפני השימוש.

הרופא שלך, האחיות או הרוקח ישליכו כל תרופה שאינה בשימוש בהתאם לדרישות המקומיות. אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

מה טפקינלי מכילה

- נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

D-Sorbitol, sodium acetate trihydrate, polysorbate 80, acetic acid glacial, water for injection

(ראה בסעיף 2 "טפקינלי מכילה נתרן", "טפקינלי מכילה סורביטול" ו-"טפקינלי מכילה פוליסורבט").

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

טפקינלי היא תמיסה להזרקה. זו תמיסה חסרת צבע עד צהבהבה המגיעה בבקבוקון זכוכית. כל אריזת קרטון מכילה בקבוקון אחד.

בעל הרישום וכתובתו: אבווי ביופארמה בע"מ, החרש 4, הוד השרון, ישראל.

שם היצרן וכתובתו:

אבווי דויטשלנד ג'י.אמ.בי. אייץ' אנד קו. קיי.ג'י. קנולשטרסה, 67061, לודויגשפן, גרמניה.

נערך ביוני 2026.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופה הממלכתי במשרד הבריאות: 176-08-37756

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

The following information is intended for healthcare professionals only:

Epcoritamab is prepared and administered as a subcutaneous injection.

Each vial of epcoritamab is intended for single use only.

Each vial contains an overfill that allows withdrawal of the labelled amount.

Epcoritamab must be prepared and administered by a healthcare professional using aseptic technique -**No dilution required.**

Tepkinly 48 mg vial is supplied as ready-to-use solution that does not need dilution prior to administration. Filtration of the solution is not required.

Epcoritamab should be inspected visually for particulate matter and discolouration prior to administration. The solution for injection should be a colourless to slightly yellow solution. Do not use if the solution is discoloured, or cloudy, or if foreign particles are present.

1) Prepare Tepkinly vial
a) Retrieve one 48 mg Tepkinly vial with the orange cap from the refrigerator.
b) Allow the vial to come to room temperature for no more than 1 hour.
c) Gently swirl the Tepkinly vial.
DO NOT vortex or vigorously shake the vial.
2) Withdraw dose
Withdraw 0.8 ml of Tepkinly into a syringe.
3) Label syringe
Label the syringe with the product name, dose strength (48 mg), date and the time of day.
4) Discard the vial and any unused portion of Tepkinly in accordance with local requirements.

Storage for prepared Tepkinly

- Use immediately or store Tepkinly solution in a refrigerator and protect from light for up to 24 hours at 2 °C to 8 °C from the time of preparation.
- Within these 24 hours, Tepkinly solution can be stored for up to 12 hours at room temperature from the start of dose preparation to administration.
- Minimise exposure to daylight.

- Allow Tepkinly solution to equilibrate to room temperature before administration.
- Discard unused Tepkinly solution beyond the allowable storage time.

Traceability

In order to improve the traceability of biological medicinal products, the name and the batch number of the administered product should be clearly recorded.