

<p>עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986</p>
<p>התרופה משווקת על פי משרד רופא בלבד</p>

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

לוטן 12.5, 50, 100 טבליות

הרכב:

כל טבלייה של **לוטן 12.5** מכילה:

לוסרטן פוטסיום 12.5 מ"ג
100 mg Losartan potassium

כל טבלייה של **לוטן 50** מכילה:

לוסרטן פוטסיום 50 מ"ג
100 mg Losartan potassium

כל טבלייה של **לוטן 100** מכילה:

לוסרטן פוטסיום 100 מ"ג
100 mg Losartan potassium

לרשימת החומרים הבלתי פעילים והאלרגנים בתכשיר אנא ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב בנוגע לחלק מהמרכיבים של לוטן".

קרא בעיון עלון זה עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על **לוטן**. אם יש לך שאלות נוספות, שאל את הרופא או הרוקח.
לתרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק אפילו אם נראה כי מצבם הרפואי דומה לשלך.

- למה מיועדת התרופה?**
לוטן 12.5 מ"ג, 50 מ"ג ו-100 מ"ג מותווים לטיפול באי ספיקת לב.
לוטן 50 ולוטן 100 מותווים גם לטיפול ביתר לחץ דם (לחץ דם גבוה) וסיוע בהורדת הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים, כגון שבץ, בחולים העיקר) של הלב.
לוטן 50 ולוטן 100 גם מספקים הגנה כלייתית על ידי דחיתי ההתמרה של מחלת הכליה בחולי סוכרת מסוג 2 המלווה בהפרשת חלבון בשתן (פרוטאינווריה).
קבוצה תרופיסית: לוטן הינו חוסם הרצפטור אנגיוטנסין II.
- לפני השימוש בתרופה**

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) ללוסרטן או לכל אחד מהמרכיבים האחרים של תרופה זו (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").

הרופא שלך עשוי לבדוק את תפקוד הכליות שלך, לחץ הדם וכמות האלקטרוליטים (לדוגמה אשלגן) בדם שלך במרווחי זמן קבועים.
ראה גם מידע בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם".

• יש לך ליקוי חמור בתפקוד הכבד.

- הנך נוטל תרופות אחרות העלולות להעלות את רמות האשלגן בסרום (ראה גם מידע בסעיף 2 "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות").

ספר לרופא שלך אם אתה חווה כאבי בטן, בחילות, הקאות או שלשולים לאחר נטילת **לוטן**. הרופא שלך יחליט על המשך הטיפול. אל תפסיק את נטילת **לוטן** על דעת עצמך.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

ספר לרופא שלך אם הנך נוטל תוספי אשלגן, תחליפי מלח המכילים אשלגן, תרופות אוצרות אשלגן כגון משתנים מסוימים (אמילוריד, טריאמטרן, ספירונולקטן) או תרופות אחרות העלולות להעלות את רמות האשלגן בסרום (לדוגמה, הפרין, תרופות המכילות טרימתופרים), אשר שילובן עם **לוטן** אינו מומלץ.

היזהר במיוחד אם הנך נוטל את התרופות הבאות בזמן הטיפול ב**לוטן**:

- תרופות אחרות להורדת לחץ דם, מכיוון שהן עשויות להוריד עוד יותר את לחץ הדם שלך. לחץ הדם עלול לרדת גם כתוצאה מנטילת אחת מהתרופות/קבוצת תרופות הבאות: גונדי דיכאון מסוג טריציקליים, תרופות אנטיפסיכוטיות, באקלופן, אמפוסטין.
- תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות. כגון אינדומתאצין, כולל מעכבי COX-2 (תרופות המפחיתות דלקת ושניתן להשתמש בהן על מנת לסייע בהקלת כאב), מכיוון שהן עשויות להפחית את ההשפעה מורידת לחץ הדם של לוסרטן.
- ייתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המנה ו/או לנקוט אמצעי זהירות אחרים: אם הנך נוטל מעכב ACE עם אליסקירן (ראה גם מידע בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם" ו-אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בתרופה"). אם יש לך ליקוי בתפקוד הכליות, שימוש בו זמני בתרופות אלה עלול להוביל להרעה בתפקוד הכלייתי.
- אין ליטול לוסרטן בשילוב עם תרופות המכילות ליתיום ללא השגחה צמודה של הרופא שלך. אמצעי זהירות מיוחדים (לדוגמה, ביצוע בדיקות דם) עשויים להיות מתאימים.
- שימוש בתרופה ומזון**
ניתן ליטול **לוטן** עם או בלי אוכל.
- יש להימנע משתיית מיץ אשכוליות בזמן נטילת **לוטן**.

היריון, הנקה ופוריות

היריון

חובה עלייך לספר לרופא שלך אם את חושבת שאת בהיריון (או עשויה להיכנס להיריון). הרופא שלך ימליץ לך בדרך כלל להפסיק ליטול **לוטן** לפני כניסתך להיריון או ברגע שנודע לך כי הנך בהיריון וימליץ לך ליטול תרופה אחרת במקום **לוטן**. **לוטן** אינו מומלץ בתחילת ההיריון ואין

ליטול אותו אם הנך בהיריון יותר מ-3 חודשים, רמות האשלגן בסרום (ראה גם מידע בסעיף 2 "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות").

הנקה

ספרי לרופא שלך אם הנך מניקה או עומדת להתחיל להניק. **לוטן** אינו מומלץ לאימהות מניקות, והרופא שלך עשוי לבחור עבורך טיפול אחר אם את מעוניינת להניק. במיוחד אם התינוק שלך נולד זה עתה, או נולד לפני הזמן.

יש להיוועץ ברופא שלך או ברוקח לפני נטילת תרופה זו.

נהיגה ושימוש במכוונת
לא נעשו מחקרים בנוגע להשפעות על היכולת לנהוג או לתפעל מכוונת.

לא סביר כי **לוטן** ישפיע על היכולת שלך לנהוג או להפעיל מכוונת. למרות זאת, כמו עם תרופות רבות אחרות המשמשות לטיפול בלחץ דם גבוה, לוסרטן עלול לגרום לסחרחורת או נמנום באנשים מסוימים. אם אתה חווה סחרחורת או נמנום, עלך להתייעץ עם הרופא שלך לפני שאתה מנסה לבצע פעילויות כאלה.

מידע חשוב בנוגע לחלק מהמרכיבים של לוטן טבליות
לוטן מכילות לקטוז (לתכולת לקטוז, ראה סעיף 6 "מידע נוסף"). אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, צור קשר עם הרופא שלך לפני נטילת תרופה זו.
טבליות לוטן מכילות אשלגן (לתכולת אשלגן, ראה סעיף 6 "מידע נוסף"). יש לקחת זאת בחשבון עבור מטופלים עם תפקוד כליות ירוד או מטופלים בדיאטת אשלגן מבוקרת.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם **לוטן 50** אם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. הרופא שלך יקבע את המינון המתאים של **לוטן** ומשך הטיפול, בהתחשב במצבך ואם אתה נוטל תרופות אחרות. חשוב להמשיך ליטול **לוטן** כל עוד הרופא שלך רושם לך אותו, על מנת לשמר את השליטה בלחץ הדם שלך.

חולים מבוגרים עם לחץ דם גבוה
הטיפול מתחיל בדרך כלל עם 50 מ"ג של לוסרטן (טבלייה אחת של **לוטן 50**) פעם ביום. ההשפעה המרבית של הורדת לחץ הדם אמורה להיות מושגת 3-6 שבועות לאחר תחילת הטיפול. בחולים מסוימים לעיתים יהיה צורך להעלות את מינון התרופה לאחר מכן ל-100 מ"ג לוסרטן (טבלייה אחת של **לוטן 100**), פעם ביום. אם הנך מתרשם כי ההשפעה של לוסרטן הינה חזקה או חלשה מדי, אנא דבר עם הרופא שלך או הרוקח.

חולים מבוגרים עם לחץ דם גבוה, סוכרת מסוג 2 וחלבון בשתן
הטיפול מתחיל בדרך כלל עם 50 מ"ג לוסרטן (טבלייה אחת של **לוטן 50**) פעם ביום. בחולים מסוימים לעיתים יהיה צורך להעלות את מינון התרופה ל-100 מ"ג לוסרטן (טבלייה אחת

של **לוטן 100**), פעם ביום, בהתאם להשפעת התרופה על לחץ הדם.

ניתן ליטול לוסרטן יחד עם תרופות אחרות להורדת לחץ הדם (למשל משתנים, חוסמי תעלות סידן, חוסמי-אלפא או חוסמי-בטא ותכשירים בעלי פעילות מרכזית), וכן, גם עם אינסולין ותרופות אחרות המשמשות באופן נפוץ להורדת רמת הגלוקוז בדם (למשל, סולפונילאוריאה, גליטזון ומעכבי גלוקוזידאז).

חולים מבוגרים עם אי ספיקת לב
הטיפול מתחיל בדרך כלל עם 12.5 מ"ג לוסרטן (טבלייה אחת של **לוטן 12.5**) פעם ביום. בדרך כלל, יש להעלות את המנה כל שבוע, צעד אחר צעד (כלומר 12.5 מ"ג ליום במהלך השבוע הראשון, 25 מ"ג ליום במהלך השבוע השני, 50 מ"ג ליום במהלך השבוע השלישי, 100 מ"ג ליום במהלך השבוע הרביעי, 150 מ"ג ליום במהלך השבוע החמישי) עד למנת האחזקה כפי שנקבעה על ידי הרופא שלך. המקסימלית היא 150 מ"ג (שלוש טבליות של **לוטן 50 מ"ג**), פעם ביום.

בטיפול באי ספיקת לב, לוסרטן ניתן לרוב בשילוב עם משתן (תרופה אשר מעלה את כמות המים שהנך מפריש באמצעות הכליות שלך) ו/או דיג'יטליס (תרופה המסייעת לחיזוק וייעול פעילות הלב) ו/או חוסם-בטא.

מינון בקבוצות חולים מיוחדות
הרופא עשוי להמליץ על מינון נמוך יותר, במיוחד כשמתחילים טיפול בחולים מסוימים, כגון אלו המטופלים עם משתנים במינונים גבוהים, בחולים עם ליקוי כבד או בחולים מעל גיל 75 שנים. אין להשתמש בלוסרטן בחולים עם ליקוי חמור כבד (ראה בסעיף 2 "אין להשתמש בתרופה אם").

אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן המתן
יש לבלוע את הטבליות בשלמותן עם כוס מים. עליך לנסות ליטול את המנה היומית שלך **בצור** באותו זמן כל יום. חשוב להמשיך ליטול **לוטן** עד שהרופא שלך יאמר לך אחרת.

12.5: אין לחצות את הטבלייה.

לוטן 50, לוטן 100: במידת הצורך ניתן לחצות את הטבלייה לשימוש מידי.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
חסמינים של מינון יתר הם: לחץ דם נמוך, דופק מוגבר, תיתכן ירידה בדופק. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה
אם שכחת ליטול את המנה היומית, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. חשוב להמשיך ליטול **לוטן** כל עוד הרופא שלך

רושם לך אותו על מנת לשמר את השליטה בלחץ הדם שלך.

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הנך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות כלשהן בנוגע לשימוש בתרופה, שאל את הרופא או הרוקח שלך.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב**לוטן** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות לרופא או לחדר המיון הקרוב אם הופיעה:
תגובה אלרגית חמורה (פריחה, גירוד, התנפחות של הפנים, השפתיים, הפה או הגרון אשר עלולים לגרום לקושי בבליעה או בנשימה). זוהי תופעת לוואי חמורה אך נדירה אשר מופיעה בשכיחות של 1-10 מטופלים מתוך 10,000. ייתכן שתזדקק לטיפול רפואי דחוף או לאשפוז.

תופעות הלוואי הבאות דורחו על נוטן:
תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב-10 ל-1 משתמשים מתוך 100:
סחרחורת.

- לחץ דם נמוך (במיוחד לאחר אובדן מוגבר של מים מהגוף מתוך כלי הדם, לדוגמה בחולים עם אי ספיקת לב קשה או תחת טיפול במינונים גבוהים של משתנים).
- תופעות של תת לחץ דם תנזחתי התלויות במינון כגון, ירידת לחץ דם המופיעה כשקמים ממצב של שכילה או ישיבה.
- תשישות.
- עייפות.
- סוכר נמוך מדי בדם (היפוגליקמיה).
- אשלגן גבוה מדי בדם (היפרקלמיה).
- שינויים בתפקוד הכליה, כולל אי ספיקת כליות.

ירידה במספר תאי דם אדומים (אנמיה).
עלייה באוריאה בדם, בקראטינין בסרום ובאשלגן בסרום בחולים עם אי ספיקת לב.

תופעות לוואי לא שכיחות (uncommon) – תופעות שמופיעות ב-10 ל-1 משתמשים מתוך 1,000:

- ירידה במספר תאי דם אדומים (אנמיה).
- עלייה באוריאה בדם, בקראטינין בסרום ובאשלגן בסרום בחולים עם אי ספיקת לב.
- תופעות לוואי לא שכיחות (uncommon) – תופעות שמופיעות ב-10 ל-1 משתמשים מתוך 1,000:**
 - שינוניים.
 - כאב ראש.
 - הפרעות בשינה.
 - הרגשה של קצב לב מוגבר (פלפיטציות).
 - כאב חמור בחזה (אנגינה פקטוריס).
 - קוצר נשימה (דיספניאה).
 - כאב בטן.
 - עצירות כשה.
 - שלשול.
 - בחילה.
 - הקאה.

- סרפדת (אורטיקריה).
- גרד (פרוריטוס).
- פריחה.
- נפיחות מקומית (בצקת).
- שיעול.

תופעות לוואי נדירות (rare) – תופעות שמופיעות ב-10 ל-1 משתמשים מתוך 10,000:
רגישות יתר.

- אנגיאדמה.
- אנגיאדמה במעיים: נפיחות במעיים המלווה בתסמינים כמו כאבי בטן, בחילות, הקאות ושלשולים.
- דלקת של כלי הדם (וסקוליטיס, כולל Henocho-Schönlein purpura).
- חוסר תחושה או תחושת עקצוץ (פאראסטיה).
- התעלפות (סינקופה).
- דופק מהיר מאוד ולא סדיר (פרפור עליות).
- דופק.
- חוסר תחושה או תחושת עקצוץ (פאראסטיה).
- דלקת של הכבד (הפטיטיס).
- עלייה ברמות בדם של אלאנין אמינוטרנספראז (ALT), שעוברת בדרך כלל עם הפסקת הטיפול.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות לוואי שכיחותן טרם נקבעה):
ירידה במספר הטרומבוציטים.

- מייגרנה.
- ליקויים בתפקודי כבד.
- כאבי שרירים ומפרקים.
- חססנינים דמויי שפעת.
- כאבי בטן ודלקת בדרכי השתן.
- עלייה ברגישות לשמש (פוטוסנסיטיביטי).
- כאבי שרירים בלתי מוסברים עם שתן כהה (בצבע תה) (רבונומיולייס).
- אין-אונות.
- דלקת הלבלב (פנקראטיטיס).
- רמות נמוכות של נתרן בדם (היפונתרמיה).
- דיכאון.
- הרגשה כללית לא טובה.
- צלצולים, זמזומים, שאגות או נקישות באוזניים (טיניטוס).
- הפרעה בטעם.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מתמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il בנוסף, ניתן לדווח לחברת "**אוניפארם בע"מ**".

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש ב**לוטן** לאחר תאריך התפוגה (exp. date) אשר מצוין על האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של החודש המצוין.
- יש לאחסן את התרופה מתחת ל-25°C ובמקום מוגן מאור.
- אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה הביתית. היוועץ ברוקח כיצד להשמיד תרופות שאין בהן עוד צורך. נקיטה באמצעים אלו תסייע במשימה על איכות הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Lactose anhydrous; Microcrystalline cellulose; Pregelatinized starch; Magnesium stearate; White coating blend (Hypromellose, Titanium dioxide, Polyethylene glycol).

לוטן 12.5 מכיל אשלגן בכמות הבאה: 1.06 מ"ג (0.027 מילי-אקוויוולנט).

לוטן 50 מכיל אשלגן בכמות הבאה: 4.24 מ"ג (0.108 מילי-אקוויוולנט).

לוטן 100 מכיל אשלגן בכמות הבאה: 8.48 מ"ג (0.216 מילי-אקוויוולנט).

לוטן 12.5 מכיל לקטוז בכמות הבאה: 25.1 מ"ג.

לוטן 50 מכיל לקטוז בכמות הבאה: 100.4 מ"ג.

לוטן 100 מכיל לקטוז בכמות הבאה: 200.8 מ"ג.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

לוטן ארז בתוך משוית (בליסטר) אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון. בכל אריזה יש 5, 7, 10, 14, 20, 28 או 30 טבליות. ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.

טבליות של **לוטן 12.5** הינן מצופות, עגולות, קמורות משני צידיהן, בצבע לבן.

טבליות של **לוטן 50** הינן מצופות, עגולות, קמורות משני צידיהן עם קו חצייה מצדן האחד, בצבע לבן.

טבליות של **לוטן 100** הינן מצופות, אובליות, קמורות משני צידיהן עם קו חצייה מצדן האחד, בצבע לבן.

שם בעל הרישום וכתובתו: אוניפארם בע"מ, ת.ד. 16545, ת"א, 6116401.

שם היצרן וכתובתו: אוניפארם בע"מ, פארק תעשייה "מבוא כרמל".

מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

לוטן 12.5: 137 93 31629 01
לוטן 50: 137 94 31630 01
לוטן 100: 139 36 31707 01

נערך בפברואר 2026 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

למידע נוסף על התכשיר ועלעלונים מעדכנים בשפות עברית, ערבית ואנגלית, סירקו את הקוד הבא:
For further information about the medicinal product and for updated patient leaflets in Hebrew, Arabic and English, please scan the following code:

לוטן 12.5 LOTAN



לוטן 50 LOTAN



לוטן 100 LOTAN



ניתן לפנות לבעל הרישום של התכשיר בבקשה לקבל עלון מודפס לצרכן בשפה האנגלית בכתובת הדואר האלקטרוני: info@unipharm.co.il

או בטלפון מספר: 03-6135050.
To receive a printed patient leaflet in English, you can contact the registration holder by email: info@unipharm.co.il or by telephone: 03-6135050.

	
unipharm	אוניפארם

<p>100, 50, 12.5</p>
<p>טבליות</p>