<u>עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986</u>
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

קיסימפטה
תמיסה להזרקה בעט מוכן לשימוש
להזרקה תת-עורית

החומר הפעיל:
אופטומומאב 50 מ"ג/מ"ל
ofatumumab 50 mg/ml

כל 1 מ"ל של תמיסה להזרקה מכיל 50 מ"ג אופטומומאב.
כל עט מוכן לשימוש מכיל 20 מ"ג אופטומומאב ב-0.4 מ"ל תמיסה.

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. <u>למה מיועדת התרופה?</u>
קיסימפטה מיועדת לטיפול במבוגרים הסובלים מצורות נשנות של טרשת נפוצה (RMS - relapsing forms of multiple sclerosis) עם מחלה פעילה המוגדרת על ידי מאפיינים קליניים או הדמייתיים.

קבוצה תרפויטית: תרופות מדכאות חיסון מסוג נוגדנים חד-שבטיים
(immunosuppressants, monoclonal antibodies)

איך עובדת קיסימפטה
קיסימפטה עובדת על ידי קשירה לקולטן הנקרא CD20 על פני תאי B. תאי B הם סוג של תאי דם לבנים המהווים חלק ממערכת החיסון (הגנות הגוף). בטרשת נפוצה, המערכת החיסונית תוקפת את שכבת המגן סביב תאי העצב. תאי B מעורבים בתהליך זה. קיסימפטה מאתרת ומסלקת את תאי B ובכך מפחיתה את הסיכוי להישנות, מקלה על התסמינים ומאטה את התקדמות המחלה.

2. <u>לפני השימוש בתרופה</u>

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאופטומומאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים בתרופה זו (מפורטים בפרק 6).
- נאמר לך שיש לך בעיות חמורות במערכת החיסון.
- אתה סובל מזיהום חמור.
- יש לך סרטן.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
שוחח עם הרופא טרם השימוש בקיסימפטה
- קיסימפטה עלולה לגרום להפעלה מחודשת של נגיף הפטיטיס B. הרופא יבצע בדיקת דם על מנת לבדוק האם אתה מצוי בסיכון לזיהום בהפטיטיס B. אם בדיקה זו תראה שחלית בהפטיטיס B בעבר או שאתה נשא של נגיף הפטיטיס B, הרופא יבקש ממך לפנות למומחה.
- בטרם תתחיל טיפול בקיסימפטה, הרופא עשוי לבדוק את מערכת החיסון שלך.
- אם אתה סובל מזיהום, הרופא עשוי להחליט שאינך יכול לקבל קיסימפטה או עשוי לדחות את הטיפול שלך בקיסימפטה עד אשר הזיהום יחלוף.
- הרופא יבדוק האם אתה זקוק לחיסונים בטרם תתחיל בטיפול בקיסימפטה. אם אתה זקוק לחיסון מסוג המכונה חיסון חי או חי-מוחלש, הוא צריך להינתן לפחות 4 שבועות טרם תחילת הטיפול בקיסימפטה. סוגים אחרים של חיסונים צריכים להינתן לפחות שבועיים טרם תחילת הטיפול בקיסימפטה.

במהלך השימוש בקיסימפטה
דווח לרופא:
- אם הופיעה אצלך תגובה כללית הקשורה להזרקה או תגובה מקומית הקשורה למקום ההזרקה. אלו הן תופעות הלוואי השכיחות ביותר של קיסימפטה והן מתוארות בפרק 4. תופעות לוואי אלה בדרך כלל מתרחשות במהלך 24 שעות לאחר הזרקת קיסימפטה, במיוחד לאחר ההזרקה הראשונה. ההזרקה הראשונה צריכה להתבצע תחת הנחיית איש צוות רפואי.
- אם אתה סובל מזיהום. אתה עלול לפתח זיהומים בקלות רבה יותר או זיהום שכבר קיים אצלך עלול להחמיר. הסיבה לכך היא שתאי החיסון בהם קיסימפטה מתמקדת מסייעים גם במלחמה בזיהום. הזיהומים עלולים להיות חמורים ולעיתים אף מסכני חיים.
- אם אתה מתכנן לקבל חיסונים כלשהם. הרופא יאמר לך אם החיסון לו אתה זקוק הוא חיסון חי, חיסון חי-מוחלש או חיסון מסוג אחר. אין לקבל חיסונים חיים או חיים-מוחלשים במהלך הטיפול בקיסימפטה, מאחר שהדבר עלול להוביל לזיהום. סוגים אחרים של חיסונים עשויים להיות פחות יעילים אם הם ניתנים במהלך הטיפול בקיסימפטה.

דווח לרופא באופן מיידי אם תחווה את אחד התסמינים הבאים במהלך הטיפול בקיסימפטה, מאחר שהם עלולים להיות סימנים למצב חמור:
- אם יש לך פריחה, סרפדת, קשיי נשימה, התנפחות של הפנים, העפעפיים, השפתיים, הפה, הלשון או הגרון, לחץ בחזה, או אם אתה מרגיש מעולף. אלה יכולים להיות סימנים או תסמינים של תגובה אלרגית.
- אם אתה חושב שהטרשת הנפוצה מחמירה (כגון חולשה או שינויי ראייה) או אם אתה מבחין בתסמינים חדשים או חריגים כלשהם. תופעות אלו עלולות להעיד על הפרעה מוחית נדירה המכונה לויקואנצפלופתיה רב-מוקדית מתקדמת (PML), אשר נגרמת על ידי זיהום נגיפי.

ילדים ומתבגרים
תרופה זו אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18.
לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתרופה זאת בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות
אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
בפרט, דווח לרופא או לרוקח:
- אם אתה נוטל, נטלת לאחרונה או עשוי ליטול תרופות המשפיעות על מערכת החיסון. זאת מכיוון שלתרופות אלה עשויה להיות השפעה נוספת על מערכת החיסון.
- אם אתה מתכנן לקבל חיסונים כלשהם (ראה "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" לעיל).

היריון והנקה
אם את בהיריון או מניקה, חושבת שאת עשויה להיות בהיריון או מתכננת להרות, היוועצי ברופא טרם השימוש בתרופה זו.

<u>היריון</u>
עלייך להימנע מלהרות במהלך השימוש בקיסימפטה ובמשך חודשיים לאחר הפסקת השימוש בה.

אם קיימת אפשרות לכך שתהרי, עלייך להשתמש באמצעי מניעה יעיל במהלך הטיפול ובמשך חודשיים לאחר הפסקת הטיפול בקיסימפטה. היוועצי ברופא לגבי האפשרויות הזמינות.

אם הרית או אם את חושבת שאת עשויה להיות בהיריון במהלך הטיפול או בטווח של חודשיים לאחר המנה האחרונה, דווחי לרופא באופן מיידי. הרופא ישוחח עמך על הסיכונים הפוטנציאליים של קיסימפטה להיריון. הסיבה לכך היא שקיסימפטה יכולה להפחית את מספר תאי החיסון (תאי B) הן באם והן בעובר. את יכולה לדווח על הריונך באמצעות פנייה לנציגות המקומית של נוברטיס (ראי פרק 6), בנוסף לפנייה לרופא.

<u>הנקה</u>
קיסימפטה יכולה לעבור לחלב אם בכמויות קטנות. שוחחי עם הרופא לגבי התועלות והסיכונים בטרם תניקי את תינוקך במהלך השימוש בקיסימפטה.

<u>מתן חיסון לתינוקות יילודים</u>
היוועצי ברופא או ברוקח טרם מתן חיסון לתינוק היילוד שלך אם השתמשת בקיסימפטה במהלך הריונך (ראי "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" לעיל).

נהיגה ושימוש במכונות
לקיסימפטה אין השפעה או שיש השפעה זניחה על היכולת לנהוג ולהשתמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
נתרן
תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ״ג) למנה, לפיכך היא למעשה ״נטולת נתרן״.

פוליסורבט 80 (polysorbate 80)
תרופה זו מכילה 0.08 מ״ג של פוליסורבט 80 במנה.
מרכיבים מסוג פוליסורבט עשויים לגרום לתגובות אלרגיות. ספר לרופא שלך אם יש לך אלרגיות כלשהן.

3. כיצד תשתמש בקיסימפטה?
יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.
קיסימפטה ניתנת בהזרקה תת-עורית (מתחת לעור).
ההזרקה הראשונה צריכה להתבצע תחת הנחיית איש צוות רפואי.
עטי קיסימפטה מוכנים לשימוש מיועדים לשימוש חד-פעמי בלבד.
להוראות מפורטות לגבי אופן ההזרקה של קיסימפטה, ראה ״הוראות לשימוש בעט קיסימפטה מסוג Sensoready״ בסוף עלון זה.
אתה יכול להשתמש בקיסימפטה בכל שעה של היום (בוקר, אחר הצהריים או ערב).

באיזו כמות של קיסימפטה יש להשתמש ובאיזו תדירות יש להשתמש בה
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:
- מינון התחלתי של 20 מ״ג קיסימפטה הניתן ביום הראשון לטיפול (שבוע 0), כעבור שבוע וכעבור שבועיים (שבוע 1 ושבוע 2). לאחר 3 ההזרקות הראשונות הללו, אין הזרקה בשבוע שלאחר מכן (שבוע 3).
- החל משבוע 4 ולאחר מכן אחת לחודש, המינון המומלץ הוא 20 מ״ג קיסימפטה.

מועד	מינון
שבוע 0 (היום הראשון לטיפול)	20 מ״ג
שבוע 1	20 מ״ג
שבוע 2	20 מ״ג
שבוע 3	ללא הזרקה
שבוע 4	20 מ״ג
לאחר מכן אחת לחודש	20 מ״ג

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול
המשך להשתמש בקיסימפטה אחת לחודש במשך פרק הזמן שנרשם לך על ידי הרופא.

הרופא יבדוק את מצבך באופן סדיר על מנת לקבוע האם הטיפול משיג את ההשפעה הרצויה.

אם יש לך שאלות לגבי משך השימוש בקיסימפטה, פנה לרופא.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
אם הזרקת יותר מדי קיסימפטה, צור קשר עם הרופא באופן מיידי.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת להשתמש בקיסימפטה
על מנת להפיק את התועלת המלאה מקיסימפטה, חשוב שתקבל כל זריקה בזמן.
אם שכחת זריקה של קיסימפטה, עליך להזריק לעצמך בהקדם האפשרי. אין להמתין עד למנה המתוכננת הבאה.
יש לחשב את מועדי ההזרקות העתידיות מהיום שבו הזרקת מנה זו ולא על סמך לוח הזמנים המקורי (ראה גם ״באיזו כמות של קיסימפטה יש להשתמש ובאיזו תדירות יש להשתמש בה״ לעיל).

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק להשתמש בקיסימפטה
אין להפסיק את השימוש בקיסימפטה, או לשנות את המינון מבלי לשוחח עם הרופא.

תופעות לוואי מסוימות יכולות להיות קשורות לרמה נמוכה של תאי B בדמך. לאחר הפסקת הטיפול בקיסימפטה, רמת תאי B בדמך תעלה בהדרגה לרמה תקינה. תהליך זה יכול להימשך מספר חודשים. במהלך פרק זמן זה, חלק מתופעות הלוואי המתוארות בעלון זה עדיין עלולות להתרחש.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה <u>בכל פעם</u> שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. <u>תופעות לוואי</u>

כמו בכל תרופה, השימוש בקיסימפטה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות הלוואי של קיסימפטה מפורטות להלן. אם אחת מתופעות לוואי אלו מחמירה, דווח לרופא.

שכיחות מאוד (very common) – עשויות להשפיע על יותר ממשתמש 1 מתוך 10
- זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, עם תסמינים כגון כאב גרון ונזלת
- תגובות הקשורות להזרקה, כגון חום, כאבי ראש, כאבי שרירים, צמרמורת ועייפות – תופעות אלו בדרך כלל מתרחשות במהלך 24 שעות לאחר הזרקת קיסימפטה, במיוחד לאחר ההזרקה הראשונה
- זיהומים בדרכי השתן
- תגובות במקום ההזרקה, כגון אודם, כאב, גרד ונפיחות במקום ההזרקה

שכיחות (common) – עשויות להשפיע על 1-10 משתמשים מתוך 100
- ירידה ברמת חלבון המכונה אימונוגלובולין M בדם, אשר מסייע בהגנה מפני זיהומים
- הרפס באזור הפה
- בחילה, הקאה (דווחו בהקשר לתגובות הקשורות להזרקה)
- עלייה באנזימי כבד (נראית בבדיקות דם)

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה)
- תגובות אלרגיות עם תסמינים כגון פריחה, סרפדת, קשיי נשימה, התנפחות של הפנים, העפעפיים, השפתיים, הפה, הלשון או הגרון, לחץ בחזה, או הרגשת עילפון

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור https://sideeffects.health.gov.il.
בנוסף, ניתן לדווח לחברת נוברטיס באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני הבאה:
safetydesk.israel@novartis.com.

5. <u>איך לאחסן את התרופה?</u>

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי איחסון
יש לשמור את העט בקופסת הקרטון החיצונית על מנת להגן מפני אור. יש לאחסן במקרר (2°C–8°C). אין להקפיא.
במידת הצורך, ניתן להשאיר את קיסימפטה מחוץ למקרר עד 7 ימים באופן חד-פעמי בטמפרטורת החדר (שאינה עולה על 30°C).
ככל שלא נעשה שימוש במשך תקופה זו, ניתן להחזיר את קיסימפטה למקרר למקסימום 7 ימים.

אין להשתמש בתרופה זו אם אתה מבחין בכך שהתמיסה מכילה חלקיקים הנראים לעין או אם היא עכורה.

אל תשליך תרופות לביוב או לאשפה הביתית. שאל את הרוקח שלך איך לזרוק תרופות שכבר לא בשימוש. צעדים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. <u>מידע נוסף</u>

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

arginine, sodium acetate trihydrate, sodium chloride, polysorbate 80, disodium edetate, hydrochloric acid (for pH adjustment) and water for injections.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

- קיסימפטה זו תמיסה צלולה עד מעט בוהקת, חסרת צבע עד צהוב-חום חיוור.
- כל אריזה מכילה עט אחד מוכן לשימוש, לשימוש חד-פעמי.

בעל הרישום והיבואן וכתובתו: נוברטיס ישראל בע"מ, ת"ד 9240, תל-אביב-יפו, 6109102.

נערך ביולי 2026.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 167-85-36656

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

הוראות לשימוש בעט קיסימפטה מסוג Sensoready

חשוב כי תבין את הוראות השימוש טרם הזרקת קיסימפטה וחשוב שתפעל על פיהן. שוחח עם הרופא, הרוקח או האחות אם יש לך שאלות כלשהן בטרם תשתמש בקיסימפטה בפעם הראשונה.

זכור:

- **אין להשתמש** בעט אם האטם על קופסת הקרטון החיצונית או האטם על העט שבור. שמור את העט בקופסת הקרטון החיצונית האטומה עד אשר תהיה מוכן להשתמש בו.
- **אין לנער** את העט.
- אם הפלת את העט, **אין להשתמש בו** אם הוא נראה פגום או אם הפלת אותו לאחר שהמכסה הוסר ממנו.
- יש לפנות את העט המשומש מייד לאחר השימוש. **אין לעשות שימוש חוזר בעט**. ראה "כיצד עלי לפנות עט קיסימפטה משומש מסוג Sensoready?" בסוף הוראות שימוש אלו.


כיצד עלי לאחסן את קיסימפטה?

- יש לאחסן את קופסת הקרטון של העט במקרר, בין 2°C ל-8°C.
- יש לשמור את העט בקופסת הקרטון המקורית עד אשר יהיה מוכן לשימוש על מנת להגן מפני אור.
- **אין להקפיא** את העט.

יש לשמור את קיסימפטה מחוץ לטווח ראייתם והישג ידם של ילדים.

חלקי עט קיסימפטה מסוג Sensoready (ראה איור א'):

איור א'




עט קיסימפטה מסוג Sensoready מוצג לאחר הסרת המכסה. **אין להסיר** את המכסה עד אשר תהיה מוכן להזריק.

למה אתה זקוק לצורך ההזרקה:
כלול בקופסת הקרטון:

- עט קיסימפטה חדש מסוג Sensoready (**ראה איור ב'**).


איור ב'



לא כלול בקופסת הקרטון (**ראה איור ג'**):

- 1 מגבון אלכוהול
- 1 כדור צמר גפן או גזה
- מיכל פסולת חדה

איור ג'



ראה "כיצד עלי לפנות עט קיסימפטה משומש מסוג Sensoready?" בסוף הוראות שימוש אלו.

לפני ההזרקה:
הוצא את העט מהמקרר **15 עד 30 דקות לפני ההזרקה** על מנת לאפשר לו להגיע לטמפרטורת החדר.

שלב 1. בדיקות בטיחות חשובות לפני ההזרקה (ראה איור ד'):

- הבט דרך חלון הצפייה. הנוזל צריך להיות צלול עד מעט בוהק.
  אין להשתמש בו אם הנוזל מכיל חלקיקים הנראים לעין או אם הוא עכור.
  ייתכן שתראה בועת אוויר קטנה, זוהי תופעה נורמלית.
- הבט **בתאריך התפוגה (EXP)** על העט שברשותך. **אין להשתמש** בעט אם תאריך התפוגה חלף.

פנה לרוקח או לאיש צוות רפואי אם העט שברשותך נכשל באחת הבדיקות הנ"ל.


איור ד'



שלב 2. בחר את מקום ההזרקה:


- המקום המומלץ הוא האזור הקדמי של הירכיים. אתה יכול להשתמש גם באזור הבטן התחתונה, אך **לא** באזור של 5 ס"מ סביב הטבור (**ראה איור ה'**).
- בחר מקום שונה בכל פעם שבה אתה מזריק קיסימפטה.
- **אין להזריק** לתוך אזורים בהם העור רגיש, חבול, אדום, מכוסה בקשקשים או קשה. יש להימנע מאזורים עם צלקות או סימני מתיחה או מקומות עם זיהום.

איור ה'



- אם **מטפל** או **איש צוות רפואי** נותן לך את הזריקה, הם יכולים להזריק גם לתוך האזור החיצוני של הזרוע העליונה (**ראה איור ו'**).


איור ו'
(מטפל ואיש צוות רפואי בלבד)



שלב 3. נקה את מקום ההזרקה:

- רחץ את ידיך במים וסבון.
- נקה את מקום ההזרקה באמצעות מגבון האלכוהול בתנועה סיבובית. הנח לו להתייבש לפני ההזרקה (**ראה איור ז'**).
- אין לגעת שוב באזור שנוקה לפני ההזרקה.

איור ז'




ההזרקה

שלב 4. הסר את המכסה:

- יש להסיר את המכסה רק כאשר תהיה מוכן להשתמש בעט.
- הסר את המכסה באמצעות סיבוב בכיוון החץ (**ראה איור ח'**).
- השלך את המכסה. **אין לנסות להחזיר את המכסה למקומו**.
- השתמש בעט בטווח של 5 דקות מהסרת המכסה.

איור ח'




ייתכן כי תראה מספר טיפות תרופה היוצאות מן המחט. זוהי תופעה נורמלית.

שלב 5. אחוז בעט:

- אחוז בעט ב-90 מעלות כלפי מקום ההזרקה שנוקה (**ראה איור ט'**).



איור ט'



חשוב: במהלך ההזרקה תשמע **2 נקישות רמות:**


- **הנקישה הראשונה** מציינת כי **ההזרקה החלה.**
- **הנקישה השנייה** תציין כי **ההזרקה כמעט הסתיימה.**

עליך להמשיך לאחוז בעט בחוזקה כנגד העור עד אשר **הסמן הירוק** ימלא את החלון ויפסיק לנוע.

שלב 6. תחילת ההזרקה:

- לחץ את העט בחוזקה כנגד העור על מנת להתחיל בהזרקה (**ראה איור י'**).
- **הנקישה הראשונה** מציינת כי ההזרקה החלה.
- **המשך לאחוז** בעט בחוזקה כנגד העור.
- **הסמן הירוק** מראה את התקדמות ההזרקה.


איור י'



שלב 7. סיום ההזרקה:

- הקשב **לנקישה השנייה**. הדבר מציין כי ההזרקה **כמעט** הסתיימה.
- בדוק האם **הסמן הירוק** מילא את החלון והפסיק לנוע (**ראה איור יא'**).
- כעת ניתן להוציא את העט (**ראה איור יב'**).

איור יא'



איור יב'



לאחר ההזרקה:

- אם הסמן הירוק אינו ממלא את החלון, משמעות הדבר היא שלא קיבלת את המנה המלאה. פנה לרופא או לרוקח, אם הסמן הירוק אינו נראה לעין.
- תיתכן כמות דם קטנה במקום ההזרקה. אתה יכול ללחוץ כדור צמר גפן או גזה, על פני מקום ההזרקה ולהחזיק במשך 10 שניות. אין לשפשף את מקום ההזרקה. אתה יכול לכסות את מקום ההזרקה בפלסטר קטן, אם הדימום נמשך.

כיצד עלי לפנות עט קיסימפטה משומש מסוג Sensoready?

שלב 8. פינוי עט קיסימפטה מסוג Sensoready:

- יש לפנות את העט המשומש למיכל פסולת חדה (דהיינו, מיכל עמיד בפני ניקוב הניתן לסגירה או מיכל דומה) (**ראה איור יג'**).
- לעולם אל תנסה לעשות שימוש חוזר בעט.

איור יג'



יש לשמור את מיכל הפסולת החדה מחוץ לטווח ראייתם והישג ידם של ילדים.