עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

טורז 10/10 טורז 10/20
טבליות מצופות טבליות מצופות
טורז 10/40 טורז 10/80
טבליות מצופות טבליות מצופות

הרכב:

כל טבליה של טורז 10/10 מכילה:
אזטמיכס 10 מ"ג
אטורבאסטאין (כקלציום טריהידרטי) 10 מ"ג
Ezetimibe 10 mg
and Atorvastatin (as calcium trihydrate) 10 mg

כל טבליה של טורז 10/20 מכילה:
אזטמיכס 10 מ"ג
אטורבאסטאין (כקלציום טריהידרטי) 20 מ"ג
Ezetimibe 10 mg
and Atorvastatin (as calcium trihydrate) 20 mg

כל טבליה של טורז 10/40 מכילה:
אזטמיכס 10 מ"ג
אטורבאסטאין (כקלציום טריהידרטי) 40 מ"ג
Ezetimibe 10 mg
and Atorvastatin (as calcium trihydrate) 40 mg

כל טבליה של טורז 10/80 מכילה:
אזטמיכס 10 מ"ג
אטורבאסטאין (כקלציום טריהידרטי) 80 מ"ג
Ezetimibe 10 mg
and Atorvastatin (as calcium trihydrate) 80 mg

לרשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר ראה בסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ובסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
- עלון זה מכיל מידע תמציתי על **טורז**. אם יש לך שאלות נוספות, שאל את הרופא שלך או הרוקח.
- תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה כי מצבם הרפואי דומה.
- **טורז** מיועד לטיפול במבוגרים מעל גיל 18.

1. למה מיועדת התרופה?

טורז משמש, בשילוב עם דיאטה:
- לטיפול בהיפרכולסטרולמיה ראשונית (הטרוזיגוטית משפחתית ולא-משפחתית) או מהתרית רמת גבוהות של שומנים בדם (היפרליפידמיה משולבת) בחולים מבוגרים אשר:
  - אינם מאזנים על ידי כמות לבד; או
  - כבר מטופלים בסטטין ואזטימיב
- לטיפול בחולים מבוגרים עם מחלה תורשתית (היפרכולסטרולמיה משפחתית המתוירגנוטית). ייתכן שהטיפול יינתן בשילוב עם טיפולים אחרים.

- אם יש לך מחלת לב, להפחתת הסיכון לאירועים קרדיווסקולריים (כגון התקף לב, שבץ, ניתוח להגברת זרימת הדם בלב, או אשפוז עקב כאב בחזה).

קבוצה תרפויטית: אזטימיב שייך לקבוצת תרופות הנקראות CAI (מעכבי ספיגת כולסטרול), אשר מעכבות את ספיגת הכולסטרול במעיים. אטורבאסטאטין שייך לקבוצת תרופות הנקראת סטטינים, שהם מעכבי האנזים HMG-CoA רדוקטאז.

טורז פועל להורדת הכולסטרול שלך בשתי דרכים. הוא מפחית ספיגת כולסטרול במערכת העיכול שלך, ובנוסף מפחית את כמות הכולסטרול שהגוף שלך מייצר בעצמו. כולסטרול הוא אחד מתוך מספר חומרים שמזיקים הנמצאים בזרם הדם. כך הכולסטרול שלך עשוי ברובו מכולסטרול LDL או HDL-ל.

כולסטרול LDL נקרא לעיתים קרובות כולסטרול "רע". מכיוון שהוא יכול להצטבר בדפנות העורקים שלך וליצור רובד (פלאק) בסופו של דבר. הצטברות של רובד זה עשויה להוביל להיצרות של העורקים. היצרות זו עשויה להאט או לחסום זרימת דם לאיברים חיוניים כגון הלב והמוח. חסימה זו של זרימת דם עשויה לגרום להתקף לב או שבץ. כולסטרול HDL נקרא לעיתים קרובות כולסטרול "טוב". מכיוון שהוא מסייע במניעת הצטברות של הכולסטרול הרע בעורקים וזמן מספי מחלת לב.

שינויבגיל שהוא מסייע במניעת הצטברות של הכולסטרול בעורקים ע"י הוסיכון שלך מחלת לב.

טורז אינו עוזר לך לרדת במשקל.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בטורז אם:
- הינך רגיש (אלרגי) לאזטימיב, אטורבאסטאטין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
- יש לך או היתה לך או פעם מחלה המשפיעה על הכבד.
- היו לך בדיקות דם חריגות בתוצאות בדיקות מוסכנות של תפקוד הכבד.
- הינך אישה המסוגלת להרות ואינך משתמשת באמצעי מניעה אמין.
- הינך בהריון, מנסה להיכנס להריון או הינך מניקה.
- הינך משתמש בשילוב של גלקאפרביר/פיברנטאסבויר בטיפול בהפטיט C.

אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש בטורז
לפני הטיפול בטורז, ספר לרופא שלך אם:
- היה לך בעבר קדם עם דימום מוחי, אי שיש לך כיסים קטנים של נוזל במוח מאירועים מוחיים קודמים.
- יש לך בעיות בכליות.
- יש לך תת-פעילות של בלוטת התריהאד (היפותירואידיזם).
- היו לך מיאופתיה של כאבים חוזרים בלתי מוסברים בשרירים, היסטוריה אישית או משפחתית של בעיות שרירים.
- היו לך בעיות קודמות בשרירים במהלך טיפול בתרופות אחרות בכולסטרול (לדוגמה, תרופות אחרות בקבוצת "סטטינים" אחרים או תרופות מסוג "פיברטים").
- אתה שותה באופן קבוע כמות גדולה של אלכוהול.
- יש לך היסטוריה של מחלת כבד.
- הינך מעל גיל 70 שנים.
- נאמר לך על ידי הרופא שלך שיש לו אי-סבילות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא שלך לפני נטילת תכשיר זה.
- אתה נוטל או נטלת במהלך 7 הימים האחרונים תרופה הנקראת פוסידיק (fusidic acid) (תרופה לטיפול בזיהום חיידקי) דרך הפה או בזריקה. השילוב של חומצה פוסידית (**טורז** עלול להגביל לבעיות שרירים חמורות (דיזמיוליזיס).
- יש לך או היתה לך מיאסטניה (מחלה של חולשת שרירים בלתי, הכולל במקרים מסוימים שרירים המשמשים בעת נשימה), או מיאסטניה עינית (מחלה הגורמת לחולשת שריר העין) שכן סטטינים עלולים לעיתים להחמיר את המצב או להוביל להתרחשות של מיאסטניה (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

פנה לרופא שלך מייד אם הינך חווה כאב או מוסבר בשרירי, רגישות או חולשת בזמן נטילת טורז. יתכן שמיופתיה בשרירים, בעיות בשריר עשויות להיות חמורות, כולל פירוק שריר הגורם לנזק לכליה. ידיעי כי אטורבאסטאטין גורם לבעיות שרירים דווחו גם מקרים של בעיות שרירים עם אזטימיב.

כמו כן, ספר לרופא שלך או לרוקח אם יש לך חולשת שרירים שהיא קבועה. ייתכן שידרשו בדיקות תרופות נוספות על מנת לאבחן ולטפל בכך.

ספר לרופא עם הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת **טורז**:
- אם יש לך כשל כשימתי חמור.
- אם אחד מאלה תקף לגביך (או שאינך בטוח), דבר עם הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת **טורז**. מכיוון שהרופא שלך יעקוב בדיקת דם לפני הטיפול **בטורז** וייתכן שנם במהלכו, על מנת לזהות את הסיכון לתופעות לוואי הקשורות לשרירים. יידוע כי הסיכון לתופעות לוואי הקשורות לשרירים, לדוגמה, פירוק שרירים (רבדומיוליזיס) עולה כאשר תרופות מסוימות ניטלות באותו זמן (ראה בסעיף 2 "אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות").
- כאשר אתה נוטל תרופה זו, הרופא שלך יפגיש אחר מעבך בקפידה כאשר לך על סוכרת או שאתה בסיכון לפתח סוכרת. אתה עלול להיות בסיכון לפתח סוכרת אם יש לך רמות גבוהות של סוכרים ושומנים בדם שלך, הינך סובל מעודף משקל ויש לך לחץ-דם גבוה.
- ספר לרופא שלך לגבי כל המצבים הרפואיים שלך כולל אלרגיות.
- יש להימנע משימוש משולב **בטורז** ופיברטים (תרופות להורדת כולסטרול) מכיוון שהשילוב של **טורז** ופיברטים לא נחקר.

ילדים ומתבגרים
טורז אינו מיועד לילדים ולמתבגרים.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח שלך.

ישנן תרופות שעשויות לשנות את ההשפעה של **טורז** או שהשפעה שלהן עשויה להיות משנתת על ידי **טורז** (ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה"). אינטראקציה מסוג זה עשויה לגרום לאחת מהתרופות או לשתיהן להיות פחות יעילות. לתלופין, הדבר עלול להגביר את הסיכון או עידת החומרה של תופעות הלוואי, כולל הופעת רבדומיוליזיס" המתוארת בסעיף 4 "תופעות לוואי":
- פיקלופסורין (תרופה המשמשת לעיתים קרובות בחולים שעברו השתלה).
- אריתרומיצין, קלריתרומיצין, טליתרומיצין, חומצה פוסידית**,** ריפאמפיצין (תרופות לזיהומים חיידקיים). פוסידית**,** אינטראקונאזול, וריקונאזול, פלוקונאזול, פוסאקונאזול (תרופות לזיהומים פטריתיים).
- גמפיברוזיל, פיברטים אחרים, חומצה ניקוטינית, קולסטיפול, כולסטיראמין (תרופות לווריסות רחמן שתון).
- מספר הזסמי תעלות סידן המשמשים לטיפול בתעוקת לב (אנגינה) או בלחץ-דם גבוה, לדוגמה, אמלודיפין, דילטיאזם).
- דיגוקסין, ראפאמיצין, אמיודארון (תרופות לווריסות קצב הלב שלך).
- תרופות לטיפול ב-HIV, לדוגמה, ריטונאביר, לופינאביר, אטאזאנאביר, דארונאביר, דארונאביר, השילוב של טיפרנאביר/ריטונאביר, וכו' (תרופות לטיפול באיידס).
- תרופות מסוימות לטיפול בדלקת כבד מסוג C, לדוגמה, טלפרביר, בוספפריר והשילוב של אלבסבירי/גרזופרביר.
- דפסונריון (תרופה המשמשת לטיפול בזיהומים מסובכים של העור והבבה העור ובבקטריה).

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.
- לפני תחילת הטיפול **בטורז**, עליך להיות בדיאטה להורדת הכולסטרול שלך.
- עליך להתמיד בדיאטה זו להורדת כולסטרול בזמן נטילת **טורז**.

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות (common) – תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 100:
- שלשול
- כאבי שרירים

תופעות לוואי לא שכיחות (uncommon) – תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000:
- שפעת
- דיכאון, קשיי שינה; הפרעת שינה
- סחרחורת, כאב ראש; תחושת עקצוץ
- קצב לב איטי
- גלי חום
- קוצר נשימה
- כאב בטן; נפיחות בטנית; עצירות; קשיי עיכול; גזים; תנועות מעי תכופות; דלקת של הלקיבה; בחילה; אי-נוחות בקיבה; בטן רגישה
- אקנה; סרפדת
- כאבי מפרקים; כאב גב; התכווציות ברגליים; עייפות, התכווציות, או חולשת שרירים; כאבים בידיים וברגליים
- חולשה לא רגילה; תחושת עייפות או חולי; התנפחות במיוחד בקרסוליים (בצקת)
- עלייה בערכים בבדיקות דם מבדתיות מסוימות תקינות
- תפקוד הכבד או השריר (CK)
- עלייה במשקל

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן נמוכה נקבעה):
- מיאסטניה גרבים (מחלה הגורמת לחולשת שרירים כללית, כולל במקרים מסוימים שרירים המשמשים בעת נשימה)
- מיאסטניה עינית (מחלה הגורמת לחולשת שריר העין) שוחח עם הרופא שלך אם אתה חווה התכווצות בידיים או ברגליים שהמחמירה לאחר תקופות של פעילות, רגישה בסטטינים. עם זאת, רוב (מעל 90%) תסמיני השרירים שדווחו לא היו קשורים לסטטינים עצמם.

אם הופיעה תופעת לוואי כלשהי, אל תפסיק את נטילת תרופה זו ללא התייעצות עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
https://sideeffects.health.gov.il

בנוסף, ניתן לדווח לחברת "אוניפארם בע"מ".

117238010

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
טורז מכיל לקטוז. אם הרופא אמר לך שיש לך אי-סבילות לסוגים מסוימים של סוכר, התייעץ עם הרופא לפני שאתה נוטל תרופה זו.

טורז מכיל פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן לכל טבליה, כלומר נחשב 'נטול נתרן'.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא שלך או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

הרופא שלך יחליט מהו חוזק הטבליה המתאים עבורך, בהסתמך על הטיפול הנוכחי שלך ועל סטטוס הסיכון האישי שלך.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.
- לפני תחילת הטיפול **בטורז**, עליך להיות בדיאטה להורדת הכולסטרול שלך.
- עליך להתמיד בדיאטה זו להורדת כולסטרול בזמן נטילת **טורז**.

אם עליך ליטול תוספת פוסידית דרך הפה עם מנת בטוח בהתחלת מחדש ליטול טורז. נטילת טורז יחד עם תוספת פוסידית עלולה לעיתים נדירות להגביל חלושה, לרגישות או לכאב שרירים (רבדומיוליזיס). ראה מידע נוסף אודות רבדומיוליזיס בסעיף 4 "תופעות לוואי".
- תרופות אחרות הידועות באינטראקציה שלהן עם **טורז** עשויות מניעה לנטילה דרך הפה (תרופות למניעת הריון).
- סטטיריפטונל (תרופה נוגדת פרכוסים לאפילפסיה).
- סימטידין (תרופה המשמשת לטיפול בצרבת ובכיבי קיבה).
- פנאזון (משכך כאבים).
- נוגדי חומצה (תרופות לבעיות עיכול המכילות אלומיניום או מגנזיום).
- ארפרזין, פנפרוקומון, אפנוקומארול או פלואינדיון (תרופות למניעת קרישי דם).
- קולכיצין (משמש לטיפול בשיגדון).
- St John's wort (תרופה לטיפול בדיכאון).

נטילת טורז עם מזון, שתייה ואלכוהול
ראה סעיף 3 להוראות לגבי נטילת **טורז**. אנא שים לב לדברים הבאים:

מיץ אשכוליות
אין לשתות יותר מכוס אחת או שתי כוסות קטנות של מיץ אשכוליות ליום, מכיוון שמיהות מסוימות בדלות עלולות להגביל את יכולת לשנות את ההשפעות של **טורז**.

אלכוהול
המינון שמיעיל יותר מזי אלכוהול בזמן נטילת תרופה זו. לפרטים ראה בסעיף 2 "אזהרות מיוחדות בנוגע לשימוש **בטורז**."

היריון והנקה
אין ליטול **טורז** אם הינך בהריון, מנסה להיכנס להיריון או חושבת שאת עשויה להיות בהריון.
אין ליטול **טורז** אם את מניקה או אם מתוכננת להניק. אם את משתמשת באמצעי מניעים למניעת היריון, אנא נכנסת להיריון בזמן נטילת **טורז**, הפסיקי ליטול אותו מייד וספרי לרופא שלך.
אין ליטול **טורז** אם הינך מניקה.
הביטחות של **טורז** בזמן היריון והנקה טרם הוכחה.
שאלי בעצמך של הרופא שלך או הרוקח לפני נטילת תרופה זו.

נהיגה ושימוש במכונות
טורז אינו צפוי להשפיע על היכולת שלך לנהוג או להפעיל מכונות. למרות זאת, יש לקחת בחשבון שחלק מהאנשים עשויים לחוש סחרחורת לאחר נטילת **טורז**.

01B26

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש **בטורז** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

אם אתה חווה או אלו מתופעות הלוואי החמורות או התסמינים הבאים, הפסק ליטול את הטבליות שלך וספר לרופא שלך מייד או גש לחדר המיון בבית החולים הקרוב אליך ביותר.
- תגובה אלרגית חמורה שאר גורמת להתנפחות של הפנים, הלשון והגרון, ואשר עשויה לגרום לקושי גדול בנשימה.
- פריחה בעור וגרד; תגובות אלרגיות הכוללות פריחה וסרפדת
- פגיעה בגיד
- אבנים בכיס המרה (אשר עשוי לגרום לכאב בטן, בחילה, הקאות)
- דלקת בלבלב, לעיתים קרובות עם כאב בטן חמור
- ירידה בספירת תאי דם, אשר עשויה לגרום לחבלה/לדימום (תרומבוציטופניה)
- דלקת של תעלות האף; דימום מהאף
- עליות וירידות ברמות הסוכר בדם (אם יש לך סוכרת, פקחים השפעות על תאי הדם).
- עליות וירידות ברמות הסוכר בדם (אם יש לך סוכרת, עליך להמשיך לנטר בזהירות את רמות הסוכר שלך בדם)
- סיוטים
- חוסר תחושה או עקצוץ באיבעות ובבהונות
- ירידה בתחושת כאב או מגע
- שינוי בחוש הטעם; יובש בפה
- אובדן זיכרון
- פלצפות באזניים; ירידה בשמיעה
- הקאות
- גיהוק
- נשירת שיער
- עלייה בחלום הגוף
- בדיקות שתן חיוביות לתאי דם לבנים
- נשטוש ראייה; הפרעות ראייה
- גינקומסטיה (הגדלת החזה בגברים ונשים)

תופעות לוואי אפשריות שדווחו בעת השימוש בתרופות אחרות מקבוצת הסטטינים:
- קשיים בתפקוד מיני
- דיכאון
- בעיות בשינה כולל שינוי מתמשך ו/או קוצר נשימה או חום
- סוכרת. הדבר סביר יותר אם יש לך רמות גבוהות של סוכרים ושומנים בדם, הינך בעודף משקל ויש לך לחץ-דם גבוה. הרופא שלך יפקח עליך בזמן שאתה נוטל תרופה זו
- כאב, רגישות או חולשת שרירים אשר הינה קבועה ובמיוחד אם באותו הזמן הינך חש לא טוב או יש לך חום גבוה, אשר עלולה לא לחלוף לאחר הפסקת **טורז** (השכיחות אינה ידועה)

תופעות לוואי הקשורות לשרירים:
מחקר שסקר תוצאות משולבות של ניסויים קליניים מרובים מצא כי סטטינים יכולים לפעמים לגרום לעלייה קטנה בתסמיני שרירים קלים בשנה הראשונה לטיפול. המחקר גם הדגים עלייה באפיזודה הראשונה של כאב שרירים או תסמיני חולשה, בסבירות גבוהה יותר בטיפול אזטימיב בסטטינים בהשוואה לטיפול מתון/פחות אינטנסיבי בסטטינים, עם זאת, רוב (מעל 90%) תסמיני השרירים שדווחו לא היו קשורים לסטטינים עצמם.

אם הופיעה תופעת לוואי, אל תפסיק את נטילת תרופה זו ללא התייעצות עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי
ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
https://sideeffects.health.gov.il

בנוסף, ניתן לדווח לחברת "אוניפארם בע"מ".

5. כיצד לאחסן טורז?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג יד וכל טווח ראייתם של ילדים ו/או חיות מחמד, על ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש **בטורז** לאחר תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון: יש לאחסן מתחת ל-25°C ובמקום מוגן מאור.

שם הייצרן וכתובתו: אוניפארם בע"מ, פארק תעשייה "מבוא כרמל", ת.ד. 16545, 6116401 ת"א.

שם הרוקח וכתובתו: אוניפארם בע"מ, פארק תעשייה "מבוא כרמל", נערך ביולי 2026.

מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
טורז 10/10: 99 37663 16 ,179 65
טורז 10/20: 99 38154 16 ,179 66
טורז 10/40: 99 38155 16 ,179 67
טורז 10/80: 99 38156 16 ,179 68

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

למידע נוסף על התכשיר ולעלונים מעודכנים בשפות עבריות, ערבית ואנגלית, סריקו את הקוד הבא:
For further information about the medicinal product and for updated patient leaflets in Hebrew, Arabic and English, please scan the following code:

טורז 10/10 TOREZ 10/10

טורז 10/20 TOREZ 10/20

טורז 10/40 TOREZ 10/40

טורז 10/80 TOREZ 10/80

ניתן לפנות לבעל הרישום של התכשיר בבקשה לקבל עלון מדעס לצרכן בשפה האנגלית בכתובת הדואר האלקטרוני: info@unipharm.co.il
או בטלפון מספר: 03-6135050.

To receive a printed patient leaflet in English, you can contact the registration holder by email: info@unipharm.co.il
or by telephone: 03-6135050.

כיצד נראות טבליות מצופות של **טורז** ומה תכולת האריזה:
טורז 10/10: טבליות מצופות, עגולות, קמורות משני צידיהן, בצבע לבן עד אוף-וויט עם קו חצייה בצד אחד.
טורז 10/20;10/40: טבליות מצופות, עגולות, קמורות משני צידיהן, בצבע חום בהיר עם קו חצייה בצד אחד.
טורז 10/80: טבליות מצופות, אובאליות, קמורות משני צידיהן, בצבע לבן עד אוף-וויט עם קו חצייה בצד אחד.

טורז ארוז בתוך מגשיות (בליסטר) אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון.

עבור **טורז 10/10** קיימים גדלי אריזה של 14, 28, 30, 56 ו-60 טבליות.

עבור **טורז 10/20, 10/40, 10/80** קיימים גדלי אריזה של 30, 56 ו-60 טבליות.

ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.

שם בעל הרישום וכתובתו: אוניפארם בע"מ, ת.ד. 16545, 6116401 ת"א.

תנאי אחסון: יש לאחסן מתחת ל-25°C ובמקום מוגן מאור.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאינן בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

מה מכיל טורז?
נוסף על המרכיבים הפעילים **טורז** מכיל גם:

טורז 10/10:
Lactose monohydrate; Calcium carbonate; Microcrystalline cellulose; Crospovidone; Croscarmellose sodium; White coating blend (Hypromellose, Titanium dioxide, Polyethylene glycol); Povidone 30; Magnesium stearate; Hydroxypropyl cellulose; Sodium lauryl sulfate; Polysorbate 80.

טורז 10/20:
Lactose monohydrate; Calcium carbonate; Microcrystalline cellulose; Crospovidone; Croscarmellose sodium; Magnesium stearate; White coating blend (Hypromellose, Titanium dioxide, Polyethylene glycol); Brown coating blend (Hypromellose, Titanium dioxide, talc, Macrogel/PEG 400, Iron oxide yellow, Iron oxide red, Iron oxide black); Hydroxypropyl cellulose; Povidone 30; Sodium lauryl sulfate; Polysorbate 80.

טורז 10/40:
Lactose monohydrate; Calcium carbonate; Microcrystalline cellulose; Crospovidone; Croscarmellose sodium; Magnesium stearate; Hydroxypropyl cellulose; White coating blend (Hypromellose, Titanium dioxide, Polyethylene glycol); Brown coating blend (Hypromellose, Titanium dioxide, talc, Macrogel/PEG 400, Iron oxide yellow, Iron oxide red, Iron oxide black); Povidone 30; Polysorbate 80; Sodium lauryl sulfate.

טורז 10/80:
Lactose monohydrate; Calcium carbonate; Microcrystalline cellulose; Crospovidone; White coating blend (Hypromellose, Titanium dioxide, Polyethylene glycol); Magnesium stearate; Croscarmellose sodium; Hydroxypropyl cellulose; Polysorbate 80; Povidone 30; Sodium lauryl sulfate.