



**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים)**

**התשס"ו – 1986**

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

## פרבליפ 10;20;40 טבליות

**הרכב:**

כל טבלייה של **פרבליפ 10** מכילה:

פראבאסטאטין סודיום 10 מ"ג

Pravastatin Sodium 10 mg

כל טבלייה של **פרבליפ 20** מכילה:

פראבאסטאטין סודיום 20 מ"ג

Pravastatin Sodium 20 mg

כל טבלייה של **פרבליפ 40** מכילה:

פראבאסטאטין סודיום 40 מ"ג

Pravastatin Sodium 40 mg

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגניים ראה בסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים, היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה כי כך מחלתם דומה.

**התרופה אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18.**

- למה מיועדת התרופה?**
- הפחתת רמות הכולסטרול והטריגליצרידים בדם.

- הפחתת הסיכון לאוּטֶם שריר הלב והארכת תוחלת החיים בחולים עם רמת כולסטרול גבוהה וללא עדות למחלת לב כלילית.

- הפחתת הסיכון לתמותה כוללת על ידי הורדת התמותה ממחלות לב, והפחתת הסיכון להתקף לב בחולים עם טרשת עורקים ורמת כולסטרול ממוצעת או גבוהה.

מידע נוסף:

**פרבליפ** משמש להפחתת רמות גבוהות של כולסטרול "רע" (להעלאת רמות של כולסטרול "טוב" בדם כאשר שינויים בתזונה ובפעילות הגופנית כשלו לעשות זאת כראוי. בעוד שכולסטרול הינו חיוני לתפקוד התקין של הגוף, הרי שאם רמתו בדם גבוהה מדי, הוא יכול להצטבר על דפנות העורקים. בסופו של דבר כלי הדם עלולים להיחסם. מצב זה נקרא הקשחת העורקים (טרשת עורקים). מצב זה עלול להוביל לכאב חזה (תעוקת חזה), כאשר כלי דם

בלב חסום חלקית, התקף לב (אוטם שריר הלב), כאשר כלי דם בלב חסום במלואו, שבץ (אירוע מוחי), כאשר כלי דם במוח חסום במלואו. רוב הכולסטרול נוצר על ידי הכבד וכמות קטנה בלבד של כולסטרול מגיעה מהתזונה. הגוף מייצר את רוב הכולסטרול בלילה.

למרות שאתה עשוי להיות בדיאטה דלת שומנים, בדיקות הדם יוכיחו להראות עדיין שרמת השומנים (כולל כולסטרול) בדם גבוהה. רמה גבוהה של כולסטרול מזוהה בדרך כלל כתורמת לסיכון של מחלת לב.

גורמים נוספים כמו מחלת לב קיימת, לחץ דם גבוה, סוכרת, עודף משקל, חוסר בפעילות גופנית ועישון יכולים גם הם להעלות משמעותית את הסיכון להתפתחות או התקדמות מחלת לב.

**קבוצה תרופוטית:**

סטאטינים (או מעכבי האנזים HMG-CoA רדוקטאז). קבוצה זו מפחיתה את כמות הכולסטרול והטריגליצרידים (שומנים) בדם.

### 2. לפני השימוש בתרופה

**אין להשתמש בתכשיר אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל פראבאסטאטין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכיל המילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
- הינך סובל ממחלת כבד פעילה.
- את בהריון או קיימת אפשרות שתיכנסי להריון או אם את מניקה (ראי בסעיף 2 "הריון, הנקה ופוריות").

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול בפרבליפ, ספר לרופא אם:**

- יש לך או הייתה לך מיאסטניה (מחלה המאפיינת בחולשת שרירים כללית, כולל במקרים מסוימים שרירים המשמשים לנשימה) או מיאסטניה אוקולרית (מחלה הגורמת לחולשת שריר העין), מכיוון שסטאטינים יכולים לעיתים להחמיר את המצב או להוביל להופעת מיאסטניה (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").
- יש לך בעיות בכליות.
- גילך מעל 70 שנים.
- סבלת בעבר מבעיות בכבד.
- אתה סובל מתת-פעילות בלוטת התריס (היפותירואידיזם).
- אתה סובל מהפרעה תורשתית בשרירים או שיש לך היסטוריה משפחתית של בעיות דמויות.
- סבלת בעבר מתופעות לוואי המשפיעות על השרירים כאשר נטלת תרופה אחרת להורדת כולסטרול כגון סטאטין (תרופה המעכבת את האנזים HMG-CoA רדוקטאז) או פיבראט (כגון גמפיברוזיל).
- אתה מרגיש במהלך הטיפול התכווציות או כאבי שרירים בלתי מוסברים – דווח מייד לרופא.

את השימוש ב**פרבליפ**. הרופא יודיע לך מתי בטוח לחדש את הטיפול ב**פרבליפ**. השימוש ב**פרבליפ** יחד עם חומצה פוסידית עלול לעיתים נדירות להוביל לחולשת שרירים, רגישות או כאבי שרירים (רבדומילויזיס). ראה מידע נוסף בנוגע לרבדומילויזיס בסעיף 4 "תופעות לוואי".

- אם אתה נוטל תרופה לטיפול ומניעת היווצרות קרישי דם הנקראת "אנטגוניסט לויטמין K", ספר לרופא לפני נטילת **פרבליפ** כיוון ששימוש בו-זמני באנטגוניסט לויטמין K ו**פרבליפ** עלול להעלות את הערכים של בדיקות הדם המשמשות לניטור הטיפול עם אנטגוניסט לויטמין K.

**נטילת פרבליפ עם כל אחת מהתרופות הבאות יכולה להגדיל את הסיכון לבעיות בשרירים:**

- קולכיצין (משמשת לטיפול בגאוט [שיגדון]).
- חומצה ניקוטינית (משמשת להורדת רמת כולסטרול גבוהה בדם).

- ריפאמפיצין (משמשת לטיפול במחלת השחפת).
- גלנלדומיד (משמשת לטיפול בסרטן הנקרא מיאלומה נפוצה).

**שימוש בתרופה ובמזון**

ניתן ליטול **פרבליפ** עם או ללא מזון.

**שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול**

הגבל את צריכת האלכוהול למינימום. אם ברצונך לשתות בזמן השימוש בתרופה שתה כמויות קטנות של אלכוהול בלבד. גם אם שתית באופן חד פעמי משקה אלכוהולי אל תפסיק את השימוש בתרופה. אם אתה מודאג בנוגע לכמות האלכוהול שאתה יכול לשתות במהלך נטילת התרופה, עליך להתייעץ על כך עם הרופא.

**הריון, הנקה ופוריות**

**אין להשתמש בפרבליפ:**

- אם את בהריון, מתכננת הריון או מניקה (כיוון שתרופה זו עוברת לחלב אם).
- אם את עשויה להיכנס להריון, אלא אם כן, את משתמשת באמצעים אמינים למניעת הריון **שאינם** הורמונליים (אמצעי מניעה הורמונליים הם למשל גלולות או תכשיר הורמונלי אחר למניעת הריון). חשוב שתתייעצי על כך עם הרופא.

- אם נכנסת להריון בתקופת הטיפול ב**פרבליפ**, הפסקי לייטול תרופה זו מייד כשנודע לך על כך.

**נהיגה ושימוש במכוונת**

**פרבליפ** עלול לגרום לסחרחורת, טשטוש ראייה או ראייה כפולה במהלך הטיפול.

אם אתה חווה תופעות אלו אל תנהג ואל תפעיל מכוונת. דא שאתה כשיר לנהוג ולהפעיל מכוונת לפני שאתה ניגש לעשות זאת.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה טבליות פרבליפ מכילות לקטוז.** אם נאמר לך על ידי הרופא כי יש לך אי סבילות לסוכרים

מסוימים, פנה לרופא לפני נטילת תרופה זו. תרופה זו מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבלייה ולפיכך נחשבט נטולת נתרן.

### 3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

- אם אתה נוטל תרופה לטיפול ומניעת היווצרות קרישי דם הנקראת "אנטגוניסט לויטמין K", ספר לרופא לפני נטילת **פרבליפ** כיוון ששימוש בו-זמני באנטגוניסט לויטמין K ו**פרבליפ** עלול להעלות את הערכים של בדיקות הדם המשמשות לניטור הטיפול עם אנטגוניסט לויטמין K.

**נטילת פרבליפ עם כל אחת מהתרופות הבאות יכולה להגדיל את הסיכון לבעיות בשרירים:**

- קולכיצין (משמשת לטיפול בגאוט [שיגדון]).
- חומצה ניקוטינית (משמשת להורדת רמת כולסטרול גבוהה בדם).

- ריפאמפיצין (משמשת לטיפול במחלת השחפת).
- גלנלדומיד (משמשת לטיפול בסרטן הנקרא מיאלומה נפוצה).

**שימוש בתרופה ובמזון**

ניתן ליטול **פרבליפ** עם או ללא מזון.

**שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול**

הגבל את צריכת האלכוהול למינימום. אם ברצונך לשתות בזמן השימוש בתרופה שתה כמויות קטנות של אלכוהול בלבד. גם אם שתית באופן חד פעמי משקה אלכוהולי אל תפסיק את השימוש בתרופה. אם אתה מודאג בנוגע לכמות האלכוהול שאתה יכול לשתות במהלך נטילת התרופה, עליך להתייעץ על כך עם הרופא.

**הריון, הנקה ופוריות**

**אם אתה לוקה, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות להורדת הכולסטרול מקבוצת הפיבראטים כגון פנופיבראט או גמפיברוזיל, תרופה המפחיתה את ההגנה החיסונית של הגוף (ציקלוספורין המדכא את המערכת החיסונית הניתן לאחר השתלת איבר) או תרופה אחרת להורדת רמת הכולסטרול (חומצה ניקוטינית [ויטמין B3] – תרופות אלו יכולות להפריע לדרך בה **פרבליפ** פועל בגוף).
- אם נכנסת להריון בתקופת הטיפול ב**פרבליפ**, הפסקי לייטול תרופה זו מייד כשנודע לך על כך.

**נהיגה ושימוש במכוונת**

**פרבליפ** עלול לגרום לסחרחורת, טשטוש ראייה או ראייה כפולה במהלך הטיפול.

אם אתה חווה תופעות אלו אל תנהג ואל תפעיל מכוונת. דא שאתה כשיר לנהוג ולהפעיל מכוונת לפני שאתה ניגש לעשות זאת.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה טבליות פרבליפ מכילות לקטוז.** אם נאמר לך על ידי הרופא כי יש לך אי סבילות לסוכרים

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב**פרבליפ** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את נטילת התרופה ולפנות מייד לרופא אם:**

- אתה סובל באופן פתאומי מתגובות אלרגיות חמורות כולל התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון או קנה הנשימה שיכולות לגרום לקשי רב בנשימה. תגובה זו נדירה מאוד, וכאשר מופיעה היא יכולה להיות חמורה. ספר מייד לרופא אם זה קורה.
- אתה סובל מבעיית נשימה כולל שיעול עיקש ו/או קוצר נשימה או חום.

**יש לדווח מייד לרופא אם:**

אתה מפתח כאבי שרירים, רגישות, חולשה או התכווצויות שרירים בלתי מוסברות או מתמשכות, במיוחד אם באותו הזמן אתה מרגיש לא טוב או יש לך חום גבוה.

- במקרים מאוד נדירים, בעיות בשרירים יכולות להיות חמורות (רבדומילויזיס), ועלולות להוביל למחלת כליות חמורה, מסכנת חיים.

- השפעה על העור והשיער: פריחה.

**תופעות לוואי נוספות**

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) – תופעות שנופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000:**

- אם אתה נוטל תרופות מסוג קושרי חומצות מרה (כגון כולסטיראמין או קולסטיפול), יש ליטול **פרבליפ** לפחות שעה לפני נטילת תרופות אלו או לפחות ארבע שעות לאחר נטילת תרופות אלו, כיוון שספיגת **פרבליפ** עלולה להיות משפעת מתרופות מסוג קושרי חומצות מרה אם נוטלים אותן בסמיכות אחת לשנייה.
- בעיות כבד או כליה**
- אם סבלת בעבר מבעיות בכבד או אם אתה סובל מבעיות בכליה הרופא עשוי לרשום מינון נמוך יותר.
- אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, יש** ליטול מנה מייד כשנוכרת, אלא אם כן הזמן בו עליך ליטול את המנה הבאה הוא קרוב. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק טיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

- אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** או אם בטעות בלע יד מל התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך.

- אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, יש** ליטול מנה מייד כשנוכרת, אלא אם כן הזמן בו עליך ליטול את המנה הבאה הוא קרוב. אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק טיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

**נהיגה ושימוש במכוונת**

**פרבליפ** עלול לגרום לסחרחורת, טשטוש ראייה או ראייה כפולה במהלך הטיפול.

אם אתה חווה תופעות אלו אל תנהג ואל תפעיל מכוונת. דא שאתה כשיר לנהוג ולהפעיל מכוונת לפני שאתה ניגש לעשות זאת.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה טבליות פרבליפ מכילות לקטוז.** אם נאמר לך על ידי הרופא כי יש לך אי סבילות לסוכרים

**תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) – תופעות שנופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000:**

- חולשה, בעיות בתחושת המגע הכוללות תחושת בעירה או עקצוץ או חוסר תחושה, שיכולות להעיד על פגיעה עצבית (במיוחד אם אתה משתמש ב**פרבליפ** תקופה ארוכה)
- מחלת עור חמורה (lupus erythematous-like syndrome)

- דלקת של הכבד או הלבבל, צהבת (מזוהה על ידי הצהבה של העור ולובן העיניים)
- מוות מהיר מאוד של תאי כבד (נמק כבדי סוער)
- דלקת בגידים העלולה להסתבר ולהוביל לקרע של גידים

- עלייה בטרנסאמינאזות (קבוצה של אנזימים או התכווצויות שרירים בלתי מוסברות או הנמצאת באופן טבעי בדם), שיכולה להוות סימן לבעיות כבד. ייתכן שהרופא יבצע בדיקות תקופתיות לניטור המצב.

**תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותות טרם נקבעה):**

- חולשת שרירים קבועה
- סוכרת: השכיחות תהיה תלויה בהימצאות או העדר גורמי סיכון (רמת גלוקוז בדם בצום של 5.6 מילימול/ליטר, BMI < 30 ק"ג/מטר<sup>2</sup>, רמות גבוהות של טריגליצרידים, היסטוריה של לחץ דם גבוה)
- דרטומיזיטיס (מצב המאופיין על ידי דלקת של השרירים והעור)
- כשל כבדי

- מיאסטניה גרביס (מחלה הגורמת לחולשת שרירים כללית, כולל בחלק מהמקרים בשרירים המשמשים לנשימה)
- מיאסטניה אוקולרית (מחלה הגורמת לחולשת שריר העין)
- קרע בשריר
- כאב ראש או הפרעות בשינה
- טשטוש ראייה או ראייה כפולה
- קשי עיכול
- בחילה
- הקאות
- כאב או חוסר נוחות בבטן
- תחושת כאב בחזה כתוצאה מחומציות הקיבה

עליך להתייעץ עם הרופא אם אתה חווה חולשה בזרועות או ברגליים המחריפה אחרי תקופות של פעילות, ראייה כפולה או צניחת עפעפיים, קושי בבליעה או קוצר נשימה.

**תופעות הלוואי הבאות דווחו במספר סטאטינים (שכיחותן אינה ידועה):**

- סינטי לילה
- אובדן זיכרון
- דיכאון
- בעיית נשימה או חום

- סוכרת: התרחשוות תופעת לוואי זו סבירה יותר אם יש לך רמות גבוהות של סוכרים ושומנים בדם, אתה בעודף משקל ויש לך לחץ דם גבוה. הרופא שלך ינטר אותך בזמן שטיטול תרופה זו.

**תופעות לוואי הקשורות לשרירים**

מחקר מסקר תוצאות משלבות ממספר ניסויים קליניים מצא כי סטאטינים עלולים לגרום לעיתים

לעלייה קלה בתסמינים שריריים קלים במהלך השנה הראשונה לטיפול בסטאטינים. המחקר הראה גם כי הסבירות להופעת תסמין ראשון של כאב או חולשת שרירים גבוהה יותר בטיפול אינטנסיבי בסטאטינים בהשוואה לטיפול מתון או פחות אינטנסיבי. עם זאת, ביותר מ-90% מהמקרים, התסמינים הקשורים לשרירים שדווחו לא נגרמו מהסטאטין עצמו.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מתמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

**דיווח על תופעות לוואי**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "**דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי**" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטוס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

בנוסף, ניתן לדווח לתברת "**אוניפארם בע"מ**".

### 5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או חתינקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי איחסון: יש לאחסן מתחת ל-25°C ובמקום מוגן מאור.
- אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

### 6. מידע נוסף

**נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:** Microcrystalline cellulose; Lactose; Magnesium oxide; Croscarmellose sodium; Magnesium stearate.

כל טבלייה של **פרבליפ 10** מכילה 29 מ"ג לקטוז. כל טבלייה של **פרבליפ 20** מכילה 58 מ"ג לקטוז.

כל טבלייה של **פרבליפ 40** מכילה 116 מ"ג לקטוז.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**

**פרבליפ 10, 20:**

טבלייה לבנה, עגולה, קמורה משני צידיה, בעלת קו חצייה מצידה האחד.

**פרבליפ 40:**

טבלייה לבנה, מוארכת, קמורה משני צידיה, בעלת קו חצייה מצידה האחד.

הטבליות ארוחות בתוך מגשיות (בליסטרים) אשר מוכנסות לתוך אריית קרטון. בכל אריזה של **פרבליפ** יש 10, 20, 28 או 30 טבלייות.

ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

**שם בעל הרישום וכתובתו:** אוניפארם בע"מ, ת.ד. 16545, ח"א, 6116401.

**שם היצרן וכתובתו:** אוניפארם בע"מ, פארק תעשייה "מבוא כרמל".

מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

**פרבליפ 10:** 132 80 31134 01

**פרבליפ 20:** 132 79 31135 01

**פרבליפ 40:** 132 78 31136 01

נערך בפברואר 2026.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

למידע נוסף על התכשיר ולעלוים מעודכנים בשפות עברית, ערבית ואנגלית, סירקו את הקוד הבא:

For further information about the medicinal product and for updated patient leaflets in English, Hebrew and Arabic, please scan the following code:

**פרבליפ 10 PRAVALIP**



**פרבליפ 20 PRAVALIP**



**פרבליפ 40 PRAVALIP**



ניתן לפנות לבעל הרישום של התכשיר בבקשה לקבל עלון מודפס לצרכן בשפה האנגלית בכתובת הדואר האלקטרוני: [info@unipharm.co.il](mailto:info@unipharm.co.il) או בטלפון מספר: 03-6135050.

To receive a printed patient leaflet in English, you can contact the registration holder by email: