

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ז - 1986
התרופה משוקלת על פי מרשם רופא בלבד

סנדאיימון ניאורל 25 מ"ג כמוסות

כל כמוסה מכילה: ציקלוספורין 25 מ"ג Cyclosporin 25 mg

סנדאיימון ניאורל 50 מ"ג כמוסות

כל כמוסה מכילה: ציקלוספורין 50 מ"ג Cyclosporin 50 mg

סנדאיימון ניאורל 100 מ"ג כמוסות

כל כמוסה מכילה: ציקלוספורין 100 מ"ג Cyclosporin 100 mg

תמיסה לשתייה: כל 1 מ"ל מכיל: ציקלוספורין 100 מ"ג Cyclosporin 100 mg

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 "מידע נוסף". ראה גם סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע מתיצית על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתן. אך תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

- למה מיועדת התרופה?**

- טיפול מגינתי של דחיית שתל בהשתלת כליה, כבד ולב בשילוב עם קורטיקוסטרואידים.
- טיפול במקרים קשים של דלקת מפרקים מח עצם.
- טיפול בדלקת עיניים מסוג אובאיטיס (דלקת הענבייה) שאינה על רקע זיהומי (Endogenous uveitis).
- טיפול בתסמונת נפדתית מסוג MCD (Mininal Change disease) כאשר הטיפול הרגיל נכשל.
- טיפול במקרים קשים של דלקת מפרקים שגרונית כאשר הטיפול הרגיל אינו יעיל או שאינו מתאים.
- טיפול במקרים קשים של פסוריאזיס בחולים מעל גיל 16 שאינם מגיבים לטיפול אחר.
- טיפול מגינתי של קשים של אסתמה של העור (atopic dermatitis) במבוגרים למשך 8 שבועות בלבד, כאשר הטיפול הרגיל אינו יעיל או אינו מתאים.

אם עברת השתלה של איבר או של מח עצם התפקיד של סנדאיימון ניאורל הוא לזכות את מערכת החיסון בגופך. סנדאיימון ניאורל מונעת דחייה של איברים מושתלים על-ידי חסימת ההתפתחות של תאים מיוחדים שבאופן נורמלי יתקפו את הרקמה המושתלת.

אם הינך סובל ממחלה שאינה קשורה בהשתלה, בה תגובה חיסונית של גופך תוקפת את התאים בגופך (מחלה אוטואימונית), סנדאיימון ניאורל מדכאת את התגובות החיסוניות במחלות אלו.

קצוצה תרופיטית: מדכאים של מערכת החיסון.

2. לפני השימוש בתרופה

אם אתה לוקח סנדאיימון ניאורל לאחר השתלה, התרופה תירשם לך רק על-ידי מומחה בעל ניסיון בהשתלות ו/או במחלות אוטואימוניות.

המידע בעלון זה עשוי להשתנות בהתאם לסיבה לנטילת התרופה - לאחר השתלה או עבור טיפול במחלות אוטואימוניות.

מלא בדיוק אחר הוראות הרופא שלך. הן עשויות להיות שונות מהמידע הכללי בעלון זה.

<div></div>
<p>אין להשתמש בתרופה אם:</p> <ul style="list-style-type: none">הינך אלרגי לציקלוספורין או לאחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, המצויינים בסעיף 6. הינך נוטל תכשירים המכילים היפריקום (<i>Hypericum perforatum</i> - St. John's wort). הינך נוטל תכשירים המכילים <i>Dabigatran etexilate</i> (למניעת קרישי דם לאחר ניתוח) או בוסנטן (<i>Bosentan</i>) ואליסקירן (<i>Aliskiren</i>) (לטיפול ביתר לחץ דם). <p>אם מקרים אלו רלבנטיים אליך, יש ליידיע את הרופא מבלי לקחת סנדאיימון ניאורל. אם אינך בטוח, יש להתייעץ עם הרופא לפני התחלת הטיפול בסנדאיימון ניאורל.</p>

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני ובמהלך טיפול בסנדאיימון ניאורל, יש ליידיע את הרופא באופן מיידי:

- אם יש לך סימנים של זיהום, כגון חום גבוה או כאב גרון. סנדאיימון ניאורל מדכאת את מערכת החיסון ועלולה להשפיע על יכולת הגוף להילחם בזיהומים. אם אתה סובל מבעיות בכבד.
- אם אתה סובל מבעיות בכליות. הרופא שלך יערוך בדיקות דם סדירות ועשוי להתאים את המינון במידת הצורך.
- אם אתה סובל מבעיות לחץ דם גבוה. הרופא שלך יבדוק את לחץ הדם שלך באופן סדיר ויחנך שייתן לך תרופה להורדת לחץ דם בהתאם לצורך.
- אם יש לך ריחות נמוכות של מגניום. יתכן שהרופא ייתן לך תוספי מגניום, במיוחד לאחר ניתוח להשתלת איברים.
- אם יש לך רמות גבוהות של אשלגן בדם.
- אם הינך סובל משגדון (Gout).
- אם אתה צריך לקבל חיסון.

אם מקרים אלו רלבנטיים אליך לפני או במהלך הטיפול בסנדאיימון ניאורל, פנה לרופא מדי.

הגנה מפני חשיפה לשמש

סנדאיימון ניאורל מדכאת את מערכת החיסון. על כן, מגבירה את הסיכון להתפתחות סוגי סרטן, במיוחד סרטן העור ומערכת הלימפה. עליך להגביל את החשיפה לשמש ולקרנת UV על-ידי לבישת בגדים מגנים ומירחת קרם הגנה בעל מקדם הגנה גבוה לעיתים תכופות.

יש ליידיע את הרופא לפני התחלת הטיפול אם:

- יש לך בניתוח הקשורות בתלות באלכוהול
- יש לך אליפסיה
- יש לך בעיות כלשהן בכבד
- את בהריון
- את מיניקה
- התרופה ניתנת לילד

אם מקרים אלו רלבנטיים אליך (או שאתה לא בטוח), פנה לרופא לפני נטילת סנדאיימון ניאורל. זאת, מכיוון שתתרופה מכילה אלכוהול (אתנול). ראה סעיף "שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול".

בדיקות במהלך הטיפול בסנדאיימון ניאורל

הרופא שלך יערוך את הבדיקות הבאות:

- רמות הציקלוספורין בדם** - בעיקר אם עברת השתלה.
- לחץ דם** לפני התחלת הטיפול ובאופן קבוע במהלך הטיפול.
- תפקודי כבד וכליה**.
- רמות שומנים בדם**.

אם יש לך שאלות בנוגע לאופן השימוש בתרופה או למה תרופה זו נרשמה עבורך, פנה לרופא.

אם הינך מקבל סנדאיימון ניאורל למצבים שאינם לאחר השתלה (כגון: דלקת עיניים מסוג אובאיטיס, אובאיטיס של הלשכה המרכזית או האחרות של העין או אובאיטיס של רקע מחלת כבץ, אסתמה של העור, דלקת מפרקים שגרונית קשה או תסמונת נפרוטית), אין ליטול סנדאיימון ניאורל אם יש לך:

- בעיות בכליות (פרט לתסמונת נפרוטית)
- זיהומים שאינם שולטים בעזרת תרופות
- סרטן מכל סוג שהוא
- לחץ דם גבוה שאינו מאוזן על-ידי תרופות. במקרה שמתפתח לחץ דם גבוה במהלך הטיפול ולא ניתן לאזנו, על הרופא שלך להפסיק את הטיפול בסדאיימון ניאורל.

אין ליטול סנדאיימון ניאורל אם אחד מהמקרים הנ"ל חלים עליך. אם אתה לא בטוח, פנה לרופא או לרוקח לפני נטילת סנדאיימון ניאורל.

אם אתה תרופל בדלקת אובאיטיס משנית למחלת כבץ' (Behçet's uveitis), הרופא ינטר את מהלך הטיפול עם סנדאיימון ניאורל בקפדנות במיוחד אם יש לך סימפטומים ניוירולוגיים (לדוגמא: שכחה מוגברת, שינויים אישיותיים המורגשים בעי הזמן, הפרעות פסיכיאטריות או הפרעות במצבי הרוח, תחושת "שריפה" בגפיים, תחושה מורחשת בגפיים, תחושת עקצוץ בגפיים, חולשה בגפיים, הפרעות הליכה, כאב ראש עם או ללא בחילה והקאה, הפרעות בראייה כולל תזוזה מוגבלת של העין).

אם הינך קשש ומטופל בסנדאיימון ניאורל עבור פסוריאזיס או אסתמה של העור, עליך להימנע מחשיפה לכל סוג של גלי UV או טיפול באור (פוטותרפיה) במהלך הטיפול. הרופא ינטר בקפדנות את מהלך הטיפול.

ילדים ומתבגרים

אין לתת סנדאיימון ניאורל לילדים עבור מצבים שאינם לאחר השתלה, פרט לטיפול בתסמונת נפרוטית.

קשישים (בני 65 ומעלה)

ישו ניסיון מוגבל במתן סנדאיימון ניאורל לחולים קשישים. הרופא שלך צריך לנטר את תפקודי הכליה שלך. אם אתה מעל גיל 65 יש לך פסוריאזיס או אסתמה של העור אתה תוטפל בסדאיימון ניאורל רק במקרה שמהלה תמורה במיוחד.

אינטראקציות/תגובות בין תרופותיות

אם אתה לוקח, או את לקחת לאחורנה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

יש ליידיע את הרופא או הרוקח לפני נטילת סנדאיימון ניאורל במיוחד אם אתה לוקח: תרופות שעשויות להשפיע על רמות האשלגן כגון תרופות המכילות אשלגן, תוספי אשלגן, משתנים מסוג אצורי אשלגן ותרופות מסוימות להורדת לחץ דם.

- מנטורקסט. תרופה זו משמשת לטיפול בגידולים, בפסוריאזיס חמור ובדלקת מפרקים שגרונית קשה.
- תרופות שעשויות להעלות או להוריד את רמות ציקלוספורין (החומר הפעיל בסדאיימון ניאורל) בדם. הרופא שלך לבדוק את ריכוז הציקלוספורין בדמן כאשר מתחילים או מסיימים טיפול תרופתי אחר.
- תרופות שעשויות להעלות את רמות הציקלוספורין בדם: אנטיביוטיקות (כגון אריתרומיצין, אציתרומיצין), תרופות אנטי-פטריטיות (ווריקונאזול, איטראקונאזול), תרופות המשמשות לבקעות בלב או ללחץ דם גבוה (כגון: דיילטיאם, ניקרדיפין, וורפאמיל, אמידודיון), מטקלופראמיד (משמשת להפסקת בחילות), גלולות למניעת הריון, דנאזול (משמשת לטיפול בהפרעות של הווסת), תרופות המשמשות לטיפול בשגדון (אלופורינול), חומצה כולית ונגזרותיה (משמשות לטיפול באבני מרה), מעכבי פרטיגאיות המשמים לטיפול באיידס, סטימינבי (משמשת לטיפול בלקמיה או בגידולים), קולקסיס, טלפרבר (משמשת לטיפול בדלקת כבד C), קנאבידיול (משמש בין השאר לטיפול בפרכוסים).
- תרופות שעשויות להוריד את רמות הציקלוספורין בדם: ברביטורטים (תרופות המשמשות להשראת שינה), נוגדי פרכוסים מסוימים (כגון קרבמפיץ, פיניטואין), אוקטראוטיד (משמש לטיפול באקרומגליה או גידולים ניויראנדוקריניים במעינים), תרופות אנטי-בקטריאליות המשמשות לטיפול בשחפת, אורליסטט (מסייעת בהורדה במשקל), תרופות צמחיות המכילות (St. John's wort טיקלופרידין (משמש לאחר שבץ), תרופות מסוימות להורדת לחץ דם (בוסנטן), טרבינאפין (תרופה אנטי-טרייטית המשמשת לטיפול בזיהומים של הבחנות והציפורניים).

- תרופות אחרות שעשויות להשפיע על הכליות, כגון תרופות אנטי-בקטריאליות (נגנטמיצין, טוברמיצין, ציפרופלוקסאצין), תרופות אנטי-פטריטיות המכילות אמפוטריצין B, תרופות נגד דלקת בדרכי השתן המכילות טרימטופרים, תרופות לטיפול בסרטן המכילות מלפאלן, תרופות המשמשות להורדת כמות החומצה בקיבה (מעכבי הפרשת חומצה מסוג אנטגוניסטים לרעפטור-H2), טקרולימוס, משככי כאבים (תרופות נוגדות דלקת שאינן סטירואידיות כגון דיקלופנאק), חומצה פפירית (המשמשת להורדת שומן בדם).
- ניפדיפין, המשמשת לטיפול בלחץ דם גבוה ולתועקת לב. יתכן כי תיגרם נפיחות של התיכיים שתתפשט לעבר השיניים, אם לוקחים ניפדיפין במהלך הטיפול עם ציקלוספורין.
- דיאקסיד (משמשת לטיפול בבעיות בלב), תכשירים להורדת כולסטרול (מעכבי HMG-CoA רדוקטאז הנקראים גם סטטינים), פרדניזולון, אטופוסיד (משמשת לטיפול בסרטן), רפגליניד (תכשיר נגד סוכרת במתן דרך הפה), מדכאים של מערכת החיסון (אברולימוס, סירולימוס), אמברינסטאן ותרופות אנטי-סרעניות ספציפיות הנקראות אנטראציקליים (כגון דזקסדוביצין).
- מיקופנוולט סדיידם או מיקופנוולט מופטיל (מדכאת של מערכת החיסון) ואלטרנמבופג (משמשת לטיפול בהפרעות בדם).
- אם מקרים אלו רלבנטיים אליך (או שאתה לא בטוח), פנה לרופא לפני נטילת סנדאיימון ניאורל.

שימוש בתרופה ומזון

אין ליטול סנדאיימון ניאורל עם אשכולית או מיץ אשכוליות מאחר והדבר עשוי להשפיע על פעולת התרופה.

הריון והנקה

יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח לפני נטילת התרופה.

יש ליידיע את הרופא אם את בהריון או מתכוונת להיכנס להריון. הניסיון עם סנדאיימון ניאורל בהריון הינו מוגבל. באופן כללי, אין להשתמש בסנדאיימון ניאורל במהלך הריון. אם עליך ליטול תרופה זו, הרופא ידון עימך בתועלת ובסיכונים האפשריים הכרוכים בנטילת התרופה במהלך הריון.

יש ליידיע את הרופא אם את מיניקה. לא מומלץ להניק במהלך הטיפול עם סנדאיימון ניאורל מאחר וציקלוספורין, החומר הפעיל בסנדאיימון ניאורל, עובר בחלב האם ועלול להשפיע על התינוק.

הפטיטיס C (אנבזת C)

ספר לרופא שלך אם יש לך הפטיטיס C. תפקודי הכבד שלך עלולים להשתנות תחת טיפול להפטיטיס C. והדבר עלול להשפיע על רמות הציקלוספורין בדמן. הרופא שלך עשוי להידרש לנטר בקפדנות את רמות הציקלוספורין בדמן ולבצע התאמות מינון לאחר שתתחיל טיפול להפטיטיס C.

נהיגה בעיות במכוונות

אתה עלול להרגיש שינוי, מבולבל או לחוות טשטוש ראייה לאחר נטילה של סנדאיימון ניאורל. עליך להיות זהיר בעת נהיגה או הפעלת מכוונות כאשר אתה נוטל סנדאיימון ניאורל עד שתלמד כיצד תרופה זו משפיעה עליך.

באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש כדיומה.

הטיפול בתרופה וצריכת אלכוהול

כל כמוסה של סנדאיימון ניאורל 25 מ"ג, 50 מ"ג ו-100 מ"ג מכילה 25 מ"ג, 50 מ"ג ו-100 מ"ג תאנו (אלכוהול) בהתאמה, שהינו שווה ל-11.8 אחוז נפח כל מ"ל של סנדאיימון ניאורל 100 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתייה מכיל 94.70 מ"ג תאנול (אלכוהול) שהינו שווה ל- 12% אחוז נפח.

מנה של 500 מ"ג של סנדאיימון ניאורל מכילה אלקוהול בכמות שוות ערך ל-13 מ"ל של בירה או 5 מ"ל יין. לכתמת טקנה זו של אלכוהול אין כל השפעה ניכרת.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה סנדאיימון ניאורל מכילה שמן קיק (castor oil). סנדאיימון ניאורל מכילה שמן קיק, העלול לגרום לאי נוחות בקיבה ולשלשול.

סנדאיימון ניאורל פרופילן גליקול.

תרופה זו מכילה 46.42 מ"ג פרופילן גליקול בכל כמוסה בת 25 מ"ג. תרופה זו מכילה 90.36 מ"ג פרופילן גליקול בכל כמוסה בת 50 מ"ג. תרופה זו מכילה 148.31 מ"ג פרופילן גליקול בכל כמוסה בת 100 מ"ג. תרופה זו מכילה 94.70 מ"ג פרופילן גליקול בכל מ"ל של תמיסה לשתייה. אם תינוקך בן פחות מארבעה שבועות, פנה אל הרופא או אל הרוקח לפני שתינתן תרופה זו, ובפרט אם התינוק מקבל תרופות אחרות המכילות פרופילן גליקול או אלכוהול.

סנדאיימון ניאורל מכילה נתרן

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בכל כמוסה בת 25 מ"ג, 50 מ"ג ו-100 מ"ג, וניתן לומר כי היא למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בכתשיר.

אין לעבור על המנה המומלצת.
מינון התרופה יותאם לך על-ידי הרופא בלבד לפי הצרכים הייחודיים לך. מינון גבוה מדי עלול להשפיע על הכליות. יש לעבור בדיקות דם ולבקר בבית החולים באופן קבוע, במיוחד לאחר השתלה. הדבר יאפשר לך לדון עם הרופא על הטיפול ולציין מן הבעיות שאתה חווה.

המינון ותדירות המתן

הרופא ינטר את רמות הציקלוספורין בדמן בקפדנות יתרה למשך תקופה קצרה והסיבה לנטילת התרופה. הרופא גם יאמר לך באיזו תדירות ליטול את התרופה. יש לעקוב בדיוק אחר הוראות הרופא, ולעולם לא לשנות את המינון בעצמך, גם אם הינך מרגיש טוב.

אם קודם לכן נטלת צורת מינון שונה של ציקלוספורין במתן דרך הפה:

הרופא ינטר את רמות הציקלוספורין בדמן בקפדנות יתרה למשך תקופה קצרה בעקבות המעבר מצורת מינון אחת במתן דרך הפה לצורות מינון אחרת.

כאשר הינך עובר מצורת מינון אחת של ציקלוספורין במתן דרך הפה לצורת מינון אחרת, אתה עשוי לחוות תופעות לוואי. אם הדבר קורה, אנא אמור לרופא או לרוקח, שכן ייתכן שיש צורך להתאים את המינון שהינך נוטל. **לעולם אל תשנה** את המינון בעצמך, אלא בהוראת הרופא.

אופן השימוש:

מתי לקחת סנדאיימון ניאורל
חשוב ליטול את התרופה באותו הזמן בכל יום, בעיקר אם עברת השתלה.

כיצד לקחת סנדאיימון ניאורל

המינון היומי צריך תמיד להינתן בשתי מנות נפרדות.
סנדאיימון ניאורל כמוסות: יש להוציא את הכמוסה מאריזת המגש. יש לבלוע את הכמוסות בשלמותן עם כוס מים.

סנדאיימון ניאורל תמיסה לשתייה

שימוש התחלתי בסנדאיימון ניאורל תמיסה לשתייה:

- יש להרים את המכסה הנמצא במרכז טבעת הסגירה המתכנית.


- יש להסיר לגמרי את טבעת הסגירה.



- יש להוציא את הפקק האפור, ולהשליכו.



- יש להוציא את הפקק האפור, ולהשליכו.



- יש לדחוף את ידית הצינור עם הפקק הלבן בחוזקה לתוך צוואר הבקבוק.



- יש לבחור מרק בהתאם לנפח שנרשם על-ידי הרופא. לנפח הקטן מ-1 מ"ל או השווה ל-1 מ"ל, יש להשתמש במזרק ה-1 מ"ל. לנפחים הגדולים מ-1 מ"ל, יש להשתמש במזרק ה-4 מ"ל. יש להכניס את קצה המזרק לתוך הפקק הלבן.



- יש למשוך את הבוכנה עד לשאיבת נפח התמיסה שנרשם על-ידי הרופא (יש למקם את חלקה התחתון של הבוכנה מול הסימון המתאים לנפח שנרשם על-ידי הרופא).



- יש להוציא בועות גדולות על-ידי דחיפה ומשיכה של הבוכנה מספר פעמים, לפני הוצאת המזרק מהבקבוק, עם המינון הרשום. הימנעות מעט בועות קטנות אינה בעלת חשיבות ולא משפיע על המינון בשום אופן.

יש לוודא שבמזרוך יש את הכמות הכנונה של התרופה, ואז יש להוציא את המזרק מהבקבוק.



- יש לשפוך את התמיסה מהמזרק לתוך כוס קטנה המכילה מעט נוזל, דעופיות למיץ תפוזים או למיץ תפוזים (אך לא למיץ אשכוליות). יש להימנע מכל מגע בין המזרק והנוזל בתוך הכוס. יש לערבב ולשתות את התערובת כולה מיד.



- לאחר השימוש יש לנגב רק את חלקו החיצוני של המזרק עם מבובן יבש, ולהחזיר למקום. הצינור והפקק הלבן צריכים להישאר בתוך הבקבוק. יש לסגור את הבקבוק עם הפקק המצורף בנפרד.



שימוש חוזר בתמיסה לשתייה:

יש להחליף מעטףץ 5.

משך הטיפול

הרופא יאמר לך כמה זמן תצטרך לקחת סנדאיימון ניאורל. זאת, בהסתמך על האם סיבת הטיפול היא לאחר השתלה או לטיפול במחלת עור חמורה, דלקת מפרקים שגרונית, דלקת עיניים מסוג אובאיטיס או תסמונת נפרוטית. טיפול בפריוחה חמורה נמשך בדרך-כלל 8 שבועות.

יש להמשיך לקחת סנדאיימון ניאורל כל עוד הרופא אומר לך.

אם יש לך שאלות לגבי כמה זמן לקחת סנדאיימון ניאורל, פנה לרופא או לרוקח.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה אחר. יתכן שתצטרך טיפול רפואי.

אם שכתה ליטול את התרופה

אם שכתה ליטול תרופה זו בזמן הקצוב, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת, אלא אם כן תסיעת הגיע הזמן ללקיחת המנה הבאה. המשך לקחת את התרופה כרגיל. בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אין להפסיק את הטיפול בסנדאיימון ניאורל ללא הוראת רופא. המשך לקחת את הטיפול גם אם הינך מרגיש טוב. הפסקת הטיפול בסנדאיימון ניאורל עשויה להעלות את הסיכון לדחיית האיבר המושתל.

אין ליטול תרופות בחושה! ברוק התרופות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרוב משקפיים אינה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסנדאיימון ניאורל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מאף אחת מןן.

חלק מתופעות הלוואי עלולות להיות חמורות:

יש לפנות מיד לרופא אם אתה מבחין בתופעות הלוואי החמורות הבאות:

</