עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים
(תכשירים) התשמ"ו – 1986
הרופא משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ליסין תמיסה לשתיה

החומר הפעיל הכמותו:
כל מ"ל של **ליסין תמיסה לשתיה** מכיל:
לידוקסמטמין דימסילט 10 מ"ג
Lisdexamfetamine dimesylate 10 mg

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ואלרגיים בתכשיר: ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף". **קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך, אל תעביר אותה לאחרים, היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

אזהרה: תלות, שימוש לרעה והתמכרות
לליסין תמיסה לשתיה יש פוטנציאל גבוה לתלות, התמכרות/שימוש לרעה, מה שעלול להביל להתפתחות הפרעה בשימוש בתרופה, כולל התמכרות. הלתלות ושימוש לרעה החמורים מתרחשים סל מערכת העצבים המרכזית, כולל ליסין תמיסה לשתיה, עלולים לגרום למוות רתר ולמוות.

1. למה מיועדת התרופה?

ליסין תמיסה לשתיה הינה תכשיר המכיל את מרכיב העצבים המרכזית (CNS) המיועדת עבור טיפול בהפרעת קשב וריכוז (ADHD) במטופלים מגיל 6 ומעלה.
ליסין תמיסה לשתיה מיועדת לטיפול בהפרעת אכילה כפייתית מתונה עד חמורה (BED) במטופלים מעל גיל 18 שנה.

הגבלת שימוש:
ליסין תמיסה לשתיה אינה מיועדת או מומלצת ליירידה במשקל. שימוש בתרופות סימפטומימטיות אחרות שנשמשות ליירידה במשקל נקשרו לתופעות לוואי קרדיווסקולריות חמורות.
הבטיחות והיעילות של **ליסין תמיסה לשתיה** לטיפול בהשמנת יתר אינו מבוסס.
קבוצה תרפיוטית: מעורר מערכת העצבים המרכזית.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:
- אתה או ילדך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (Lisdexamfetimesylate), לאמפטמינים, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 "מידע נוסף").
- אתה או ילדך רגיש, אלרגי או הייתה לך/לו תגובה אלרגית לתכשירים אחרים המעוררים את מערכת העצבים המרכזית.
- עלולה להיות תחושה של קרירות, כאב, חוסר תחושה באצבעות הידיים והרגליים
- אצבעות הידיים והרגליים יכולות לשנות צבע מחיוור לכחול ולאדום
- יש ליידע את הרופא המטפל אם אתה או ילדך סובלים **מחוסר תחושה, כאב, שינוי בצבע העור או רגישות לקרה.**
- יש לפנות אל הרופא מייד אם לך או אצל ילדך מופיעים סימנים לקרות **ליסין תמיסה לשתיה.** סימנים של פציעים בלתי מוסברים באצבעות הידיים או הרגליים.

לפני הטיפול בליסין תמיסה לשתיה ספר לרופא או לרוקח אם:
- יש לך, לילדך או במשפחה היסטוריה של:
  - בעיות לב, מומי לב, מחלת לב, לחץ דם גבוה
  - בעיות נפשיות כגון פסיכוזה, מאניה, מחלה דו-קוטבית או דיכאון
  - בעיות בזרימת הדם באצבעות הידיים והרגליים
  - בעיות בכליות. הרופא עשוי להפחית את המינון
  - תנועות או צלילים חוזרים (טיקים) או הסמוכות טורט

ילדים ומתבגרים
התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 6 עם ADHD או מטופלים מתחת לגיל 18 עם הפרעת אכילה כפייתית – BED. אין מידע לגבי בטיחות ויעילות של **ליסין תמיסה לשתיה** בילדים מתחת לגיל 6, לטיפול ב-ADHD או מטופלים עם BED מתחת לגיל 18.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות
אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
- מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין (SSRIs)
- מעכבי ספיגה חוזרת של סרוטונין נוראדרנפינפרין (SNRIs)
- תרופות המשפעלות לטיפול בכאבי ראש מיגרנוטיים, הנקראות טריפטנים
- ליתיום
- פנטניל
- טרמדול
- טרימיפרין
- טרטרופון
- בופסירון
- סנט ג'ון וורט
- תכשירים נגד דיכאון כולל משפחת מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAOIs) לדוגמה: סלג'לין, אזוקלבנזקיד, פאנלזין, טרנילסיפרומין (ראה גם סעיף "אין להשתמש בתרופה אם")
- ויטמין סי (חומצה אסקורבית)
- סודה לשתייה (ביקרבונאט)
- חומרים המעלים את פרמיית השתן כגון אצטאזולאמיד, טריאמידים
- חומרים המעלים את חומציות השתן כגון אמוניום כלוריד, נתרן חומצה פוספט, מלחי מטנאמין
- תרופות נגד דיכאון טריציקליות כגון דסיפראמין, פרוטריפטילין

ליסין תמיסה לשתיה יכולה להשפיע על אופן הפעולה של תרופות אחרות והן יכולות להשפיע עליה, מה שיכול לגרום לתופעות לוואי חמורות. דע אילו תרופות אתה לוקח. יש לשמור את הרשימה שלהן כדי להראות לרופא ולרוקח כאשר אתה מקבל תרופה חדשה.

שימוש בתרופה ומזון
ניתן ליטול את התכשיר עם או ללא מזון.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול
לא מומלץ לשתות משקאות אלכוהוליים בזמן הטיפול **בליסין תמיסה לשתיה.**
אלכוהול עלול להחמיר תופעות לוואי המופיעות בזמן הטיפול **בליסין תמיסה לשתיה.**

הריון והנקה
אם הינך בהריון או עשויה להיות בהריון, יש להיוועץ ברופא לפני תחילת השימוש בתרופה.
אם הינך מניקה או מתכננת להניק, יש להיוועץ ברופא לפני תחילת השימוש בתרופה.
לא מומלץ להניק בזמן הטיפול **בליסין תמיסה לשתיה** מכיוון שהתרופה עוברת לחלב אם.

נהיגה ושימוש במכונות
ליסין תמיסה לשתיה עלולה לגרום לסחרחורת, שינויים והפרעות ראייה, לאלה יכולה להיות השפעה מתונה על היכולת לנהוג ולהשתמש במכונות. אם אתה חווה אחת מהתופעות הללו, עליך להימנע מפעילויות שעלולות להיות מסוכנות כגון נהיגה או הפעלת מכונות.

בדיקות ומעקב
בתקופת הטיפול ייתכן ותופנה גם לבדיקות דם. בדיקות לב ולחץ דם שנשמרו. יש לבדוק לעיתים קרובות בילדים גובה ומשקל בזמן הטיפול **בליסין תמיסה לשתיה.** הטיפול **בליסין תמיסה לשתיה** עלול להיפסק אם ילדך לא גדל או מעלה במשקל. הרופא עשוי להפסיק את הטיפול **בליסין תמיסה לשתיה** כדי לבדוק תסמיני ADHD או BED.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למ"ל, ולכן נחשבת "נטולת נתרן".
תרופה זו מכילה 100 מ"ג פרופילן גליקול לכל מ"ל תמיסה לבליעה.
תרופה זו מכילה מתיל הידרוקסיבנזואט סודיום ופרופיל הידרוקסיבנזואט סודיום, שעלולים לגרום לתגובות אלרגיות (ייתכן באיחור).

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:
יש ליטול מנה אחת של **ליסין תמיסה לשתיה** כל בוקר. ניתן ליטול עם או ללא מזון.
המינון המומלץ יקבע בהתאם להנחיית הרופא. המינון היומי המרבי הוא 70 מ"ג (7 מ"ל).

אריזת התכשיר ליסין תמיסה לשתיה כוללת בקבוק אחד של תמיסה לשתיה המכיל 100 מ"ל תמיסה לשתיה עם פקק קשה-פתיחה לילדים ומתאם לבקבוק. האריזה כוללת בנוסף מזרק מדידה בנפח של 10 מ"ל למדידת המנה המסומן בשנתות של 1 מ"ל.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם אתה או ילדך נטלתם בטעות מינון גבוה יותר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופה זו בזמן המיידע, קח את המנה הבאה בזמנו הרגיל היהיועץ ברופא. **אל תיקח מנה כפולה.**
יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ב**ליסין תמיסה לשתיה** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות מייד לרופא אם יש לך אחת מתופעות הלוואי הבאות:
- בעיות לב, התסמינים עלולים לכלול:
  - כאב בחזה
  - קוצר נשימה
  - התעלפות
  (ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" – "בעיות הקשורות ללב").
- תסמינים נפשיים, הפרעות התנהגות חדשות או החמרה בהפרעות קיימות והפרעות חשיבה. התסמינים עלולים לכלול:
  - שמיעת קולות
  - ראות דברים שאנשים אחרים
  - להאמין דברים שאנשים נכונים
  - להיות חשדן
  (ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" – "בעיות נפשיות [פסיכיאטריות]").
- הפרעות בסריקולציה בכלי הדם באצבעות ובבהונות כפות הרגליים (מחלת כלי דם היקפיים, לרבות מחלת רנו). התסמינים עלולים לכלול:
  - תחושת נימול, קור, כאב באצבעות או בבהונות כף הרגל
  - שינוי צבע מחיוור לכחול, או אדום באצבעות או בהונות כף הרגל
  ספר לרופא שלך אם לך או לילדך יש חוסר תחושה, כאב, שינוי בצבע העור או רגישות לטמפרטורה באצבעות או בהונות. התקשר לרופא שלך מייד אם יש לך או לילדך סימנים של פציעים בלתי מוסברים התסמינים באצבעות או בבהונות במהלך הטיפול **בליסין תמיסה לשתיה** (ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" – "בעיות נזרמים הדם באצבעות הידיים והרגליים").
- האטה בגדילה (גובה ומשקל) בילדים
- טיקים חדשים או החמרה בטיקים או בתסמונת טורט. ספר לרופא שלך אם אתה או ילדך מובלים מטיקים חדשים או החמרה בטיקים או מהחמרה של תסמונת טורט במהלך הטיפול **בליסין תמיסה לשתיה.**
- **תסמונת סרוטונין** – תסמונת שעלולה לסכן חיים ועשויה להתרחש כאשר **ליסין תמיסה לשתיה** נלקחת יחד עם תרופות מסוימות. הפסק ליטול **ליסין תמיסה לשתיה** והתקשר לרופא או פנה מייד לחדר המיון הקרוב אם אתה או ילדך מפתחים אחד מהתסמינים הבאים של תסמונת סרוטונין:
  - אי שקט
  - דופק מהיר
  - הסמפה
  - פרכוסים
  - תרדמת
  - הקיה
  - אובדן קואורדינציה
  - בלבול
  - סחרחורת
  - כאב ראש
  - הזעה
  - אובדן קואורדינציה
  - בלבול
  - סחרחורת
  - הקיאות
  - שלשולים
  - חרדה
  - ירידה במשקל
  - סחרחורות
  - בחילה
  - הקאות
  - הפרעות שינה
  - יובש בפה
  - עצבנות
  - כאבי בטן עלינה
  - כאב ראש

תופעות לוואי שכיחות של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם ADHD (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 100):
- שמיעת קולות
- ראות דברים שאנשים אחרים
- להאמין דברים שאנשים נכונים
- להיות חשדן
- הפרעות בסריקולציה בכלי הדם באצבעות ובבהונות כפות הרגליים (מחלת כלי דם היקפיים, לרבות מחלת רנו). התסמינים עלולים לכלול:
  - תחושת נימול, קור, כאב באצבעות או בבהונות כף הרגל
  - שינוי צבע מחיוור לכחול, או אדום באצבעות או בהונות כף הרגל
  ספר לרופא שלך אם לך או לילדך יש חוסר תחושה, כאב, שינוי בצבע העור או רגישות לטמפרטורה באצבעות או בהונות. התקשר לרופא שלך מייד אם יש לך או לילדך סימנים של פציעים בלתי מוסברים התסמינים באצבעות או בבהונות במהלך הטיפול **בליסין תמיסה לשתיה** (ראה סעיף 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" – "בעיות נזרמים הדם באצבעות הידיים והרגליים").
- האטה בגדילה (גובה ומשקל) בילדים
- טיקים חדשים או החמרה בטיקים או בתסמונת טורט. ספר לרופא שלך אם אתה או ילדך מובלים מטיקים חדשים או החמרה בטיקים או מהחמרה של תסמונת טורט במהלך הטיפול **בליסין תמיסה לשתיה.**
- **תסמונת סרוטונין** – תסמונת שעלולה לסכן חיים ועשויה להתרחש כאשר **ליסין תמיסה לשתיה** נלקחת יחד עם תרופות מסוימות. הפסק ליטול **ליסין תמיסה לשתיה** והתקשר לרופא או פנה מייד לחדר המיון הקרוב אם אתה או ילדך מפתחים אחד מהתסמינים הבאים של תסמונת סרוטונין:
  - אי שקט
  - דופק מהיר
  - הסמפה
  - פרכוסים
  - תרדמת
  - הקיה
  - אובדן קואורדינציה
  - בלבול
  - סחרחורת
  - הקיאות
  - שלשולים
  - חרדה
  - ירידה במשקל
  - סחרחורות
  - בחילה
  - הקאות
  - הפרעות שינה
  - יובש בפה
  - עצבנות
  - כאבי בטן עלינה
  - כאב ראש

תופעות לוואי שכיחות של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם ADHD (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 100):
- ירידה בתיאבון
- עלייה בקצב הלב
- עצבנות
- עצירות
- חרדה
- שלשולים
- ירידה במשקל
- התעלפות
- יתר לחץ דם
- הקאות
- יובש בפה
- שלשולים
- כאבי בטן עלינה
- כאב ראש
- הקאה
- דלקת בקיבה ומעיים
- נימול (תחושת עקצוצים בעור ללא סיבה נראית לעין)
- גרד
- כאב בטן עלינה
- אנגינה מוגברת
- דלקת בדרכי השתן
- סיוטים, חלום בלהות
- אי שקט
- כאב בחלק התחתון של הלוע

תופעות לוואי שאינן שכיחות של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם ADHD (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000):
- דימום באף
- כאב בחזה
- כעס
- גרד עור כפייתי
- כאב ראש
- דיכאון
- פרנויה

תופעות לוואי נוספות
תופעות לוואי שכיחות מאוד בילדים בגילאי 6 עד 17 ומבוגרים עם ADHD (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):
- אובדן תיאבון (אנורקסיה)
- ירידה בתיאבון
- שלשולים
- חרדה
- ירידה במשקל
- סחרחורות
- בחילה
- הקאות
- הפרעות שינה
- יובש בפה
- עצבנות
- כאבי בטן עלינה
- כאב ראש

תופעות לוואי שכיחות מאוד של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם BED (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):
- יובש בפה
- נדודי שינה

תופעות לוואי שכיחות של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם BED (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 10):
- ירידה בתאבון
- עלייה בקצב לב
- עצבנות
- עצירות
- חרדה
- שלשולים
- ירידה במשקל
- הקאה
- דלקת בקיבה ומעיים
- נימול (תחושת עקצוצים בעור ללא סיבה נראית לעין)
- גרד
- כאב בטן עלינה
- אנגינה מוגברת
- דלקת בדרכי השתן
- סיוטים, חלום בלהות
- אי שקט
- כאב בחלק התחתון של הלוע

תופעות לוואי שאינן שכיחות של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם BED (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 100):
- תוצאות ECG שאינן תקינות המראות ventricular hypertrophy
- היפראקטיביות פסיכומוטורית

תופעות לוואי שאינן שכיחות של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם ADHD (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000):
- דיבור יתר
- כאב בחזה
- כעס
- גרד עור כפייתי
- כאב ראש
- דיכאון
- פרנויה

תופעות לוואי שכיחות מאוד של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם BED (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):
- יובש בפה
- נדודי שינה

תופעות לוואי שכיחות של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם BED (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 10):
- ירידה בתאבון
- עלייה בקצב לב
- עצבנות
- עצירות
- חרדה
- שלשולים
- ירידה במשקל
- הקאה
- דלקת בקיבה ומעיים
- נימול (תחושת עקצוצים בעור ללא סיבה נראית לעין)
- גרד
- כאב בטן עלינה
- אנגינה מוגברת
- דלקת בדרכי השתן
- סיוטים, חלום בלהות
- אי שקט
- כאב בחלק התחתון של הלוע

תופעות לוואי שאינן שכיחות של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם ADHD (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000):
- דיבור יתר
- כאב בחזה
- כעס
- גרד עור כפייתי
- כאב ראש
- דיכאון
- פרנויה

תופעות לוואי שכיחות מאוד של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם BED (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):
- יובש בפה
- נדודי שינה

תופעות לוואי שכיחות של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם BED (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 10):
- ירידה בתאבון
- עלייה בקצב לב
- עצבנות
- עצירות
- חרדה
- שלשולים
- ירידה במשקל
- הקאה
- דלקת בקיבה ומעיים
- נימול (תחושת עקצוצים בעור ללא סיבה נראית לעין)
- גרד
- כאב בטן עלינה
- אנגינה מוגברת
- דלקת בדרכי השתן
- סיוטים, חלום בלהות
- אי שקט
- כאב בחלק התחתון של הלוע

תופעות לוואי שאינן שכיחות של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם ADHD (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000):
- דיבור יתר
- כאב בחזה
- כעס
- גרד עור כפייתי
- כאב ראש
- דיכאון
- פרנויה

תופעות לוואי שכיחות מאוד של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם BED (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):
- יובש בפה
- נדודי שינה

תופעות לוואי שכיחות של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם BED (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 10):
- ירידה בתאבון
- עלייה בקצב לב
- עצבנות
- עצירות
- חרדה
- שלשולים
- ירידה במשקל
- הקאה
- דלקת בקיבה ומעיים
- נימול (תחושת עקצוצים בעור ללא סיבה נראית לעין)
- גרד
- כאב בטן עלינה
- אנגינה מוגברת
- דלקת בדרכי השתן
- סיוטים, חלום בלהות
- אי שקט
- כאב בחלק התחתון של הלוע

תופעות לוואי שאינן שכיחות של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם ADHD (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000):
- דיבור יתר
- כאב בחזה
- כעס
- גרד עור כפייתי
- כאב ראש
- דיכאון
- פרנויה

תופעות לוואי נוספות
תופעות לוואי שכיחות מאוד בילדים בגילאי 6 עד 17 ומבוגרים עם ADHD (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):
- אובדן תיאבון (אנורקסיה)
- ירידה בתיאבון
- שלשולים
- חרדה
- ירידה במשקל
- סחרחורות
- בחילה
- הקאות
- הפרעות שינה
- יובש בפה
- עצבנות
- כאבי בטן עלינה
- כאב ראש

תופעות לוואי שכיחות של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם BED (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 10):
- ירידה בתאבון
- עלייה בקצב לב
- עצבנות
- עצירות
- חרדה
- שלשולים
- ירידה במשקל
- הקאה
- דלקת בקיבה ומעיים
- נימול (תחושת עקצוצים בעור ללא סיבה נראית לעין)
- גרד
- כאב בטן עלינה
- אנגינה מוגברת
- דלקת בדרכי השתן
- סיוטים, חלום בלהות
- אי שקט
- כאב בחלק התחתון של הלוע

תופעות לוואי שאינן שכיחות של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם ADHD (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000):
- דיבור יתר
- כאב בחזה
- כעס
- גרד עור כפייתי
- כאב ראש
- דיכאון
- פרנויה

תופעות לוואי שכיחות מאוד של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם BED (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):
- יובש בפה
- נדודי שינה

תופעות לוואי שכיחות של ליסין תמיסה לשתיה במטופלים עם BED (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 10):
- ירידה בתאבון
- עלייה בקצב לב
- עצבנות
- עצירות
- חרדה
- שלשולים
- ירידה במשקל
- הקאה
- דלקת בקיבה ומעיים
- נימול (תחושת עקצוצים בעור ללא סיבה נראית לעין)
- גרד
- כאב בטן עלינה
- אנגינה מוגברת
- דלקת בדרכי השתן
- סיוטים, חלום בלהות
- אי שקט
- כאב בחלק התחתון של הלוע

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:
Propylene glycol, Phosphate buffer (Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Sodium dihydrogen phosphate dihydrate, Purified water), Methyl hydroxybenzoate sodium, Propyl hydroxybenzoate sodium, Saccharin sodium, Hydrochloric acid, Sodium hydroxide, Purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
ליסין תמיסה לשתיה הינה תמיסה חסרת צבע ושלולה.
אריזת התכשיר ליסין תמיסה לשתיה כוללת בקבוק אחד של תמיסה לשתיה המכיל 100 מ"ל תמיסה לשתיה עם פקק קשה-פתיחה לילדים ומתאם לבקבוק. האריזה כוללת בנוסף מזרק מדידה בנפח של 10 מ"ל למדידת המנה המסומן בשנתות של 1 מ"ל

שם בעל הרישום וכתובתו: אוניפארם בע"מ, ת.ד. 16545, ת"א, 6116401

שם היצרן וכתובתו: אוניפארם בע"מ, פארק תעשיה "מבוא כרמל".

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 99 38626 99 182 43

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בינואר 2026.

למידע נוסף על התכשיר ולעלונים מעודכנים בשפות עברית, ערבית, רוסית, אנגלית סרוקו את הקוד הבא:

For further information about the medicinal product and for updated patient leaflets in Hebrew, Arabic and English, please scan the code:

ליסין תמיסה לשתיה
LISSIN ORAL SOLUTION

ניתן לפנות לבעל הרישום של התכשיר בבקשה לקבל עלון מודפס לצרכן בשפה האנגלית בכתובת הדואר האלקטרוני: info@unipharm.co.il או בטלפון מספר 03-6135050.

To receive a printed patient leaflet in English, you can contact the registration holder by e-mail: info@unipharm.co.il or by telephone: 03-6135050.

אוניפארם unipharm

117808013

06A26