

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
תרופה זו משווקת על פי מרשם רופא בלבד

רוזובסטטין טבע חדש 5 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבלייה מצופה מכילה:

רוזובסטטין 5 מ"ג (רוזובסטטין סידן)

Rosuvastatin 5 mg (as rosuvastatin calcium)

רוזובסטטין טבע חדש 10 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבלייה מצופה מכילה:

רוזובסטטין 10 מ"ג (רוזובסטטין סידן)

Rosuvastatin 10 mg (as rosuvastatin calcium)

רוזובסטטין טבע חדש 20 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבלייה מצופה מכילה:

רוזובסטטין 20 מ"ג (רוזובסטטין סידן)

Rosuvastatin 20 mg (as rosuvastatin calcium)

רוזובסטטין טבע חדש 40 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבלייה מצופה מכילה:

רוזובסטטין 40 מ"ג (רוזובסטטין סידן)

Rosuvastatin 40 mg (as rosuvastatin calcium)

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים" והערות "תורפה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

רוזובסטטין טבע חדש אינו מיועד לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנה.

1. למה מיועדת התרופה?

רוזובסטטין טבע חדש מיועד לטיפול במבוגרים:

- בהיפרכולסטרולמיה ראשונית (מסוג IIa כולל היפרכולסטרולמיה משפחתית הטריזוגוטית) (מצבים בהם יש רמת כולסטרול גבוהה בדם) או דיסליפידמיה מעורבת מסוג IIb (הפרעה ברמות השומנים השונים בדם). התרופה ניתנת כתוספת לדיאטה במצבים בהם התגובה לדיאטה ולטיפולים שאינם תרופתיים (כגון פעילות להורדת משקל) אינה מספקת.
- בהיפרכולסטרולמיה משפחתית הומוזיגוטית (מצב בו יש רמת כולסטרול גבוהה בדם) בשילוב עם דיאטה וטיפולים אחרים להורדת רמות השומנים בדם (כגון סילוק מומים – LDL apheresis) או במקרים בהם טיפולים אלו אינם מתאימים.

קבוצה תרופויות

מעכב אדמי HMG-CoA reductase.

רוזובסטטין טבע חדש שייך לקבוצת תרופות הנקראת סטטינים, הפועלת להורדת רמת השומנים בדם, הנפוץ ביותר נקרא כולסטרול. ישנם מספר סוגי כולסטרול בדם, "כולסטרול רע" ו-"כולסטרול טוב". רוזובסטטין טבע חדש פועל ומסייע לגוף לחסום את ייצור ה"כולסטרול הרע" ובפניו מהגוף ומסייע להעלות את רמות ה"כולסטרול הטוב".

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 – "מידע נוסף").**
- יש לך מחלת כבד.**
- אתה סובל מבעיות כליה חמורות.**
- אתה סובל ממיחושים או מכאבי שרירים חוזרים או בלתי מוסברים.**
- אתה נוטל שילוב תרופתי של סופוסובוריל/ולפטסביר/ווקסילפרביר (המשמש לטיפול בזיהום ויראלי של הכבד הנקרא הפטיטיס C).**
- אתה נוטל ציקלוספורין (למשל לאחר השתלת איברים).**
- אתה מתחת לגיל 18.**
- אנא פנה לרופא שלך אם אחד מאלו נוגע אליך (או אם יש לך ספק).**
- בנוסף, אין להשתמש בטבליות של רוזובסטטין טבע חדש 40 מ"ג (המינון הגבוה ביותר) אם:**
 - אתה סובל מבעיות מתונות בתפקוד הכליה (במידה ויש ספק, אנא פנה לרופא).**
 - אתה סובל מבעיות בפעילות בלוטת התריס (תירואיד).**
 - אתה סובל ממיחושים או מכאבים חוזרים או בלתי מוסברים בשרירים, אם אתה בעל עבר אישי או משפחתי של בעיות בשרירים או אם סבלת מבעיות בשרירים בעבר נטילת תרופות אחרות להורדת כולסטרול.**
 - אתה צורך כמויות גדולות של אלכוהול באופן קבוע.**
 - אתה ממוצא אסיאתי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, ויאטנמי, יפני).**
- אתה נוטל תרופות נוספות להורדת כולסטרול הנקראות פיברטים.**
- אנא פנה לרופא אם אחד מאלו נוגע אליך (או אם יש לך ספק).**

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בתרופה ספר לרופא אם:

- אתה סובל מליקוי בתפקוד הכבד, הכליות או בלוטת התריס.**
- אתה סובל ממיחושים או מכאבים חוזרים או בלתי מוסברים בשרירים או אם אתה סבלת או בן משפחתך סבל בעבר מבעיות בשרירים או שיש לך עבר של בעיות בשרירים בעת לקיחת תרופות אחרות להורדת כולסטרול.** יש ליידע מיד את הרופא המטפל אם מופיעים מיחושים או כאבים בלתי מוסברים בשרירים, במיוחד אם הם מלווים בהרגשה כללית לא טובה או חום. יש ליידע את הרופא גם במידה ואתה סובל מחולשת שרירים מתמשכת.
- אתה סובל או סבלת בעבר ממיאסטיניה (מחלה הגורמת לחולשת שרירים כללית, הכוללת במקרים מסוימים חולשה בשרירים המעורבים בנשימה) או ממיאסטיניה אוטולית (מחלה הגורמת לחולשה בשרירי העין),** מאחר וסטטינים לעיתים עלולים להחריף את המחלה או לגרום להופעתה (ראה סעיף 4 – "תופעות לוואי").
- אם אי פעם פיתחת פריחה חמורה בעור או קילוף בעור, שלפוחיות ו/או פצעים בפה לאחר נטילת רוזובסטטין או תרופות קשורות אחרות.**
- אתה נוטל תרופות נוספות להורדת כולסטרול הנקראות פיברטים,** אנא קרא עלון זה בעיון אף אם השתמשת בתרופות להורדת כולסטרול בעבר.

אתה נוטל תרופות המיועדות לטיפול בזיהום של נגיף הכשל החיסוני האנושי (HIV) (כגון: ריטובויר עם לופיביר ו/או אטאזאנאביר). ראה בהמשך סעיף 2 – "אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות".

אתה נוטל או נטלת אנטיביוטיקה המכילה חומצה פוסידית ב-3 הימים האחרונים (לטיפול בזיהום חיידקי בבליעה או בהזרקה). השילוב של חומצה פוסידית ורוזובסטטין עלול לגרום לבעיות שריר חמורות (רבדומיוליזיס). **ראה בהמשך סעיף 2 – "אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות".**

אתה מעל לגיל 70 (הרופא יבחר מינון התחלתי של רוזובסטטין טבע חדש המתאים לך).

- אתה סובל מכשל נשימתי חמור.**
- אתה ממוצא אסיאתי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, ויאטנמי, יפני).** הרופא יבחר מינון התחלתי של רוזובסטטין טבע חדש המתאים לך.
- אם אחד המצבים הרשומים מעלה מתייחס אליך (או אם אינך בטוח) **אל ניטול רוזובסטטין טבע חדש 40 מ"ג (המינון הגבוה ביותר) לבדוק עם הרופא או הרוקח שלך לפני תחילת השימוש בכל מינון של רוזובסטטין טבע חדש.**

תגובות עור חמורות כולל תסמונת סטיבנס-ג'ונסון ותסמונת התגובה התרופתית עם אאזינופיליה ותסמינים מערכתיים (DRESS) דווחו בהקשר לטיפול ברוזובסטטין. הפסק להשתמש ברוזובסטטין טבע חדש ופנה לעזרה רפואית מיידיית אם אתה מבחין באחד מהתסמינים המתוארים בסעיף 4 – "תופעות לוואי".

במספר קטן של מוטפלים, סטטינים עלולים להשפיע על הכבד, ניתן לזהות השפעה זו בבדיקת דם פשוטה הבודקת עלייה ברמות אנזימי הכבד. לכן, הרופא בדרך כלל יפנה אותך לבצע בדיקות דם של תפקודי כבד, לפני ובמהלך הטיפול בתרופה.

בזמן שאתה מטופל בתרופה זו, הרופא שלך יבצע מעקב הדוק אם יש לך סוכרת או אם אתה בסיכון לפתח סוכרת. ייתכן שאתה בסיכון לפתח סוכרת אם יש לך רמות גבוהות של סוכרים ושומנים בדם, עודף משקל ולחץ דם גבוה.

ילדים ולחץ דם גבוה

רוזובסטטין טבע חדש אינו מיועד לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנה.

אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במיוחד אם אתה לוקח:

- ציקלוספורין (בשימוש לאחר השתלת איברים)
- בלומוסדיל (לטיפול במחלת השתל נגד המאסכן כרונית (cGvHD))
- וורפריד, קלופידוגרל או טיקגדולר (או כל תרופה אחרת לדילול דם)
- פיבראטים (כגון גמפיברוזיל או פנופיברט) או כל תרופה אחרת להורדת כולסטרול (כגון אזטימיב)
- תרופות לטיפול בקלקול קיבה (משמשות כסותרי חומצה בקיבה) אריתרמוציין (אנטיביוטיקה), חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה – ראה בהמשך ולעיל בסעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה")

- גלולות למניעת הריוון
- גורופיב (לטיפול בסרטן)
- דולוטמיד (לטיפול בסרטן)
- קפטטיניב (לטיפול בסרטן)
- מומולטיניב (לטיפול במיאלופיברוזיס, צורה נדירה של סרטן דם)
- טיפול הורמונלי תחלתי
- פוסטטטיניב (לטיפול במצב של ספירת טסיות נמוכה)
- פבוקסוסטט (לטיפול ולמניעה של רמות גבוהות של חומצת שתן בדם)
- טריפלנומיד (לטיפול בטרשת נפוצה)

- תרופות לטיפול בזיהומים ויראליים, כולל בזיהום של נגיף הכשל החיסוני (HIV) או בדלקת כבד (הפטיטיס מסוג C, לבד או בשילוב עם (ראה סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה" וריטוביר, לופיביר, אטאזאנאביר, סופוסובוריל, ווקסילפרביר, אומביטסביר, פריטפרביר, דסבוביר, ולפטסביר, גרזופרביר, אלבסביר, גלקפרביר, פיברנטסביר
- רוקסוסטט או אדדוסטט (תרופות המעלות את מספר תאי הדם האדומים ואת רמת ההמוגלובין במטופלים עם מחלת כליות כרונית)
- אנטידינב (לטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה)
- טפזידייס (לטיפול בנפילואידוזיס של טרנסטריטין)
- ההשפעה של תרופות אלו עלולה להשתנות כתוצאה משימוש בו זמנית עם רוזובסטטין טבע חדש או שהן עלולות לשנות את ההשפעה של רוזובסטטין טבע חדש.

חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה) – אם עליך ליטול חומצה פוסידית במתן פומי לטיפול בזיהום חיידקי, יהיה עליך להפסיק באופן זמני את הטיפול ברוזובסטטין טבע חדש. הרופא יאמר לך מתי ניתן לחזור לטיפול רוזובסטטין טבע חדש. נטילת רוזובסטטין עם חומצה פוסידית עלולה לגרום לעיתים נדירות לחולשה, לרגישות או לכאב בשרירים (רדומיוליזיס). ראה מידע נוסף לגבי רבדומיוליזיס בסעיף 4 – "תופעות לוואי".

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול רוזובסטטין טבע חדש עם או ללא אוכל.

הריון והנקה

אם את בהריון או מניקה, חוששה שאת בהריון או מתכננת להרות, התיעיץ עם רופא או רוקח לפני נטילת תרופה זו.

הנקה

לא מומלץ להניק במהלך הטיפול ברוזובסטטין טבע חדש. קיים מידע מוגבל ממחקרים על הימצאות ברוזובסטטין בחלב אם. בשל מנגנון הפעולה של רוזובסטטין, קיים סיכון פוטנציאלי לתופעות לוואי בתינוק. אין מידע זמין על השפעות התרופה על התינוק היונק או על השפעות התרופה על ייצור החלב.

נהיגה ושימוש במכוונות

מרבית המיטופלים יכולים לנהוג ברכב ולתפעל מכוונות בזמן השימוש ברוזובסטטין טבע חדש – התרופה לא תפגום בכשירותם לבצע פעולות אלו. אולם חלק מהמטופלים עלולים לחוש סחרחורת תוך כדי השימוש בתרופה. במידה ואתה חש סחרחורת עליוך לפנות לרופא לפני הפעלת מכוונות או נהיגה ברכב.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים (לקטוז או סוכר חלב) היוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.

התרופה מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בכל טבלייה ועל כן נחשבת "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר.

הטיפול נאופן הטיפול יקבע על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא: הטיפול עם רוזובסטטין טבע חדש תחיל עם **טבלייה אחת של 5 מ"ג או 10 מ"ג** פעם ביום, גם אם

נטלת לפני כן סטטינים אחרים במינון גבוה יותר. הבחירה במינון ההתחלתי תהיה תלויה ב:

- רמת הכולסטרול.
- רמת הסיכון שתלקה בהתקף לב או בשבץ מוחי.
- מידת הסבירות כי תהיה רגיש יותר לתופעות לוואי אפשריות.
- אנא היוועץ ברופא או ברוקח שלך לגבי המינון המתאימה ביותר עבורך. ייתכן שהיורש יחליט לתת לך את הגבי המינון ביותר – 5 מ"ג אם:
 - אתה ממוצא **אסיאתי** (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, ויאטנמי, יפני).
 - אתה בן **70 ומעלה**.
 - אתה סובל מבעיות מתונות בתפקוד הכליה.
 - אתה בסיכון לסובל מכאבי שרירים (מיופתיה).

הנלת המינון ומינון יומי מירבי

ייתכן שהרופא יחליט להעלות את המינון שאתה נוטל על מנת שיתאים עבורך. במידה והתחלת עם מינון של רוזובסטטין טבע חדש 5 מ"ג, ייתכן שהרופא יפיל את המינון לרוזובסטטין טבע חדש 10 מ"ג. במידה והתחלת לאחר מכן ל-20 מ"ג ובמידת הצורך יעלה ל-40 מ"ג. במידה והתחלת עם מינון של רוזובסטטין טבע חדש 10 מ"ג, ייתכן שהרופא יפיל

את המינון ל-20 מ"ג, לאחר מכן במידת הצורך יעלה ל-40 מ"ג. יהיה מרווח של 4 שבועות בין כל העלאת מינון.

המינון המקסימלי היומי הוא 40 מ"ג. הוא ניתן בדרך כלל לחולים עם רמות גבוהות מאוד של כולסטרול וסיכון גבוה ללקות בהתקף לב או בשבץ מוחי, כאשר רמות הכולסטרול אינן יורדות מספיק עם 20 מ"ג.

אין לעבור על המנה המומלצת.

בדיקות כולסטרול סדירות

יש לבדוק את רמות הכולסטרול באופן קבוע, על מנת לוודא שהכולסטרול שלך הגיע לרמה הרצויה ושרמה זו נשמרת. ייתכן שהרופא יחליט להעלות את המינון על מנת שתיטול את כמות התרופה שמתאימה לך.

אופן השימוש

ניתן ליטול את התרופה בכל שעות היום עם או בלי אוכל. מומלץ ליטול את התרופה מדי יום בשעה קבועה בכדי לזכור לקחת את התרופה.

יש לבלוע הטבליות עם מים.

אם נוטלים סותרי חומצה מסוג מלחי אלומיניום או מגנזיום, יש ליטול את התרופה טבע חדש לפחות ששתיים לפני נטילה של סותרי חומצה מסוג מלחי אלומיניום/מגנזיום.

ניתן לחצות את טבליות רוזובסטטין טבע חדש 10 מ"ג, 20 מ"ג ו-40 מ"ג בקו החצייה.

אין לחצות את הטבלייה של רוזובסטטין טבע חדש 5 מ"ג.

אין מידע לגבי ריטוק וכתישת הטבלייה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עליך ליצור קשר עם הרופא או לפנות לבית החולים. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את ארזית התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה, יש לדלג על המנה שנשכחה וליטול את המנה הבאה בהתאם ללוח הזמנים הרגיל. אין ליטול שתי מנות ביחד על מנת לפצות על מנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה רמות הכולסטרול שלך עשויות לעלות שוב.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משפכיים אם אתה דזוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברוזובסטטין טבע חדש עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת

יש להפסיק את הטיפול ברוזובסטטין טבע חדש ולפנות מיד לקבלת טיפול רפואי אם:

- יש לך אחת מתגובות רגישות היתר (אלרגיה) הבאות:
 - קושי נשימתי עם או בלי נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ו/או בגרון.
 - נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ו/או בגרון, שעשויים לגרום לקשיי בליעה.
 - גרד חריף בעור (עם הופעת שלפוחיות מורמות).
 - כתמים אדמדםים שאינם מוגבהים, דמויי מטרه או מעגליים על הגוף, לעיתים עם שלפוחיות במרכז, קילוף עור, כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין ובעיניים. (לפריחת עור חמורות אלו יכול להיות שקדמו חום ותסמינים דמויי שפעת (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון).
 - פריחה ממושטת, חום גבוה ובלוטות לימפה מוגדלות (תסמונת DRESS או תסמונת רגישות היתר לתרופה).

בנוסף, יש להפסיק את הטיפול ברוזובסטטין טבע חדש ולפנות מיד לרופא אם:

- יש לך כאבי שרירים ומיחושים לא רגילים,** אשר נמשכים זמן רב יותר מהמצופה. כמו עם סטטינים אחרים, מספר מצומצם של מטופלים חוו השפעה לא נעימה בשרירים, ולעיתים נדירות תופעה זו הופכת לנזק בשרירים שעלול לסכן חיים והידוע רבדומיוליזיס (rhabdomyolysis).
- יש לך קרע בשריר.**
- יש לך תסמונת דמוית זאבת** (lupus-like disease syndrome), כולל פריחה, הפרעות במפרקים והשפעה על תאי הדם).

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100 משתמשים):

- כאבי ראש.
- כאבי בטן.
- עצירות.
- הרגשת חולי.
- כאב שרירים.
- חולשה.
- סחרחורת.
- עלייה בכמות החלבון בשתן – בדרך כלל חוזרת לנורמה ללא צורך להפסיק ליטול את התרופה (רק עבור רוזובסטטין טבע חדש 40 מ"ג).

- סוכרת. הסיכון לפתח סוכרת סביר יותר אם יש לך רמות גבוהות של שומנים וסוכר בדם, עודף משקל ולחץ דם גבוה. עליך להיות במעקב רפואי במשך תקופת הטיפול.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000 משתמשים):

- פריחה בעור.
- גרד או תגובות עוריות אחרות.
- עלייה בכמות החלבון בשתן – בדרך כלל חוזרת לנורמה ללא צורך להפסיק ליטול את התרופה (רק עבור רוזובסטטין טבע חדש 5 מ"ג, 10 מ"ג ו-20 מ"ג).
- תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000 משתמשים):**
- תגובה אלרגית חמורה שסימניה כוללים: נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון ו/או הגרון, קושי בבליעה ובנשימה, גרד חמור בעור (עם שלפוחיות מורמות).
- אלרגית, הפסק לקחת רוזובסטטין טבע חדש** ופנה מיד לעזרה רפואית.
- נפיעה בשריר במבוגרים – **ליתר ביטחון, הפסק לקחת רוזובסטטין טבע חדש ודבר עם הרופא שלך מיד אם אתה חש במיחושים או כאב בשרירים לא רגילים** (המינון הגבוה ביותר – 40 מ"ג).
- כאב בטן חמור (דלקת בלבלב).
- עלייה באנזימי כבד בדם.
- דיומם או נטייה מוגברת לחבלות בשל רמות נמוכות של טסיות דם.
- תסמונת דמוית זאבת (lupus-like disease syndrome), כולל פריחה, הפרעות במפרקים והשפעה על תאי הדם).

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות משתמש אחד מתוך 10,000 משתמשים):

- צהבת (צהבת העור והעיניים).
- דלקת כבכד (הפטיטיס).
- עקבות דם בשתן.
- נקל לעצבים בזרועות וברגליים (כגון חוסר תחושה או תחושת נימול).
- כאבי פרקים.
- אובדן זיכרון.
- הגדלת החזה בגברים (gynecomastia).

תופעות לוואי ששכיחות אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- שלשול.
- שיעול.
- קוצר נשימה.
- בצקת (נפיחות עקב הצטברות נוזלים).
- הפרעות בשינה, כולל נדודי שינה וסיוטים.
- בעיות בתפקוד המיני.
- דיכאון.
- בעיות נשימה כולל שיעול מתמיד ו/או קוצר נשימה או חום.
- פציעה בגיד.
- חולשת שרירים קבועה.
- פריחה שעלולה להופיע על העור או פצעים בפה (תגובה ליכנואידית לתרופה).
- מיאסטיניה גריבס (Myasthenia gravis), מחלה הגורמת לחולשת שרירים כללית, הכוללת במקרים מסוימים חולשה בשרירים המעורבים בנשימה).
- מיאסטיניה אוטולית (מחלה הגורמת לחולשה בשרירי העין).
- היוועץ ברופא שלך אם אתה חווה חולשה בזרועות או ברגליים אשר מתמירה לאחר תקופות של פעילות, ראייה כפולה או שמירה של העפעפים, קושי בבליעה או קוצר נשימה.

תופעות לוואי הקשורות לשרירים

מחקר שסקר תוצאות משולבות ממספר ניסויים קליניים מצא כי סטטינים יכולים לעיתים לגרום לעלייה קלה בתסמינים קלים בשרירים במהלך שנת הטיפול הראשונה. המחקר גם הראה כי הסבירות לאירוע ראשון של תסמיני כאבי שרירים או חולשת שרירים, גבוהה יותר בטיפול סטטיני אנטיסטיבי בהשוואה לטיפול סטטיני מתון/פחות אנטיסטיבי. עם זאת, בלמעלה מ-90% מהמקרים, התסמינים הקשורים לשרירים שדווחו לא נגרמו על ידי הסטטין עצמו.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על