עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

הרופא המטפל יקבע מינון מתאים לילדים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בפרזיזומב/פרזיזומב פורטה סקר לדרוש את אחד המצבים הבאים לדווח לרופא:

- הופעת חום, נקישות שריריים או רעד, שינויים במעבר השתן כגון בלבול, אי-שקט או בעיות בשתן או בצואה. ייתכן כי אתה סובל מתסמונת סרוטונין³ או מתסמונת נוירולפטית ממארכת⁴. אף על פי שתסמונת סרוטונין³ או מתסמונת נוירולפטית ממארכת⁴ עלולות להתרחש בעת שימוש בתרופות לעיתים נדירות, רופא עלול להזהיר לפני מתן התרופה.
- לחלים מסכי מוח. **פנה לרופא מיידי** מאחר שייתכן כי יש צורך בהפסקת הטיפול **בפרזיזומב/פרזיזומב פורטה**.
- אם אתה עומד להיבעבר. אם אתה סובל מאירוע מוחי, פנה לרופא באופן מיידי מאחר שייתכן כי יש צורך בהפסקת הטיפול **בפרזיזומב/פרזיזומב פורטה**.

אין להשתמש בפרזיזומב/פרזיזומב פורטה אם אתה רגיש (אלרגי) לפלואוקסטין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים שמכילה התרופה (המפורטים בסעיף 6 "מידע נוסף"). **אם אתה מקבל תרופה אחרת או תרופות אחרות (כגון בדד, ניקוטין ומשתנים או בפנים או קרבי נשימה), הפסק את נטילת התכשירים ולא ידוע לגבי לרופא באופן מיידי.**

- אתה נוטל תרופות אחרות הידועות כמעכבי מונואמין אוקסידאז (MAOIs) כגון פרזיזומב, מרבי מעכבי מונואמין אוקסידאז (MAOIs) (למשל, אירוניאזיד) המשמש לטיפול בדיכאון, מאחר שעלולות להתרחש תגובות חמורות (תסמונת נאף קטלנית).
- יש להתחיל בטיפול **בפרזיזומב/פרזיזומב פורטה** אך ורק לאחלף לפלואוקסטין (הידוע כפרוזאק) 5 שבועות לפחות לאחר הפסקת טיפול ב-MAOIs.
- אתה נוטל תרופות מסוימות לטיפול בהפרעות נפשיות