

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ורזניו 50 מ"ג

טבליות מצופות

החומר הפעיל וכמותו:

כל טבליה מכילה:

אבמציקליב 50 מ"ג

abemaciclib 50 mg

ורזניו 100 מ"ג

טבליות מצופות

החומר הפעיל וכמותו:

כל טבליה מכילה:

אבמציקליב 100 מ"ג

abemaciclib 100 mg

ורזניו 150 מ"ג

טבליות מצופות

החומר הפעיל וכמותו:

כל טבליה מכילה:

אבמציקליב 150 מ"ג

abemaciclib 150 mg

ורזניו 200 מ"ג

טבליות מצופות

החומר הפעיל וכמותו:

כל טבליה מכילה:

אבמציקליב 200 מ"ג

abemaciclib 200 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?**סרטן שד מוקדם**

- ורזניו, בשילוב עם טיפול אנדוקריני, מיועדת כטיפול משלים במבוגרים עם סרטן שד מוקדם חיובי ל-HR (hormone receptor positive) ושלילי ל-HER2 (human epidermal growth factor receptor 2), עם קשירות לימפה חיוביות וסיכון גבוה להישנות המחלה.

אצל נשים לפני גיל המעבר או סביב גיל המעבר ובגברים, יש לשלב טיפול אנדוקריני במעכב ארומטאז יחד עם אגוניסט להורמון משחרר הורמון הצהבה (LHRH) agonist (luteinizing hormone-releasing hormone).

סרטן שד מתקדם או גרורתי

- ורזניו, בשילוב עם תרופה מסוג מעכב ארומטאז לא סטרואידלי (non-steroidal aromatase inhibitor), מיועדת לטיפול במבוגרים עם סרטן שד מתקדם או גרורתי, חיובי ל-HR (hormone receptor positive) ושלילי ל-HER2 (human epidermal growth factor receptor 2), כטיפול אנדוקריני ראשוני.
- ורזניו, בשילוב עם פולבסטרנט (fulvestrant), מיועדת לטיפול במבוגרים עם סרטן שד מתקדם או גרורתי, חיובי ל-HR (hormone receptor positive) ושלילי ל-HER2 (human epidermal growth factor receptor 2), שמחלתם התקדמה לאחר טיפול אנדוקריני.
- ורזניו, כטיפול יחיד, מיועדת לטיפול במטופלים מבוגרים עם סרטן שד מתקדם או גרורתי, חיובי ל-HR (hormone receptor positive) ושלילי ל-HER2, שמחלתם התקדמה לאחר טיפול אנדוקריני במחלה גרורתית וכן כימותרפיה כטיפול במחלה גרורתית הכוללת טקסן כטיפול משלים או גרורתי. אין לטפל בורזניו במבוגרים שטופלו בעבר במעכבי האנזים קינאז תלויי ציקלין 4 ו-6 (CDK4, CDK6).

קבוצה תרופוטית: מעכב האנזים קינאז תלוי-ציקלין (cyclin-dependent kinase inhibitor).

כאשר מטפלים בורזניו בשילוב עם פולבסטרנט או טאמוקסיפן או במעכבי ארומטאז יש לקרוא גם את העלון לצרכן של התרופה שנרשמה לך, אם קיים. שאל את הרופא אם אינך בטוח.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (אבמציקליב) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשימת המרכיבים הבלתי פעילים ראה סעיף 6.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בורזניו ספר לרופא על כל המצבים הרפואיים שלך, כולל אם:

- יש לך חום, צמרמורות, או סימנים אחרים כלשהם לזיהום.
- יש לך היסטוריה של קרישי דם בוורידים.
- יש לך בעיות ריאתיות או בעיות בנשימה.
- יש לך בעיות בכבד או בכליות.

אזהרות נוספות:

- **שלשול.** שלשול הוא תופעת לוואי שכיחה בעת הטיפול בורזניו ועלול לעיתים להיות חמור. השלשול עלול להוביל לאובדן כמויות גדולות של נוזלים ומלחים, דבר הגורם לך לפתח התייבשות. הזמן השכיח ביותר להתפתחות שלשול הוא במהלך החודש הראשון לטיפול בורזניו.
- **ספירות נמוכות של תאי דם לבנים (נויטרופניה).** ספירות נמוכות של תאי דם לבנים הינן שכיחות במהלך הטיפול עם ורזניו והן עלולות לגרום לזיהומים חמורים היכולים להוביל למוות. על הרופא לבדוק את ספירות תאי הדם הלבנים שלך לפני ובמהלך הטיפול.
- **בעיות ריאתיות.** ורזניו עלולה לגרום לדלקת ריאות חמורה או מסכנת חיים במהלך הטיפול, שיכולה להוביל למוות.
- **בעיות בכבד.** ורזניו יכולה לגרום לבעיות כבד חמורות. על הרופא לבצע בדיקות דם כדי לבדוק את הכבד לפני ובמהלך הטיפול עם ורזניו.
- **קרישי דם בוורידים או בעורקי הריאות.** ורזניו עלולה לגרום לקרישי דם חמורים שהובילו למוות.
- ורזניו עלולה לגרום לקרישי דם בעורקים במטופלים המקבלים גם טיפולים הורמונליים.
- **עלייה בקריאטנין בדם ללא השפעה על תפקוד הכליות.** ורזניו עלולה לגרום לעלייה ברמת הקריאטנין בדם. עלייה זו עלולה להופיע במהלך 28 הימים הראשונים של הטיפול, להימשך במהלך הטיפול והינה הפיכה לאחר הפסקת הטיפול.
- העלייה ברמת הקריאטנין אינה נמצאה קשורה לשינויים בתפקוד הסינון של הכליות.

למידע נוסף ראה סעיף 4 "תופעות לוואי".

ילדים ומתבגרים

בטיחות ויעילות התרופה בילדים אינן ידועות.

בדיקות ומעקב

- על הרופא לבדוק את ספירת תאי הדם הלבנים שלך לפני ובמהלך הטיפול.
- על הרופא לערוך לך בדיקות דם כדי לבדוק את הכבד לפני ובמהלך הטיפול עם ורזניו.
- נשים אשר מסוגלות להיכנס להיריון: הרופא יערוך לך בדיקת היריון לפני שתתחילי את הטיפול עם ורזניו.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

ורזניו עלולה להשפיע על אופן הפעולה של תרופות אחרות ותרופות אחרות עלולות להשפיע על אופן הפעולה של ורזניו ולגרום לתופעות לוואי חמורות. במיוחד ספר לרופא אם אתה לוקח:

- **מעכבים בינוניים וחזקים של אנזימי CYP3A:** תרופות אלו מגדילות את החשיפה לורזניו ועלולות להוביל לרעילות יתר. ייתכן שהרופא ינטר תופעות לוואי ובמידת הצורך יפחית את המינון של ורזניו.

- **קטוקונאזול** – יש להימנע מנטילת קטוקונאזול במהלך הטיפול עם ורזניו. ספר לרופא אם אתה נוטל תרופה המכילה קטוקונאזול.
- **מזרזים חזקים או בינוניים של אנזימי CYP3A** מורידים את רמות ורזניו בדם ועלולים להוביל לפעילות מופחתת של ורזניו. יש להימנע מלקיחת מזרזים חזקים או בינוניים של אנזימי CYP3A במהלך הטיפול עם ורזניו.
- ← הכר את התרופות שהינך נוטל. שמור רשימה של תרופות אלו על מנת שתוכל להראות לרופא או לרוקח כאשר אתה מקבל תרופה חדשה.

שימוש בתרופה ומזון

יש ליטול את ורזניו עם או ללא מזון. יש להימנע מאשכוליות וממוצרים המכילים אשכוליות במהלך הטיפול עם ורזניו. אשכוליות עלולות להעלות את כמות ורזניו בדמך.

היריון, הנקה ופוריות

אם את בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון, מיניקה או מתכננת להניק, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה. ורזניו יכולה להזיק לעובר שלך.

● היריון

נשים אשר מסוגלות להיכנס להיריון:

- הרופא יערוך לך בדיקת היריון לפני שתתחילי את הטיפול בורזניו.
- יש להשתמש באמצעי מניעת היריון יעילים במהלך הטיפול עם ורזניו, ובמשך 3 שבועות לאחר המנה האחרונה של ורזניו.
- אם את נוטלת ורזניו בשילוב עם תרופה אחרת, הרופא יאמר למשך כמה זמן עלייך להשתמש באמצעי מניעת היריון.
- יידעי מייד את הרופא אם נכנסת להיריון או שאת חושבת שאת עשויה להיות בהיריון במהלך הטיפול בורזניו.

● הנקה

לא ידוע אם ורזניו עוברת לחלב האם שלך. אין להניק במהלך הטיפול בורזניו ולפחות 3 שבועות לאחר המנה האחרונה של ורזניו. אם את נוטלת ורזניו בשילוב עם תרופה אחרת, הרופא יאמר לך למשך כמה זמן עלייך לא להניק.

● פוריות

בהתבסס על מחקרים בחיות מעבדה, ורזניו עלולה לגרום לבעיות פוריות בגברים. דבר זה עלול להשפיע על יכולתך להביא ילד לעולם. שוחח עם הרופא אם הדבר מדאיג אותך.

נהיגה ושימוש במכוונות

ורזניו יכולה לגרום לסחרחורת. אין לנהוג או להפעיל מכוונות לפני שאתה יודע איך התכשיר משפיע עליך.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

ורזניו מכילה לקטוז

מטופלים שיש להם אי סבילות ללקטוז צריכים לשים לב שטבילות ורזניו מכילות לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא כי יש לך אי סבילות לסוכרים כלשהם, פנה לרופא לפני נטילת תרופה זו.

ורזניו מכילה נתרן

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בטבליה, כלומר למעשה היא נחשבת "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד. ייתכן שהרופא ישנה את המינון שלך במידת הצורך.

יש לקחת את מנות הורזניו שלך בערך באותה השעה בכל יום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה: יש לבלוע את טבליות ורזניו בשלמותן. אין ללעוס, לרסק, או לחצות את הטבליות לפני בליעתן. אין לקחת טבליות ורזניו אם הן שבורות, סדוקות או פגומות.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית-חולים, והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש או שהקאת, אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על מנה שנשכחה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה או לשנות את המינון ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בורזניו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

ורזניו עלולה לגרום לתופעות לוואי חמורות הכוללות:

- **שלשול.** שלשול הוא תופעת לוואי שכיחה בעת הטיפול בורזניו ועלול לעיתים להיות חמור. השלשול עלול להוביל לאובדן כמויות גדולות של נוזלים ומלחים, דבר הגורם לך לפתח התייבשות.
← **אם מתפתחות אצלך יציאות רכות כלשהן,** התחל לקחת תרופה נגד שלשול (כגון לופרמיד), שתה יותר נוזלים, וספר מייד לרופא.
- **ספירות נמוכות של תאי דם לבנים (נויטרופניה)** הינן שכיחות במהלך הטיפול עם ורזניו והן עלולות לגרום לזיהומים חמורים היכולים להוביל למוות.
← **ספר לרופא מייד אם אתה מפתח סימנים או תסמינים של זיהום, כגון חום וצמרמורות.**
- **בעיות ריאתיות.** ורזניו עלולה לגרום לדלקת ריאות חמורה או מסכנת חיים שיכולה להוביל למוות.
← **ספר לרופא מייד אם אתה מפתח סימנים או תסמינים חדשים או מחמירים כלשהם, הכוללים:**
 - הפרעות נשימה או קוצר נשימה,
 - שיעול עם או בלי ליחה,
 - כאב בחזה.
- **בעיות כבד.** ורזניו עלולה לגרום לבעיות חמורות בכבד.
← **ספר לרופא מייד אם אתה מפתח סימנים ותסמינים של בעיות כבד, כגון:**
 - תחושת עייפות מוגברת,
 - כאב בצד הימני העליון של אזור הבטן,
 - אובדן תיאבון,
 - דימומים או חבורות המופיעים בקלות רבה יותר מהרגיל.
- **קרישי דם בוורידים, או בעורקי הריאות.** ורזניו עלולה לגרום לקרישי דם חמורים שהובילו למוות.
← **ספר לרופא מייד אם אתה מפתח סימנים או תסמינים של קריש דם, כגון:**
 - כאב או נפיחות בידים או ברגליים,
 - קוצר נשימה,

- כאב בחזה,
- נשימה מהירה,
- קצב לב מהיר.

אם אתה מפתח תופעות לוואי חמורות במהלך הטיפול בורזניו, הרופא עשוי להפחית את המינון שלך, להפסיק באופן זמני, או להפסיק לחלוטין את הטיפול בורזניו.

תופעות לוואי שנצפו במחקרים קליניים

סרטן שד מוקדם

ורזניו בשילוב עם טמוקסיפן או מעכב ארומאטאז

- תופעות הלוואי השכיחות ביותר של ורזניו בשילוב עם טמוקסיפן או מעכב ארומאטאז, כולל חריגות בבדיקות מעבדה (תופעות המופיעות ביותר מ-20% מהמטופלים): עלייה בקריאטנין בדם, ירידה בנויטרופילים בדם, שלשול, ירידה בהמוגלובין בדם, ירידה בלימפוציטים בדם, זיהומים, עייפות, עלייה באנזים הכבד אלנין אמינוטרנספראז (ALT), ירידה בטסיות בדם, עלייה באנזים הכבד אספרטט אמינוטרנספראז (AST) בדם, בחילה וכאב ראש.
- תופעות לוואי המופיעות ב-10% או יותר, אך בפחות מ-20%, מהמטופלים בורזניו בשילוב עם טמוקסיפן או מעכב ארומאטאז:
 - הפרעות במערכת העיכול: הקאה ודלקת של רירית הפה (סטומטיטיס).
 - הפרעות במערכת העצבים: סחרחורת.
 - הפרעות במטבוליזם ובתזונה: תיאבון מופחת.
 - הפרעות בעור וברקמות תת עוריות: פריחה, התקרחות (אלופציה).
 - חריגות בבדיקות מעבדה: רמת אשלגן נמוכה בדם.
- תופעות לוואי רלוונטיות מבחינה קלינית המופיעות בפחות מ-10% מהמטופלים בורזניו בשילוב עם טמוקסיפן או מעכב ארומאטאז: גרד, בעיות בעיכול (דיספפסיה), פגיעה בציפורניים, ייצור יתר של דמעות, הפרעה בחוש הטעם (דיסגוזיה), מחלת ריאות אינטרסטיציאלית (ILD – interstitial lung disease) / דלקת ריאות (pneumonitis), אירועי פקקת ורידים תסחיפית (VTEs- Venous thromboembolic events).

סרטן שד מתקדם או גרורתי

ורזניו בשילוב עם מעכב ארומאטאז לא סטרואידלי

- תופעות הלוואי השכיחות ביותר של ורזניו בשילוב עם מעכב ארומאטאז לא סטרואידלי, כולל חריגות בבדיקות מעבדה (תופעות שמופיעות ב-20% או יותר מהמטופלים): עלייה בקריאטנין בדם, ירידה בהמוגלובין בדם, שלשול, ירידה בנויטרופילים בדם, ירידה בלימפוציטים בדם, עלייה באנזים הכבד ALT בדם, עייפות, זיהומים, בחילה, עלייה באנזים הכבד AST בדם, ירידה בטסיות בדם, כאב בטן, הקאה, התקרחות (אלופציה) ותיאבון מופחת.
- תופעות לוואי שהופיעו ב-10% או יותר, אך בפחות מ-20%, מהמטופלים בורזניו בשילוב עם מעכב ארומאטאז לא סטרואידלי:
 - הפרעות במערכת העיכול: עצירות.
 - הפרעות כלליות: תסמינים דמויי שפעת.
 - הפרעות בעור וברקמות תת עוריות: פריחה, גרד.
 - הפרעות בדרכי הנשימה ובחלל בית החזה: שיעול, קוצר נשימה.
 - הפרעות במערכת העצבים: סחרחורת.

- **ממצאים בבדיקות: ירידה במשקל.**

- **תופעות לוואי רלוונטיות מבחינה קלינית שהופיעו בפחות מ-10% מהמטופלים בורזניו בשילוב עם מעבב ארומאטאז לא סטרואידלי:** אירועי פקקת ורידים תסחיפית (VTEs- Venous thromboembolic events).
- **תופעות הלוואי השכיחות ביותר של ורזניו בשילוב עם פולבסטרנט, כולל חריגות בבדיקות מעבדה (תופעות שמופיעות ב-20% או יותר מהמטופלים):** עלייה בקריאטנין בדם, ירידה בנויטרופילים בדם, שלשול, ירידה בהמוגלובין בדם, ירידה בלימפוציטים, ירידה בטסיות בדם, עייפות, בחילה, זיהומים, עלייה באנזים הכבד ALT בדם, עלייה באנזים הכבד AST בדם, כאב בטן, ירידה בתיאבון, הקאה וכאב ראש.
- **תופעות לוואי שהופיעו ב-10% או יותר, אך בפחות מ-20%, מהמטופלים בורזניו בשילוב עם פולבסטרנט:**
 - הפרעות במערכת העיכול: דלקת של רירית הפה (סטומטיטיס).
 - הפרעות כלליות: בצקת היקפית, חום.
 - הפרעות במערכת העצבים: הפרעה בחוש הטעם, סחרחורת.
 - הפרעות בעור וברקמות תת עוריות: התקרחות (אלופציה), גרד, פריחה.
 - הפרעות בדרכי הנשימה וחלל בית החזה: שיעול.
 - ממצאים בבדיקות: ירידה במשקל.
- **תופעות לוואי רלוונטיות מבחינה קלינית שהופיעו בפחות מ-10% מהמטופלים בורזניו בשילוב עם פולבסטרנט:** אירועי פקקת ורידים תסחיפית (VTEs- Venous thromboembolic events).

- **ורזניו כאשר ניתנת כמונתרפיה**

- **תופעות הלוואי השכיחות ביותר של ורזניו כאשר ניתנת כמונתרפיה, כולל חריגות בבדיקות מעבדה (תופעות שמופיעות ב-20% או יותר מהמטופלים):** עלייה בקריאטנין בדם, שלשול, ירידה בנויטרופילים, ירידה בהמוגלובין בדם, עייפות, בחילה, ירידה בתיאבון, ירידה בלימפוציטים בדם, ירידה בטסיות בדם, כאב בטן, הקאה, זיהומים, עלייה באנזים הכבד ALT בדם, עלייה באנזים הכבד AST בדם, וכאב ראש.
- **תופעות לוואי שהופיעו ב-10% או יותר, אך בפחות מ-20%, מהמטופלים בורזניו כאשר ניתנת כמונתרפיה:**
 - הפרעות במערכת העיכול: עצירות, יובש בפה, דלקת רירית הפה (סטומטיטיס).
 - הפרעות כלליות: חום.
 - הפרעות במטבוליזם ובתזונה: התייבשות.
 - הפרעות במערכת העצבים: הפרעה בחוש הטעם, סחרחורת.
 - הפרעות בדרכי הנשימה וחלל בית החזה: שיעול.
 - הפרעות ברקמות השלד והשריר: כאב במפרק (ארטרלגיה).
 - הפרעות עור ורקמות תת עוריות: התקרחות (אלופציה).
 - ממצאים בבדיקות: ירידה במשקל.
- **תופעות לוואי שנצפו לאחר השיווק בשכיחות לא ידועה:**
 - הפרעות במערכת הנשימה: מחלת ריאות אינטרסטיציאלית (ILD – interstitial lung disease) /דלקת ריאות (pneumonitis).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il), המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://reportsideeffect.health.gov.il/drugs/home>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל-30°C.
- יש לאחסן באריזה המקורית.
- אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

microcrystalline cellulose 102, microcrystalline cellulose 101, lactose monohydrate (lactose hydrate), croscarmellose sodium, sodium stearyl fumarate, silicon dioxide (silica, colloidal hydrated; hydrated silicon dioxide).

200 mg:

color mixture: polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol 4000/PEG MW 3350, talc, iron oxide yellow, iron oxide red.

150 mg:

color mixture: polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol 4000/PEG MW 3350, talc, iron oxide yellow.

100 mg:

color mixture: polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol 4000/PEG MW 3350, talc.

50 mg:

color mixture: polyvinyl alcohol, titanium dioxide, macrogol 4000/PEG MW 3350, talc, iron oxide yellow, iron oxide red.

כל טבליה של ורזניו 50 מ"ג מכילה 0.7 מ"ג נתרן ו-14 מ"ג לקטוז (כמונהידראט).

כל טבליה של ורזניו 100 מ"ג מכילה 1.4 מ"ג נתרן ו-28 מ"ג לקטוז (כמונהידראט).

כל טבליה של ורזניו 150 מ"ג מכילה 2.0 מ"ג נתרן ו-42 מ"ג לקטוז (כמונהידראט).

כל טבליה של ורזניו 200 מ"ג מכילה 2.7 מ"ג נתרן ו-56 מ"ג לקטוז (כמונהידראט).

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

ורזניו 50 מ"ג:

טבליה בצורת אליפסה בצבע בז', עם הטבעה של "Lilly" בצידה האחד ו-"50" בצידה האחר. כל אריזה מכילה 14 טבליות במגשית (בליסטר).

ורזניו 100 מ"ג:

טבליה בצורת אליפסה בצבע לבן עד כמעט לבן, עם הטבעה של "Lilly" בצידה האחד ו-"100" בצידה האחר. כל אריזה מכילה 14 טבליות במגשית (בליסטר).

ורזניו 150 מ"ג:

טבליה בצורת אליפסה בצבע צהוב, עם הטבעה של "Lilly" בצידה האחד ו-"150" בצידה האחר. כל אריזה מכילה 14 טבליות במגשית (בליסטר).

ורזניו 200 מ"ג:

טבליה בצורת אליפסה בצבע בז', עם הטבעה של "Lilly" בצידה האחד ו-"200" בצידה האחר. כל אריזה מכילה 14 טבליות במגשית (בליסטר).

שם בעל הרישום וכתובתו:

אלי לילי ישראל בע"מ, רחוב השיזף 4, ת.ד. 4246, רעננה 4366411.

שם היצרן וכתובתו:

Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana (IN) 46285, USA

נערך באוקטובר 2026.

מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

ורזניו 50 מ"ג: 161-43-35390-00

ורזניו 100 מ"ג: 161-44-35391-00

ורזניו 150 מ"ג: 161-45-35392-00

ורזניו 200 מ"ג: 161-46-35393-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.