

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

רטבמו 40 מ"ג טבליות

רטבמו 80 מ"ג טבליות

רטבמו 120 מ"ג טבליות

רטבמו 160 מ"ג טבליות

טבליות מצופות

החומר הפעיל וכמותו:

כל טבליה מצופה של רטבמו 40 מ"ג טבליות מכילה 40 מ"ג סלפרקאטיניב (selpercatinib 40 mg)
 כל טבליה מצופה של רטבמו 80 מ"ג טבליות מכילה 80 מ"ג סלפרקאטיניב (selpercatinib 80 mg)
 כל טבליה מצופה של רטבמו 120 מ"ג טבליות מכילה 120 מ"ג סלפרקאטיניב (selpercatinib 120 mg)
 כל טבליה מצופה של רטבמו 160 מ"ג טבליות מכילה 160 מ"ג סלפרקאטיניב (selpercatinib 160 mg)
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
 תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

רטבמו משמשת לטיפול בסוגי סרטן מסוימים הנגרמים על ידי מופעים חריגים של גנים מסוג RET ומיועדת:

- לטיפול במבוגרים שיש להם סרטן ריאות גרורתי של תאים שאינם קטנים שהוא חיובי ל-RET Fusion.
- לטיפול במבוגרים ובילדים מגיל שנתיים ומעלה עם סרטן מדולארי של בלוטת התריס (תירואיד); - MTC (medullary thyroid cancer) מתקדם או גרורתי המתווך על ידי מוטציית RET ושזקוקים לטיפול מערכתי.
- לטיפול במבוגרים ובילדים מגיל שנתיים ומעלה עם סרטן בלוטת התריס (תירואיד) מתקדם או גרורתי, חיובי ל-RET-fusion, שזקוקים לטיפול מערכתי ושהם עמידים לטיפול ביוז רדיואקטיבי (אם יש צורך ביוז רדיואקטיבי).
- כטיפול יחיד במבוגרים ובילדים מגיל שנתיים ומעלה עם גידולים סולידיים מתקדמים חיוביים ל-RET Fusion, כאשר אפשרויות הטיפול שאינן מכוונות ל-RET מספקות תועלת קלינית מוגבלת, או שכבר מוצו.

קבוצה תרופוטית: חומרים אנטי-נאופלסטיים ואימונומודולטים, חומרים אנטי-ניאופלסטיים, מעכבי חלבון קינאז.

2. לפני השימוש בתרופה**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (סלפרקאטיניב) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בפרק 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני ובמהלך הטיפול ברטבמו, ספר לרופא אם:

- אתה סובל מבעיות כבד
- אתה סובל מבעיות ריאה או נשימה שאינן סרטן ריאות
- אתה סובל מלחץ דם גבוה
- אתה סובל מבעיות לב, כולל מצב הנקרא הארכת מקטע QT (QT prolongation)
- אתה סובל מבעיות דימום

- אתה מתכנן לעבור ניתוח. עליך להפסיק ליטול רטבמו לפחות 7 ימים לפני הניתוח המתוכנן. ראה פרק 4 "תופעות לוואי"
 - את בהיריון או מתכננת להיכנס להיריון. רטבמו עלולה להזיק לעובר. ראי סעיף "היריון, הנקה ופוריות".
- לפירוט נוסף אודות אזהרות הנוגעות לשימוש בתרופה, ראה פרק 4 "תופעות לוואי".

ילדים ומתבגרים

- התכשיר מיועד לבני שנתיים ומעלה.
- לא ידוע האם רטבמו בטוחה ויעילה כאשר נעשה בה שימוש:
- בילדים מתחת לגיל שנתיים, לטיפול ב:
 - MTC מתקדם או גרורתי הדורש טיפול תרופתי הניתן דרך הפה או בהזרקה.
 - סרטן מתקדם או גרורתי של בלוטת התריס הדורש טיפול תרופתי הניתן דרך הפה או בהזרקה, לאחר שקיבלו טיפול ביוז רדיואקטיבי שלא הועיל או שהפסיק לעבוד.
 - גידולים סולידיים מתקדמים או גרורתיים, אשר החמירו במהלך או לאחר טיפול קודם, או שאין עבורם חלופות טיפוליות משביעות רצון.
 - בילדים לטיפול במצבים אחרים.

בדיקות ומעקב

- הרופא יבצע בדיקות על מנת לוודא כי רטבמו מתאימה עבורך:
- הרופא יבצע בדיקות דם לפני ובמהלך הטיפול ברטבמו כדי לבדוק בעיות בכבד.
 - רטבמו עשויה להשפיע על לחץ הדם שלך. לחץ הדם שלך ימדד לפני ובמהלך הטיפול עם רטבמו.
 - רטבמו עשויה להשפיע על קצב הלב שלך. הרופא יבצע בדיקות לפני ובמהלך הטיפול עם רטבמו כדי לבדוק את פעילות הלב שלך ואת רמות המלחים בגוף (אלקטרוליטים) והורמון מגרה בלוטת התריס (thyroid-stimulating hormone, TSH) בדמך.
 - הרופא יבצע בדיקות דם כדי לבדוק אם יש לך תסמונת פירוק הגידול (Tumor lysis syndrome, TLS).
 - הרופא יבצע בדיקות דם כדי לבדוק את תפקוד בלוטת התריס שלך לפני ובמהלך הטיפול ברטבמו.
 - הרופא יבצע בדיקת היריון לפני שתתחילי טיפול ברטבמו.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. רטבמו עלולה להשפיע על הדרך בה תרופות אחרות פועלות, ותרופות אחרות עלולות להשפיע על פעילות רטבמו, והן עשויות להגביר את הסיכון לתופעות לוואי.

במהלך השימוש ברטבמו, עליך להימנע מנטילת:

- פרע מחורר (היפריקום - St. John's Wort)
 - מעכבי משאבת פרוטונים (PPIs), כגון דקסלנסופרזול, אסומפרזול, לנסופרזול, אומפרזול, פנטופרזול סודיום ורבפרזול
 - חוסמי קולטני היסטמין מסוג H₂, כגון פמוטידין, ניזאטידין וסימטידין
 - נוגדי חומצה שמכילים אלומיניום, מגנזיום, סידן, סימטיקון או תרופות מנטרלות חומציות.
- אם אינך יכול להימנע מנטילת מעכבי משאבת פרוטונים, חוסמי קולטני היסטמין מסוג H₂ או נוגדי חומצה, ראה פרק 3 "כיצד תשתמש בתרופה?" למידע נוסף על נטילת רטבמו יחד עם תרופות אלו.
- הכר את התרופות שאתה נוטל. שמור רשימה שלהן כדי להראות אותה לרופא ולרוקח כאשר אתה מקבל תרופה חדשה.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול רטבמו עם או ללא מזון.

היריון, הנקה ופוריות

היריון

ספרי לרופא אם את בהיריון או שאת מתכננת להכנס להיריון. רטבמו יכולה להזיק לעובר שלך. אין להרות במהלך הטיפול ברטבמו.

נשים שמסוגלות להרות:

- הרופא יבצע בדיקת היריון לפני תחילת הטיפול ברטבמו.
- יש להשתמש באמצעי מניעה יעיל במהלך הטיפול ובמשך **שבוע אחד** לאחר המנה האחרונה של רטבמו.
- שוחחי עם הרופא בנוגע לאמצעי מניעת היריון שעשויים להתאים לך.
- ספרי לרופא מייד אם נכנסת להיריון או אם את חושבת שאת עלולה להיות בהיריון במהלך הטיפול ברטבמו.

גברים שיש להם בנות זוג שמסוגלות להרות:

- יש להשתמש באמצעי מניעה יעיל במהלך הטיפול ברטבמו ובמשך **שבוע אחד** לאחר המנה האחרונה של רטבמו.
- ספר לרופא מייד אם בת זוגך נכנסה להיריון במהלך הטיפול שלך ברטבמו.

הנקה

ספרי לרופא אם את מיניקה או מתכננת להניק. לא ידוע אם רטבמו עוברת לחלב אם. אל תניקי במהלך הטיפול ברטבמו ובמשך שבוע אחד לאחר המנה האחרונה.

פוריות

רטבמו עלולה להשפיע על הפוריות בנשים ובגברים, דבר שעלול להשפיע על יכולתך להביא ילדים. פנה אל הרופא אם נושא זה מדאיג אותך.

נהיגה ושימוש במכונות

עליך לנקוט משנה זהירות בעת נהיגה ושימוש במכונות מכיוון שאתה עלול לחוש עייפות או סחרחורת בעת נטילת רטבמו.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה**רטבמו טבליות מכילה נתרן**

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בטבליה, כלומר למעשה היא נחשבת "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

אם מופיעות אצלך תופעות לוואי, הרופא עשוי לשנות את המינון, או להפסיק באופן זמני או קבוע את הטיפול ברטבמו. אל תשנה את המינון ואל תפסיק ליטול רטבמו אלא אם כן הרופא הורה לך לעשות זאת.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

במתבגרים מגיל 12 ומעלה ומבוגרים – המינון ייקבע לפי משקל הגוף באופן הבא:

משקל גוף פחות מ-50 ק"ג	120 מ"ג פעמיים ביום
משקל גוף 50 ק"ג או יותר	160 מ"ג פעמיים ביום

בילדים מגיל שנתיים ועד גיל 12 – המינון ייקבע לפי שטח הגוף ויילקח פעמיים עד שלוש פעמים ביום, לפי הוראות הרופא.

- בלע את טבליות רטבמו בשלמותן. אל תכתוש ואל תלעס.
- אם אתה נוטל מעכב משאבת פרוטונים (PPIs), כגון דקסלנסופרזול, אסומפרזול, לנסופרזול, אומפרזול, פנטופרזול נתרן ורבפרזול, יש ליטול רטבמו עם מזון.
- אם אתה נוטל חוסם קולטני היסטמין H₂ (כגון פמוטידין, ניזאטידין וסימטידין), יש ליטול רטבמו שעתיים לפני או 10 שעות לאחר נטילת חוסם ה-H₂.

- אם אתה נוטל נוגד חומצה המכיל אלומיניום, מגנזיום, סידן, סימתיקון או תרופות מנטרלות חומציות, יש ליטול רטבמו שעתיים לפני או שעתיים לאחר נטילת נוגד החומצה.
- אם אתה מקיא לאחר נטילת מנה של רטבמו, אין ליטול מנה נוספת. יש ליטול את המנה הבאה של רטבמו במועד המתוכנן.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש ליטול את טבליות רטבמו בשלמותן עם כוס מים. אין ללעוס, לרסק או לחצות את הטבליה לפני הבליעה על מנת להבטיח קבלת המינון הנכון.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול את מנת הרטבמו שהוחמצה, אלא אם כן נותרו יותר מ-6 שעות עד למנה המתוכננת הבאה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברטבמו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

רטבמו יכולה לגרום לתופעות לוואי חמורות, הכוללות:

- **בעיות בכבד.** בעיות בכבד (עלייה באנזימי הכבד) יכולות להתרחש במהלך הטיפול ברטבמו ולעיתים הן עלולות להיות חמורות. הרופא יבצע בדיקות דם לפני ובמהלך הטיפול ברטבמו כדי לבדוק בעיות בכבד. ספר לרופא מייד אם במהלך הטיפול מופיע אצלך אחד מהתסמינים הבאים של בעיות בכבד:
 - הצהבה של העור או של החלק הלבן
 - חוסר תיאבון
 - שבעיניים (צהבת)
 - שתן כהה בצבע "תה"
 - ישנוניות
 - דימום או חבורות
 - כאב בחלק הימני העליון של הבטן

- **בעיות בריאות.** רטבמו יכולה לגרום לדלקת ריאות חמורה או מסכנת חיים במהלך הטיפול, שעלולה להוביל למוות. ספר לרופא מייד אם מופיעים אצלך תסמינים חדשים בריאות או אם חלה החמרה בתסמיני הריאות, כולל:
 - קוצר נשימה
 - שיעול
 - חום

- **לחץ דם גבוה (יתר לחץ דם).** רטבמו יכולה לגרום ללחץ דם גבוה, שלעיתים יכול להיות חמור. עליך לבדוק את לחץ הדם בקביעות במהלך הטיפול ברטבמו. אם אתה מפתח בעיות בלחץ הדם, הרופא עשוי לרשום לך תרופה לטיפול בלחץ דם גבוה. ספר לרופא אם יש לך ערכי לחץ דם גבוהים או אם מופיעים אצלך תסמינים של לחץ דם גבוה, כולל:
 - בלבול
 - סחרחורת

- כאבי ראש
- קוצר נשימה
- כאב בחזה
- **שינויים בקצב הלב (הארכת מקטע QT).** רטבמו יכולה לגרום לקצב לב איטי מאוד, מהיר מאוד או בלתי סדיר. הרופא עשוי לבצע בדיקות לפני ובמהלך הטיפול ברטבמו כדי לבדוק את פעילות לבך, את רמות המלחים בגוף (אלקטרוליטים) ואת רמות ההורמון מגרה בלוטת התריס (thyroid-stimulating hormone, TSH) בדם. ספר לרופא מייד אם מופיע אצלך אחד מהתסמינים הבאים:
 - אובדן הכרה
 - סחרחורת
 - התעלפות
 - שינוי באופן שבו הלב שלך פועם (פלפיטציות, דפיקות לב)
- **בעיות דימום.** רטבמו יכולה לגרום לדימומים שיכולים להיות חמורים ועלולים להוביל למוות. ספר לרופא אם יש לך סימנים כלשהם לדימום במהלך הטיפול ברטבמו, הכוללים:
 - הקאה דמית או אם הקיא שלך נראה כמו משקעי קפה
 - שתן ורוד או חום
 - צואה אדומה או שחורה (נראית כמו זפת)
 - שיעול דמי או שיעול עם קרישי דם
 - דימום חריג או חבורות חריגות בעור
 - דימום וסתי כבד מהרגיל
 - דימום נרתיקי חריג
 - דימומים תכופים מהאף
 - נמנום או קושי להתעורר
 - בלבול
 - כאב ראש
 - שינויים בדיבור
- **תגובות אלרגיות.** רטבמו יכולה לגרום לתגובות אלרגיות, לרבות תגובות עור חמורות, במיוחד במהלך החודש הראשון של הטיפול. ספר לרופא מייד אם מופיעים אצלך חום, פריחה, כאבי שרירים או כאבי מפרקים בכל עת במהלך הטיפול ברטבמו.
- **תסמונת פירוק הגידול (Tumor lysis syndrome, TLS).** TLS נגרמת עקב פירוק מהיר של תאי סרטן. TLS עלולה לגרום לאי-ספיקת כליות, לצורך בטיפול בדיאליזה ולקצב לב בלתי תקין. TLS יכולה להוביל לאשפוז. הרופא עשוי לבצע בדיקות דם כדי לבדוק אם יש לך TLS. עליך להקפיד על שתייה מספקת במהלך הטיפול ברטבמו. ספר לרופא מייד או פנה מייד לקבלת עזרה רפואית דחופה אם אתה מפתח אחד מהתסמינים הבאים במהלך הטיפול ברטבמו:
 - בחילה
 - הקאה
 - חולשה
 - נפיחות
 - קוצר נשימה
 - התכווצויות שרירים
 - פרכוסים
- **סיכון לבעיות בריפוי פצעים.** ייתכן שפצעים לא יחלימו כראוי במהלך הטיפול ברטבמו. ספר לרופא אם אתה מתכנן לעבור ניתוח כלשהו לפני או במהלך הטיפול ברטבמו.
 - עליך להפסיק ליטול רטבמו לפחות 7 ימים לפני ניתוח מתוכנן.
 - הרופא ינחה אותך מתי תוכל להתחיל שוב ליטול רטבמו לאחר הניתוח.
- **רמות נמוכות של הורמון בלוטת התריס בדם (תת-פעילות של בלוטת התריס, hypothyroidism).** הרופא יבצע בדיקות דם כדי לבדוק את תפקוד בלוטת התריס שלך לפני ובמהלך הטיפול ברטבמו. ספר לרופא מייד אם אתה מפתח סימנים או תסמינים של רמות נמוכות של הורמון בלוטת התריס, כולל:
 - עלייה במשקל
 - עייפות שמחמירה או שאינה חולפת
 - תחושת קור
 - עצירות
- **בעיות במפרק הירך (החלקת ראש עצם הירך; slipped capital femoral epiphysis or slipped upper femoral epiphysis) בילדים.** ספר לרופא מייד אם אתה מפתח סימנים ותסמינים של בעיות בירך, הכוללים כאב בירך או בברך או צליעה ללא כאב.

תופעות לוואי נוספות

תופעות הלוואי השכיחות ביותר (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה) של רטבמו במבוגרים עם גידולים סולידיים כוללות:

- כאבי שרירים ועצמות
- נפיחות בזרועות, ברגליים, בכפות הידיים
- ובכפות הרגליים (בצקת)
- שלשול
- עייפות
- יובש בפה
- לחץ דם גבוה
- כאב באיזור הבטן
- פריחה
- בחילה
- עצירות
- שיעול
- כאב ראש
- הקאה
- קוצר נשימה
- דימום

תופעות הלוואי השכיחות ביותר (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה) של רטבמו בילדים מגיל שנתיים ומעלה עם גידולים סולידיים כוללות:

- כאבי שרירים ועצמות
- שלשול
- בחילה
- דימום
- חום
- כאב באיזור הבטן
- כאב ראש
- הקאה
- עייפות
- שיעול
- פריחה
- זיהום בנגיף הקורונה
- זיהום בדרכי הנשימה העליונות
- נפיחות בזרועות, ברגליים, בכפות הידיים
- ובכפות הרגליים (בצקת)

תוצאות בדיקות המעבדה החריגות החמורות השכיחות ביותר עם רטבמו במבוגרים עם גידולים סולידיים כוללות ירידה בספירת תאי הדם הלבנים, עלייה באנזימי כבד, ירידה ברמות הנתרן בדם, ירידה ברמות הסידן בדם וירידה ברמות הפוספאט (זרחן) בדם.

תוצאות בדיקות המעבדה החריגות החמורות השכיחות ביותר עם רטבמו בילדים מגיל שנתיים ומעלה עם גידולים סולידיים כוללות ירידה בספירת תאי הדם הלבנים, ירידה ברמות הסידן בדם, ירידה בספירת תאי הדם האדומים, עלייה באנזימי כבד, ירידה ברמות המגנזיום בדם וירידה ברמות האשלגן בדם.

תופעות לוואי שדווחו לאחר שיווק התרופה:

תופעת הלוואי הבאה זוהתה לאחר אישור רטבמו לשיווק. מאחר שתופעות אלו מדווחות מרצון מתוך אוכלוסייה בגודל לא ידוע, לא תמיד ניתן להעריך את שכיחותן באופן מהימן או לקבוע קשר סיבתי ברור לחשיפה לתרופה.

○ הפרעות בעור וברקמה התת-עורית: תסמונת סטיבנס-ג'ונסון (Stevens-Johnson Syndrome)

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://reportsideeffect.health.gov.il/drugs/home>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי התווית.

תנאי איחסון:

יש לאחסן מתחת ל-30°C.

אין להשליך תרופות לביוב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

microcrystalline cellulose, mannitol, croscarmellose sodium, hydroxypropyl cellulose, sodium stearyl fumarate.

ציפוי הטבליה מכיל:

polyvinyl alcohol, titanium dioxide, polyethylene glycol, talc.

בנוסף, הציפוי של טבליות ה-40 מ"ג, 80 מ"ג וה-120 מ"ג מכיל ferrosioferric oxide והציפוי של טבליות ה-80 מ"ג, 120 מ"ג וה-160 מ"ג מכיל ferric oxide.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

רטבמו 40 מ"ג טבליות הן טבליות אפורות בהירות, מצופות ועגולות שמוטבעות עם הכיתוב "Ret 40" בצד אחד ו-"5340" בצד השני.

רטבמו 80 מ"ג טבליות הן טבליות אדומות-סגולות כהות, מצופות ועגולות שמוטבעות עם הכיתוב "Ret 80" בצד אחד ו-"6082" בצד השני.

רטבמו 120 מ"ג טבליות הן טבליות סגולות בהירות, מצופות ועגולות שמוטבעות עם הכיתוב "Ret 120" בצד אחד ו-"6120" בצד השני.

רטבמו 160 מ"ג טבליות הן טבליות ורודות בהירות, מצופות ועגולות שמוטבעות עם הכיתוב "Ret 160" בצד אחד ו-"5562" בצד השני.

רטבמו 40 מ"ג, 80 מ"ג, 120 מ"ג ו-160 מ"ג טבליות מסופקים בבקבוקים עם פקק קשה-פתיחה לילדים המכילים 60 טבליות.

האריזה מכילה סופח לחות. אין לבלוע או להוציא מהבקבוק. ייתכן שלא כל החוזקים משווקים.

שם בעל הרישום וכתובתו:

אלי לילי ישראל בע"מ, רחוב השיזף 4, ת.ד. 4246, רעננה 4366411

שם היצרן וכתובתו:

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana (IN) 46285, USA

נערך באוקטובר 2026.

מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

רטבמו 40 מ"ג טבליות: 179-75-38203-99

רטבמו 80 מ"ג טבליות: 179-74-38202-99

רטבמו 120 מ"ג טבליות: 179-73-38201-99

רטבמו 160 מ"ג טבליות: 179-72-38200-99

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.