

סטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתייה
Atomoxetine

הוראות שימוש


מדריך לשימוש בסטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתייה, שלב אחר שלב.

בעת השימוש בסטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתייה, יש לקרוא ולמלא בקפידה אחר ההוראות, שלב אחר שלב.



אזהרה: המתאם מהווה סכנת חנק - חלקים קטנים. יש לוודא הכנסה של המתאם במלואו לצוואר הבקבוק טרם השימוש. יש להשתמש בהשגחת מבוגר בלבד.

מדריך לחלקים



חשוב

אין לתת לילדך ליטול את התרופה ללא סיוע.

אין להשתמש בתרופה אם פג תוקפה (בדוק את תאריך התפוגה על התווית).

אין להשתמש בתרופה למשך יותר מ-45 ימים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה. ראה בסעיף השלכה מה יש לעשות עם תרופה שלא בשימוש.

אין לשטוף את מזרק המדידה למתן דרך הפה עם סבון או חומר ניקוי. **אין** להכניס את המזרק למדיח הכלים. אם תעשה זאת, המזרק עלול לא לעבוד כראוי. אנא ראה שלבים נ' עד ע' להנחיות לניקיון.

לא מומלץ לערבב את סטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתייה עם מזון או מים מפני שזה עשוי להשפיע על הטעם או למנוע קבלת מנה מלאה.

סטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתייה גורמת לגירוי בעיניים. **הימנע מנגע עם העיניים.** אם התרופה נכנסה לעין, שטוף את העין מיד עם מים ופנה לרופא. שטוף את הידיים ואת המשטחים שיתכן ובאו במגע עם התרופה בהקדם האפשרי.

שלב 1 - הכנה ראשונית של הבקבוק

לפני השימוש הראשון בלבד, הכנס את המתאם **במלואו** לצוואר הבקבוק. אין לחבר את המזרק למתאם עד שהמתאם הוכנס במלואו לצוואר הבקבוק.

אין לסובב את המתאם.




אזהרה: המתאם מהווה **סכנת חנק** – חלקים קטנים. לשימוש בטוח, יש להכניס את המתאם במלואו לתוך צוואר הבקבוק.

שלב 2 - התכונן

אסוף את הפריטים שתצטרך:

- בקבוק התרופה
- מזרק מדידה למתן דרך הפה



שטוף את ידיך עם סבון ומים.



כתוב את המינון של ילדך כאן:

_____ מ"ל







וודא שאתה משתמש במנה המדויקת שהרופא של ילדך רשם.

אם המינון של ילדך הינו **10 מ"ל או פחות**, תצטרך להשתמש במזרק פעם אחת.


אם המינון של ילדך הינו **יותר מ-10 מ"ל** אך לא יותר מ-20 מ"ל, תצטרך להשתמש באותו המזרק פעמיים.

אם המינון של ילדך הינו **יותר מ-20 מ"ל**, תצטרך להשתמש באותו המזרק 3 פעמים.

שלב 3 - הכן את המנה


<p>לחץ מטה את המכסה תוך כדי סיבוב נגד כיוון השעון. הסר את המכסה מהבקבוק.</p>	
<p>לחץ את הבוכנה עד קצה המזרק.</p>	
<p>הכנס את קצה המזרק לפתח המתאם. וודא כי קצה המזרק הוכנס במלואו למתאם.</p>	
<p>הפוך את הבקבוק והמזרק כלפי מטה.</p>	
<p>החזק את הבקבוק והמזרק ביד אחת. בעזרת היד השנייה, משוך את הבוכנה כלפי מטה כדי לשאוב את כמות התרופה הדרושה לתוך המזרק. וודא שהמזרק מכיל את המנה הדרושה.</p>	
<p>הפוך את הבקבוק חזרה והנח אותו על משטח שטוח. בדוק אם יש כיס אוויר במזרק. אם יש, רוקן את התרופה חזרה לבקבוק וחזור על צעדים ד' עד ח'. כיס אוויר עלול להוביל למנה שגויה.</p>	

הוצא את המזרק מהבקבוק.
אין לגעת בבוכנה.



שלב 4 - תן את התרופה

הכנס את קצה המזרק לתוך פינת הפה של ילדך. הנחה
את ילדך לא לנשוך את המזרק.



לחץ את הבוכנה מטה עד שכל התרופה הועברה לפה
של ילדך.

אין להשפיריץ את התרופה לאחורי הגרון. וודא כי ילדך
בולע את כל התרופה.



אם המינון של ילדך הוא יותר מ-10 מ"ל חזור על
צעדים ד' עד כ' כדי לתת לילדך את יתר המנה.
השתמש באותו מזרק. ראה את טבלת המינון בצד
השני של הדף.

ל

וודא שאתה משתמש במנה המדויקת שהרופא של
ילדך רשם.

שלב 5 - ניקוי

<p>הברג את המכסה חזרה לבקבוק בחוזקה. אין להסיר את המתאם. המכסה ייסגר מעליו.</p>	
<p>מלא כוס במים נקיים. אין לשטוף את מזרק המדידה למתן דרך הפה עם סבון או חומר ניקוי. אין להוציא את הבוכנה ממזרק המדידה למתן דרך הפה. שים את קצה המזרק במים. משוך את הבוכנה כלפי מעלה כדי למלא את המזרק במים.</p>	
<p>לחץ את הבוכנה כלפי מטה ושפוך את המים לתוך הכוס או לכיור.</p>	
<p>נער מים מיותרים מהמזרק. יבש את המזרק עם נייר סופג.</p>	
<p>שטוף את הידיים שלך ושל ילדך בסבון ומים. אין לגעת בעיניים לאחר התעסקות עם סטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתייה. סטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתייה עשויה לגרום לגירוי בעיניים.</p>	

ראה בצד שני של דף זה שאלות נפוצות, טבלת מינון, ומידע חשוב נוסף.

טבלת מינון עבור מנות גדולות מ- 10 מ"ל

השתמש בטבלה זו כדי להבין כיצד לתת לילדך את המנה. מצא את המנה הנכונה בעמודה הראשונה. היוועץ ברופא או ברוקח כיצד לתת לילדך את המנה הנכונה.

שם כמות זו של סטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתייה במזרק בפעם השלישית	שם כמות זו של סטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתייה במזרק בפעם השנייה	שם כמות זו של סטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתייה במזרק בפעם הראשונה	אם זו המנה של ילדך
0	1 מ"ל	10 מ"ל	11 מ"ל
0	2 מ"ל	10 מ"ל	12 מ"ל
0	3 מ"ל	10 מ"ל	13 מ"ל
0	4 מ"ל	10 מ"ל	14 מ"ל
0	5 מ"ל	10 מ"ל	15 מ"ל
0	6 מ"ל	10 מ"ל	16 מ"ל
0	7 מ"ל	10 מ"ל	17 מ"ל
0	8 מ"ל	10 מ"ל	18 מ"ל
0	9 מ"ל	10 מ"ל	19 מ"ל
0	10 מ"ל	10 מ"ל	20 מ"ל
1 מ"ל	10 מ"ל	10 מ"ל	21 מ"ל
2 מ"ל	10 מ"ל	10 מ"ל	22 מ"ל
3 מ"ל	10 מ"ל	10 מ"ל	23 מ"ל
4 מ"ל	10 מ"ל	10 מ"ל	24 מ"ל
5 מ"ל	10 מ"ל	10 מ"ל	25 מ"ל

ש. מה לעשות אם יש כיס אוויר בתוך מזרק המדידה למתן דרך הפה?
ת. אין לתת את התרופה לילדך. כיסי אוויר עשויים להוביל למנה שגויה. רוקן את התרופה חזרה לבקבוק וחזור על שלבים ד' עד ח'.

ש. מה לעשות אם יש במזרק כמות גדולה מדי של תרופה?
ת. השאר את קצה המזרק בתוך הבקבוק. החזק את הבקבוק ישר. לחץ את הבוכנה כלפי מטה עד שהמזרק יכיל את המנה המדויקת.

ש. מה לעשות אם אין מספיק תרופה בתוך המזרק?
ת. השאר את קצה המזרק בתוך הבקבוק. החזק את הבקבוק הפוך. משוך את הבוכנה כלפי מטה עד שהמזרק יכיל את המנה המדויקת.

ש. מה לעשות אם התרופה נכנסה לעין שלי או של ילדי?
ת. שטוף את העין מיד עם מים והתקשר לרופאך. רחץ את ידיך ומשטחים שייתכן ובאו במגע עם התרופה בהקדם האפשרי.

ש. כיצד אני יכול לנסוע עם התרופה?
ת. וודא שיש לך כמות מספקת של סטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתייה לנסיעה כולה. אחסן את הבקבוק בעודו עומד ישר, במקום בטוח ובטמפרטורת החדר.

ש. האם ניתן לערבב את סטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתייה עם מזון או מים לפני שאני נותן אותה לילדי?
ת. לא מומלץ לערבב את סטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתייה עם מזון או מים. זה עלול להשפיע על הטעם של סטרטרה 4 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתייה, או למנוע קבלת מנה מלאה. ניתן לתת לילדך כוס מים לשתות לאחר שהוא שתה את מנת התרופה המלאה.

אחסון

יש לאחסן מתחת ל-30°C.
שמור את הבקבוק והמזרק מחוץ להישג ידם וראייתם של ילדים.

השלכה

אין להשליך תרופות לביוב או לפח האשפה הביתי. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאינן בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמור על הסביבה.

בעל הרישום: אלי לילי ישראל בע"מ, רחוב השיזף 4, ת.ד. 4246, רעננה 4366411.
יצרן: אלי לילי בע"מ, אינדיאנפוליס, אינדיאנה, ארה"ב.

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות ביוני 2017, ועודכן בהתאם להוראות משרד הבריאות במאי 2018.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.