

ستراتيرا 4 ملغ/ملل محلول للشرب
Atomoxetine


تعليمات الاستعمال

مُرشد لاستعمال ستراتيرا 4 ملغ/ملل محلول للشرب، خطوة تلو الأخرى.

عند استعمال ستراتيرا 4 ملغ/ملل محلول للشرب، يجب قراءة واتباع التعليمات بحرص، خطوة تلو الأخرى.

تحذير: يُشكّل المَحْوَلُ خطر احتراق - أجزاء صغيرة. يجب التأكد من إدخال المَحْوَلِ بكامله إلى عنق القارورة قبل الاستعمال. يجب الاستعمال تحت إشراف شخص بالغ فقط.

مُرشد للأجزاء



مهم

يُمنع السماح لطفلك بتناول الدواء بدون مساعدة.

يُمنع استعمال الدواء إذا انتهت صلاحيته (تحقق من تاريخ الصلاحية على المُلمصق).

يُمنع استعمال الدواء لمدة تزيد عن 45 يوم بعد فتح القارورة لأول مرة. أنظر بند التخلص من ماذا يجب أن تفعل بدواء ليس قيد الاستعمال.

يُمنع غسل محقنة القياس للإعطاء من خلال الفم بصابون أو مادة تنظيف. **يُمنع** إدخال المحقنة إلى غسّالة الأواني. إذا فعلت ذلك، قد لا تعمل المحقنة كما ينبغي. أنظر رجاءً الخطوات ن' حتى ع' من تعليمات التنظيف.

لا يوصى بخلط ستراتيرا 4 ملغ/ملل محلول للشرب مع طعام أو ماء لأن ذلك قد يؤثر على الطعم أو يمنع الحصول على جرعة كاملة.

ستراتيرا 4 ملغ/ملل محلول للشرب يؤدي إلى تهيج في العينين. **تجنب ملامسة العينين.** إذا دخل الدواء للعين، اغسل العين فوراً بالماء وتوجه إلى الطبيب. اغسل اليدين والأسطح التي من المحتمل أن تكون قد لامست الدواء في أسرع وقت ممكن.

مرحلة 1 - تحضير أولي للكارورة

قبل الاستعمال لأول مرة فقط، أدخل المحوّل بكامله إلى عنق القارورة. يُمنع وصل المحقنة بالمحوّل إلى أن يتم إدخال المحوّل بكامله إلى عنق القارورة.

يُمنع تدوير المحوّل.




⚠ تحذير: يُشكّل المحوّل خطر اختناق - أجزاء صغيرة. لاستعمال آمن، يجب إدخال المحوّل بكامله إلى داخل عنق القارورة.

مرحلة 2 - جهّز نفسك

اجمع الأغراض التي ستحتاج إليها:

- قارورة الدواء
- محقنة قياس للإعطاء عن طريق الفم



اغسل يديك بالصابون والماء.



أكتب جرعة طفلك هنا:

_____ ملل







تأكد من أنك تستعمل الجرعة الدقيقة التي وصفها الطبيب لطفلك.

إذا كانت جرعة طفلك هي **10 ملل أو أقل**، ستحتاج إلى استعمال المحقنة مرة واحدة.

إذا كانت جرعة طفلك هي **أكثر من 10 ملل** لكن ليس أكثر من 20 ملل، ستحتاج إلى استعمال نفس المحقنة مرتين.

إذا كانت جرعة طفلك هي **أكثر من 20 ملل**، ستحتاج إلى استعمال نفس المحقنة 3 مرّات.

المرحلة 3 - حضّر الجرعة

<p>اضغط الغطاء باتجاه الأسفل مع التدوير عكس اتجاه عقارب الساعة. أزّل الغطاء عن القارورة.</p>	
<p>إضغط المكبس حتى طرف المحقنة.</p>	
<p>أدخّل حافة المحقنة لفتحة المَحْوَل. تأكد من أن طرف المحقنة قد تم إدخاله بأكمله إلى المَحْوَل.</p>	
<p>اقلب القارورة والمحقنة باتجاه الأسفل.</p>	
<p>أمسك القارورة والمحقنة بيد واحدة. بمساعدة اليد الثانية، اسحب المكبس باتجاه الأسفل لسحب كمية الدواء المطلوبة إلى داخل المحقنة. تأكد من أن المحقنة تحتوي على الجرعة المطلوبة.</p>	
<p>اقلب القارورة مجدداً وضعها على سطح مستو. تأكد إذا كان هناك فجوة هواء في المحقنة. إذا وجدت، أفرغ الدواء للقارورة مجدداً وكرّر الخطوات د' حتى ح'. فجوة هواء قد تؤدي إلى جرعة خاطئة.</p>	

أخرج المحقنة من القارورة.
يُمنع لمس المكبس.




مرحلة 4 - أعط الدواء

أدخل طرف المحقنة إلى زاوية فم طفلك. أطلب من طفلك عدم عض المحقنة.



اضغط على المكبس باتجاه الأسفل إلى أن يتم انتقال كل الدواء إلى فم طفلك.

يُمنع بَخ الدواء إلى الجزء الخلفي من الحلق. تأكد من أن طفلك قد بلع كل الدواء.



إذا كانت جرعة طفلك هي **أكثر من 10 ملل**، كرر الخطوات د' حتى ك' من أجل إعطاء طفلك بقية الجرعة. استعمل نفس المحقنة. أنظر إلى جدول الجرعة في الجهة الثانية من الصفحة.

ل

تأكد من أنك تستعمل الجرعة الدقيقة التي وصفها الطبيب لطفلك.

مرحلة 5 - تنظيف

<p>أعد الغطاء مجدداً وقم بلغه بقوة على القارورة.</p> <p>يُمنع إزالة المَحْوَل. سيتم إغلاق الغطاء من فوقه.</p>	
<p>قم بملء كأس بماء نظيفة.</p> <p>يُمنع غسل محقنة القياس للإعطاء عن طريق الغم بصابون أو بمادة تنظيف.</p> <p>يُمنع إخراج المكبس من محقنة القياس للإعطاء عن طريق الغم. ضع طرف المحقنة في الماء. اسحب المكبس باتجاه الأعلى لملء المحقنة بالماء.</p>	
<p>اضغط المكبس باتجاه الأسفل واسكب الماء في الكأس أو في الحوض.</p>	
<p>خُص الماء الزائد من المحقنة.</p> <p>جفف المحقنة بورق ماص.</p>	
<p>اغسل يديك ويدي طفلك بصابون وماء.</p> <p>يُمنع لمس العينين بعد التعامل مع ستراتيرا 4 ملغ/ملل محلول للشرب.</p> <p>ستراتيرا 4 ملغ/ملل محلول للشرب ممكن أن يؤدي إلى تهيج في العينين.</p>	

أنظر في الجهة الثانية من هذه الصفحة، أسئلة شائعة، جدول الجرعة، ومعلومات إضافية مهمة.

جدول الجرعة لجرعات تزيد عن 10 مل

استعمل هذا الجدول لفهم كيفية إعطاء الجرعة لطفلك. جد الجرعة الصحيحة في العمود الأول. استشر الطبيب أو الصيدلي حول كيفية إعطاء الجرعة الصحيحة لطفلك.

ضع هذه الكمية من ستراتيرا 4 ملغ/ملل محلول للشرب في المحقنة في المرّة الثالثة	ضع هذه الكمية من ستراتيرا 4 ملغ/ملل محلول للشرب في المحقنة في المرّة الثانية	ضع هذه الكمية من ستراتيرا 4 ملغ/ملل محلول للشرب في المحقنة في المرّة الأولى	إذا كانت هذه جرعة طفلك
0	1 ملل	10 ملل	11 ملل
0	2 ملل	10 ملل	12 ملل
0	3 ملل	10 ملل	13 ملل
0	4 ملل	10 ملل	14 ملل
0	5 ملل	10 ملل	15 ملل
0	6 ملل	10 ملل	16 ملل
0	7 ملل	10 ملل	17 ملل
0	8 ملل	10 ملل	18 ملل
0	9 ملل	10 ملل	19 ملل
0	10 ملل	10 ملل	20 ملل
1 ملل	10 ملل	10 ملل	21 ملل
2 ملل	10 ملل	10 ملل	22 ملل
3 ملل	10 ملل	10 ملل	23 ملل
4 ملل	10 ملل	10 ملل	24 ملل
5 ملل	10 ملل	10 ملل	25 ملل

أسئلة شائعة

س. ماذا يجب أن أفعل إذا كان هنالك فجوة هواء في محقنة القياس للإعطاء عن طريق الفم؟
ج. يُمنع إعطاء الدواء لطفلك. فجوات الهواء قد تؤدي إلى جرعة خاطئة. أفرغ الدواء للقارورة مجدداً وكرّر الخطوات د' حتى ح'.

س. ماذا يجب أن أفعل إذا كان في المحقنة كمية كبيرة جداً من الدواء؟
ج. أترك طرف المحقنة داخل القارورة. أمسك القارورة بشكل مستقيم. اضغط على المكبس باتجاه الأسفل إلى أن تحوي المحقنة الجرعة الدقيقة.

س. ماذا يجب أن أفعل إذا لم تكن هناك كمية كافية من الدواء داخل المحقنة؟
ج. أترك طرف المحقنة داخل القارورة. أمسك القارورة بشكل مقلوب. اسحب المكبس باتجاه الأسفل إلى أن تحوي المحقنة الجرعة الدقيقة.

س. ماذا يجب أن أفعل إذا دخل الدواء إلى عيني أو عين طفلي؟
ج. اغسل العين فوراً بالماء واتصل بطبيبك. اغسل يديك والأسطح التي يمكن أن تكون قد لامست الدواء بأسرع وقت ممكن.

س. كيف بإمكانني السفر مع الدواء؟
ج. تأكد من أن لديك كمية كافية من ستراتيرا 4 ملغ/ملل محلول للشرب للسفر بأكملها. خزّن القارورة بحيث تكون بصورة عامودية، في مكان آمن ودرجة حرارة الغرفة.

س. هل يمكن خلط ستراتيرا 4 ملغ/ملل محلول للشرب مع طعام أو ماء قبل أن أعطيه لطفلي؟
ج. لا يُوصى بخلط ستراتيرا 4 ملغ/ملل محلول للشرب مع طعام أو ماء. قد يؤثر هذا على طعم ستراتيرا 4 ملغ/ملل محلول للشرب، أو منع تلقي جرعة كاملة. يمكن إعطاء طفلك كأس ماء للشرب بعد أن يشرب جرعة الدواء الكاملة.

التخزين

يجب التخزين تحت درجة حرارة 30°C.
احفظ القارورة والمحقنة بعيداً عن متناول أيدي ورؤية الأطفال.

التخلص من

يُمنع التخلص من الأدوية في المجاري أو في سلة النفايات البيئية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. هذه الوسائل تساعد على الحفاظ على البيئة.

صاحب التسجيل: إيلي ليلي إسرائيل م.ض. شارع هشيراف 4، ص.ب. 4246، رعانا 4366411.
المُنتج: إيلي ليلي إسرائيل م.ض.، إينديانابوليس، إنديانا، الولايات المتحدة.

تم فحص هذه النشرة والتصديق عليها من قبل وزارة الصحة في حزيران 2017، وتم تحديثها بموجب تعليمات وزارة الصحة في أيار 2018.

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.