

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادة (مستحضرات) - ١٩٨٦ يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط.

١١١،١٠٠٪

قطرات للعينين

المادة الفعالة: أولوباتادين هيدروكلورايد ٠.١١١٪

Olopatadine hydrochloride 0.111%
المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية تظهر
في الفقرة ١ - «معلومات إضافية».

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء: انظر الفقرة ٢
«قبل إستعمال الدواء».

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.
تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.
توفرت لديك أسلطة إضافية. راجع الطبيب أو الصيدلي.
وُصف هذا الدواء للأفراد فهو قد يضرهم
حتى ولو بدا لك أن حاليهم الطبيبة مشابهة لحالتك.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

المستحضر مخصص للمنع المؤقت لتهيج العين في
أعقاب إلتهاب ملتحمة العين التحسسي. تأشير هو سوء
في منع تحرر الجزيئات التي تسبب رد الفعل التحسسي
وأيضاً في منع عملها بمسيرة تشكيل الإلتهاب.

الفصيلة العلاجية: من مضادات الهيستامين. مضادات
التحسس.

٢) قبل إستعمال الدواء:

X لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أيبرجي) للمادة الفعالة أولوباتادين
(Olopatadine) أو لكل واحد من المركبات
الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة ١).

- إذا كنت مرضعة.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء
٣) قبل العلاج بـ باتانول، إحكام للطبيب إذا

يجب إزالة العدسات اللاصقة قبل إستعمال باتانول.

٤) الأطفال والمرأهقون:

باتانول غير مخصص للأطفال ما دون عمر ٣ سنين.
لا يجوز إستعمال الدواء لدى أطفال ما دون عمر ٣ سنين
بسبب قلة المعلومات التي ثبتت السلامة والنجاعة
لدى هذه الفئة.

٥) التداخلات الدوائية/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً، أو تناولت
استعمال أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة
طبية وإضافات غذائية، إحكام للطبيب أو الصيدلي عن
ذلك. خاصة إذا كنت تستعمل:

إذا كنت تستعمل نوع آخر من قطرات العينين / أو مرهم
للحين، انتظر ٥ دقائق على الأقل بين كل دواء. يجب
استعمال مرهم العينين في النهاية.

٦) الحمل، الإرضاع والخصوصية:

لا يوصى بإستعمال الدواء في فترة الحمل.
إذا كنت في فترة الحمل أو مرضعة، تعتقين بأنه من
شأنك أن تكوني حامل أو تخططين للحمل، فيجب
استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل إستعمال الدواء.
لا يجوز إستعمال الدواء خلال فترة الإرضاع، إذا كنت مرضعة
استشيري الطبيب قبل بدء العلاج بـ باتانول.

٧) السياقة واستعمال الماكينات:

أنت قد تشعر بتشوش الرؤية قصيرة بعد تنقيط
باتانول في العين. لا يجوز السياقة أو إستعمال الماكينات
حتى زوال تشوش الرؤية.

٨) معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي باتانول على بنزالكونيوم كلورايد
يحتوي هذا المستحضر على ٥،٥ ملغم بنزالكونيوم كلورايد

ـ لا تدع القطارة تلامس العين أو الجفن، المنطقة المحيطة أو
المسطوحات الأخرى. الأمر الذي قد يؤدي لتلوث القطرات المتبقية
في القنية.

ـ يجب تنقيط الدواء داخل الـ "جيب" المتشكل (الصورة ٢).


ـ لا تعرض القنية، فهي قد خطّطت بحيث يتطلب الأمر ضغط
لطيق فقط على قاعدة القنية.

ـ أغمض عينيك بلطف. لا يجوز الوضم. أبقى على العينين
مغلقين لمدة ١ حتى ٢ دقيقة.

ـ بعد إستعمال الدواء، إغسل يديك جيداً وذلك لتنظيفهما
من آثار الدواء.

ـ لا يجوز إستعمال نفس قنية الدواء لدى أكثر من شخص
واحد، وذلك لتجنب تفشي التلوث.

ـ إذا لم تدخل القطارة للعين، فيجب التنقيط ثانية.
ـ إذا توجّب عليك إستعمال القطرات بكلتا العينين، فعاود كافة
الخطوات في العين الثانية.



2



1

إذا إستعملت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر، فإغسل العين جيداً
بالماء الفاتر. لا تعاود التنقيط في العين حتى بلوغ موعد
إستعمال المقدار الدوائي القادم.

إذا إستعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بقع طفل بالخطأ من
الدواء توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى
وأخذ معك علبة الدواء.

إذا نسيت إستعمال هذا الدواء في الوقت المخطط له، فيجب
إستعمال مقدار دوائي حال تذكرك والعودة بعد ذلك للنظام
المقدار الدوائي الصحيح. مع ذلك، إذا اقترب موعد إستعمال

طريقة الإستعمال:
ـ لتجنب حدوث تلوث، لا تدع طرف القنية يلامس أي مسطح (بما
في ذلك العين ذاتها). يجب حفظ القنية محكمة الإغلاق.

ـ من الجائز ألا تكون قنية القطرات مليئة؛ هذا الأمر خصص
للسمام بالسيطرة على وترة التنقيط بشكل أفضل.
ـ كافية إستعمال القطرات: أولاً إغسل يديك ميل رأسك للخلف.
بواسطة السبابية، اسحب الجفن السفلي بإتجاه الأسفل.
لتشكيل ما يشبه "جيب" (الصورة ١).

١) معلومات إضافية

يحتوى الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً:

Sodium chloride, Dibasic sodium phosphate (Anhydrous), Benzalkonium chloride, Hydrochloric acid and/or Sodium hydroxide, Purified water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟

باتانول هو عبارة عن محلول يتوفر ضمن علبة تحتوي على قنينة من الإلستيك ذات غطاء لولبة تحتوي على ٥ مل سائل رائق وعديم اللون حتى أصفر فاتح.

صاحب الامتياز وعنوانه: نوفاريس إسرائيل م.ض.. شارع شاحام ٣٢. بيتح - تكفا.

إسم المنتج وعنوانه:

ALCON LABORATORIES, INC.USA

FORT WORTH, TEXAS 76134, 6201 SOUTH FREEWAY, USA

For Alcon Pharmaceuticals Ltd., Fribourg,
Switzerland. P.O.B 61,
1701 FRIBOURG SWITZERLAND

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٣٥٧٥ - ٨٠٢٧

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه التشريدة ومحتهاها فحص ورخص من قبلها في تاريخ ٢٠١٧ وتم تحريرها بحسب تعليمات وزارة الصحة في تاريخ كانون الثاني ٢٠١٩.

من أجل سهولة وتهيئة القراءة، تمت صياغة هذه التشريدة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

التبلیغ عن اعراض جانبیہ
بالإمكان التبلیغ عن اعراض جانبیہ لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبلیغ عن اعراض جانبیہ عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبیہ. أو عن طريق تصفیح الرابط:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffect>
Medic@moh.gov.il

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تحنيب التسیم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أبدي و مجال رؤية الأطفال وأو الرضع. وذلك لتفادي إصابتهم بالتسیم. لا تسبب التسیم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحیة (exp.date) الذي يظهر على ظهر علبة الكرتون/الملصقة. يشير تاريخ الصلاحیة إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين بدرجة حرارة قدرها ٤ - ٢٥ درجة مئوية.

- بعد الفتح الأولي، بالإمكان الحفظ بدرجة الحرارة الموصى بها لمدة ٤ أسابيع. بعد ذلك، يجب رمي القنینة وإستعمال قنینة جديدة. وذلك لمنع حدوث تلوثات. يجب تدوين تاريخ فتح القنینة على ظهر علبة الكرتون.

- لا يجوز التخلص من الأدوية بواسطة نظام الصرف الصحي أو القماممة المنزلية. إستشر الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعده في الحفاظ على البيئة.

أعراض جانبیہ غير شائعة - (uncommon) أعراض ظهرت لدى ١٠٠ مستعملین من بين ١٠٠٠:
أعراض في العینین:

تشوش الرؤیة. تناقص الرؤیة. رؤیة غير عادیة. إضطراب في القرنیة. إلتهاب على سطح العین مع أو بدون تضرر سطح العین. إلتهاب أو تلوث في الملتحمة. إفراز من العین. حساسیة للضویه. إنتاج زائد للدموع الشعور بحكة في العین. إحمرار العین. شعور غير عادی في الجفن. حکة. إحمرار. إنتفاخ أو تشكل غشاء على سطح الجفن.

أعراض عامة:
شعور غير عادی أو متذمی. دوار. رشح. جفاف في الجلد. إلتهاب في الجلد.

أعراض جانبیہ ذات شیوع غیر معروفة (أعراض لم يحدد شیوعها بعد):
أعراض في العینین:

إنتفاخ العین. إنتفاخ القرنیة. تغير في حجم الحدقة.
أعراض عامة:

ضيق تنفس. تفاقم في أعراض التحسس. إنتفاخ الوجه. نعاس. ضعف عام. غثيان تقیؤات. تلوث في الجيوب الأنفیة. إحمرار وحکة في الجلد.

في حالات نادرة جداً، تطور لدى المتعالجين الذين يعانون من تضرر شدید في القرنیة (الطبقة الشفافة في مقدمة العین) عکر على القرنیة نتيجة تراكم الكلس خلال العلاج.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبیہ أو عندما تعاوی من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

المقدار الدوائي التالي، فيجب تفويت المقدار الدوائي المنسق والعودة لنظام المقدار الدوائي الصحيح عند الإستعمال القائم.

لا يجوز إستعمال مقدارين دوائين سوية للتعويض عن المقدار الدوائي المنسق.
يتوجب عليك إكمال العلاج كما أوصيتك من قبل الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

في حال توقفك عن إستعمال الدواء
لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب.

لا يجوز إستعمال الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء،
إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبیہ:

كما بكل دواء، إن إستعمال باتانول قد يسبب أعراضًا جانبیہ عند بعض المستعملین. لا تندھش من قائمة الأعراض الجانبیہ. من الجائز لا تعاوی أي منها.

للحظ حدوث الأعراض الجانبیہ التالية عند إستعمال باتانول:
أعراض جانبیہ شائعة (common) - أعراض تظهر لدى ١٠٠ مستعملین من بين ١٠٠٠:

أعراض في العینین:
ألم في العین. تهيج في العین. جفاف في العین. شعور غير عادی في العین. إنتفاخ في العین.

أعراض عامة:
صداع. إنهاك. جفاف في الأنف. مذاق سيء في الفم.