

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) -١٩٨٦

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

كوميبيقر

أقراص مطلية ١٥٠ ملغ / ٣٠٠ ملغ

يحتوي كل قرص على: لاميفودين (**lamivudine**) ١٥٠ ملغ و-زيدوفودين (**zidovudine**) ٣٠٠ ملغ.

قائمة المركبات الإضافية مفصلة في الفقرة ٦.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

١) لأي غرض مخصص الدواء؟

كوميبيقر مخصص للعلاج المشترك ضد الفيروسات في تلوث متلازمة الفشل المناعي البشري (HIV).

الفصيلة العلاجية: يحتوي كوميبيقر على مادتين فعالتين تستعملان لعلاج تلوث HIV: لاميفودين وزيدوفودين. هاتين المادتين تنتميان إلى فصيلة الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية المسماة: قرآن النوكليوزيدات المثبطة لترانسكريباز العكسية (NRTIs).

كوميبيقر لا يشفي تماماً من تلوث HIV. هو يقلل نسبة الفيروس بجسمك، ويحافظ عليها بمستوى منخفض. هو يرفع أيضاً تعداد خلايا CD4 الموجودة في دمك. خلايا CD4 هي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تعتبر هامة في مساعدة جسمك على محاربة التلوث. ليس كل شخص يستجيب للعلاج بـكوميبيقر بنفس الشكل. يقوم طبيبك بمراقبة نجاعة علاجك.

٢) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) للمواد الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء، انظر الفقرة ٦.
- لديك **تعداد منخفض جداً لخلايا الدم الحمراء (فقر دم) أو تعداد منخفض جداً لخلايا الدم البيضاء (قلة العدلات).**

← **راجع طبيبك** إذا كنت تعتقد بأن واحد مما ذكر ينطبق عليك.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال هذا الدواء

هناك أشخاص الذين يتناولون كوميبيقر أو علاجات مشتركة أخرى لـ HIV ومعرضون لخطورة زائدة المعاناة من أعراض جانبية جديدة. يجب أن تكون مدركاً لمخاطر إضافية:

- إذا عانيت في الماضي من مرض كبدي، يشمل التهاب الكبد من نوع B أو C (إذا وجد لديك تلوث إلتهاب الكبد من نوع B، فلا تتوقف عن العلاج بـكوميبيقر بدون استشارة طبيبك لأن إلتهاب الكبد قد يعود)
- إذا وجد لديك **مرض كلوي**
- إذا كنت **نو ورن زائد ملحوظ** (بالأخص إذا كنت امرأة)

← **راجع طبيبك إذا كان واحد مما ذكر ينطبق عليك.** يقر طبيبك إذا كانت المواد الفعالة تناسبك. خلال تناولك لدوائك، من الجائز أن تحتاج لفحوص إضافية، بما في ذلك فحوص دم. لمعلومات إضافية، انظر الفقرة ٤.

إنتبه لأعراض هامة

هناك أشخاص الذين يتناولون أدوية لعلاج تلوث HIV ويطورون مشاكل أخرى، التي قد تكون خطيرة. عليك التعرف على علامات وأعراض هامة التي يتوجب عليك الإنتباه إليها أثناء تناولك كوميبيقر.

← **اقرأ المعلومات "أعراض جانبية ممكنة إضافية للعلاج المشترك لتلوث HIV "** في الفقرة ٤ من هذه النشرة.

احم الأشخاص الآخرين

ينتشر تلوث HIV بالاتصال الجنسي مع شخص حامل للتلوث، أو بنقل دم ملوث (مثلاً، عن طريق مشاركة إبر للحقن). لا يزال بإمكانك نقل HIV للآخرين خلال تناولك لهذا الدواء، رغم أن الخطورة تقل بإستعمال علاج ناجع مضاد للفيروسات القهقرية. تحدث مع طبيبك حول وسائل الحذر اللازمة لمنع عدوى أشخاص آخرين.

الأدوية الأخرى وكوميبيقر

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

تذكر إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الخاص بك إذا بدأت تناول دواء جديداً خلال فترة تناولك لـ كوميبيقر.

لا يجوز استعمال الأدوية التالية سوية مع كوميبيقر:

- مستحضرات طبية أخرى الحاوية على لاميفودين، لمعالجة تلوث HIV أو **تلوث إلتهاب الكبد من نوع B**
- إيمتريسيتابين، لعلاج **تلوث HIV**
- ستافودين، لعلاج **تلوث HIV**
- ريافيرين أو حقن چانسيكلوفير، لعلاج **التلوثات الفيروسية**
- جرعات عالية من **كو - تريموكسازول**، مضاد حيوي
- كلادريبين، يستعمل لعلاج **الإبيضاض المُشعرُ الخَلايا (hairy cell leukaemia)**

← **توجه إلى طبيبك** إذا كنت تتعالج بإحدى تلك الأدوية.

هناك أدوية قد تزيد من احتمال حدوث أعراض جانبية لديك، أو تقاوم الأعراض الجانبية.

هذه تشمل:

- صوديوم فالبروات، لعلاج **الصرع**
- إنترفيرون، لعلاج **التلوثات الفيروسية**
- بيريميتامين، لعلاج الملاريا والتلوثات الطفيلية الأخرى
- دايسون، لمنع **التهاب الرتئين** ولعلاج التلوثات الجلدية
- فلوكونازول أو فلويسيتوزين، لعلاج **التلوثات الفطرية** مثل **داء المبيضات**
- پنتاميدين أو أتوفاكون، لعلاج التلوثات الطفيلية مثل *Pneumocystis jirovecii* pneumonia (المسماة غالباً PCP)
- أمفوتيريسين أو كو - تريموكسازول، لعلاج **التلوثات الفطرية والجرثومية**
- برونسيدي، لعلاج **النقرس (gout)** وحالات مشابهة، ويعطى سوية مع مضادات حيوية معينة لزيادة نجاعتها
- ميتادون، يستعمل كبديل **للهروثين**
- فينكريستين، فينبلاستين أو دوكسوروبيسين لعلاج **السرطان**

← **إحك لطبيبك** إذا كنت تتناول إحدى تلك الأدوية.

هناك أدوية تتفاعل مع كوميبيقر

هذه تشمل:

- كلاريتروميسين**، مضاد حيوي

← إذا كنت تتناول كلاريتروميسين، فتناول جرعتك على الأقل ساعتين قبل أو بعد تناول كوميبيقر.

فينيتوثين، لعلاج **الصرع**

← **إحك لطبيبك** إذا كنت تتناول فينيتوثين. من الجائز أن يحتاج طبيبك لمراقبة وضعت أثناء تناولك كوميبيقر.

• أدوية (على الأغالب سائلة) تحتوي **سوربيتول وسكريات كحولية أخرى** (مثل كسيليتول، مانيتول، لاكتيتول، أو مالتيتول)، إذا تم إستعمالها بشكل دائم.

← **إحك لطبيبك أو للصيدلي الخاص بك** إذا كنت تتناول إحدى تلك الأدوية.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

الحمل

إذا كنت في فترة الحمل، إذا أصبحت حامل أو إذا كنت تخططين للحمل، استشري طبيبك حول المخاطر والفوائد من تناول كوميبيقر بالنسبة لك ولرضيعك. إن كوميبيقر وأدوية مشابهة قد تسبب أعراضاً جانبية لدى الأجنة. إذا تناولت كوميبيقر خلال فترة حملك، فمن شأن طبيبك أن يوصي بإجراء فحوص دم إعتيادية وفحوص تشخيصية إضافية لمتابعة تطور طفلك. بالنسبة للأطفال الذين تناولت أمهاتهم أدوية NRTIS أثناء الحمل، فإن فائدة الحماية من HIV فاقت خطورة حدوث أعراض جانبية.

الإرضاع

يجب على النساء الحوامل لـ HIV الإمتناع عن الإرضاع، نظراً لأن تلوث HIV قد ينتقل إلى الرضيع عن طريق حليب الأم. يمكن أيضاً أن تنتقل كمية قليلة من مركبات كوميبيقر إلى حليبك.

إذا كنت مرضعة، أو تفكرين في الإرضاع:

← **راجعي طبيبك فوراً.**

السياقة وإستعمال الماكنات

كوميبيقر قد يسبب لك دوام وأعراض جانبية أخرى التي تجعلك أقل يقظة.

← **لا تقود و لا تشغل ماكنات** إلا إذا كنت تشعر بأن حالتك جيدة.

٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب الإستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

يجب بلع أقراص كوميبيقر مع القليل من الماء، بالإمكان تناول كوميبيقر مع أو بدون طعام.

إذا لم يكن بمقدورك بلع الأقراص بشكلها الكامل، يمكنك تكسيرها، وخلطها مع القليل من طعام أو شراب وتناول كامل المقدار الدوائي على الفور.

يُسمح بتكسير/شطر الأقراص. لا توجد معلومات حول المضغ.

إبقى على اتصال دائم مع طبيبك

كوميبيقر يساعد في السيطرة على حالتك. عليك الإستمرار بتناول الدواء كل يوم وذلك لمنع تقاوم مرضك. من الجائز أنك لا تزال تطور تلوثات ووعكة متعلقة بتلوث HIV.

← **حافظ على تواصل مع طبيبك، ولا تتوقف عن تناول كوميبيقر** بدون استشارة طبيبك.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو:

لل كبار والمراهقين الذين يزنون ٣٠ كغ أو أكثر

المقدار الدوائي الإعتيادي هو قرص واحد، مرتين في اليوم.

تناول الأقراص في أوقات محددة، بفاصل قدره ١٢ ساعة تقريباً بين القرص للآخر.

لأطفال بوزن ٢١-٣٠ كغ

المقدار الدوائي الإبتدائي الإعتيادي من كوميبيقر هو نصف قرص ^(١/٢) الذي يتم تناوله في الصباح وقرص واحد كامل يتم تناوله في المساء.

لأطفال بوزن ١٤-٢١ كغ

المقدار الدوائي الإبتدائي الإعتيادي من كوميبيقر هو نصف قرص ^(١/٢) يتم تناوله في الصباح ونصف قرص ^(١/٢) يتم تناوله في المساء.

للأطفال الذين يزنون أقل من ١٤ كغ، يجب تناول لاميفودين وزيدوفودين (مكونات كوميبيقر) كل على حدة.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به

إذا تناولت بالخطأ مقدار دوائي أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، تناوله لحظة تذكرك بذلك. واصل العلاج كالمعتاد. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة عوضاً عن الجرعة المنسية. يجب المواظبة على العلاج كما أوصيت من قبل الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي، حتى ولو طراً تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة، يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

خلال علاج بـ HIV يمكن أن يحدث إرتفاع في الوزن وفي نسب الشحوم والسكر في الدم. هذا الأمر يتعلق بشكل جزئي بالصحة وينمط الحياة، وفي حالة الشحوم في الدم يتعلق الأمر أحياناً بأدوية الـ HIV ذاتها. يفحص طبيبك هذه التغيرات.

إن العلاج بـ كوميبيقر يسبب في أحيان متقاربة لفقدان الشحوم من الرجلين، من البدن ومن الوجه (ضمور شحمي). هذا الفقدان لشحوم الجسم أثبت بأنه غير عكوس بتاتا بعد التوقف عن زيدوفودين. يتوجب على طبيبك مراقبة علامات لحدوث ضمور شحمي. إحك لطبيبك إذا لاحظت أي فقدان للشحوم من الرجلين، البدن والوجه لديك. عند ظهور هذه العلامات، يجب التوقف عن العلاج بـ كوميبيقر ويتغير العلاج الخاص بك لـ HIV.

كما بكل دواء، إن إستعمال كوميبيقر قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندشه من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها. أثناء علاجك لنتلوث HIV، من الجائز أن يكون من الصعب التمييز فيما إذا كان العرض هو عرض جانبي لـ كوميبيقر أو للأدوية الأخرى التي تتناولها، أو تأثير تلوث HIV ذاته. لذلك من المهم جداً التحدث مع طبيبك عن كل تغير في صحتك.

بالإضافة لقائمة الأعراض الجانبية بالنسبة لـ كوميبيقر المبيئة في سياق النشرة، يمكن لحالات طبية أخرى أن تتطور خلال العلاج المشترك لتلوث HIV.

← من المهم قراءة المعلومات التي تظهر في سياق هذه الفقرة تحت عنوان "أعراض جانبية ممكنة إضافية في العلاج المشترك لتلوث HIV".

أعراض جانبية شائعة جداً

من شأنها أن تظهر لدى أكثر من ١ من كل ١٠ أشخاص:

- صداع
- الشعور بغثيان.

أعراض جانبية شائعة

من شأنها أن تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠ أشخاص:

- تقيؤ
- إسهال
- آلام بطنية
- فقدان الشهية للطعام
- الشعور بدوار
- إرهاق، قلة الحيوية
- سخونة
- شعور عام غير جيد
- صعوبة في النوم (أرق)
- آلم في العضلات وإنزعاج
- آلم في المفاصل
- سعال
- تهيج الأنف أو رشح
- طفح جلدي
- تساقط شعر.

أعراض جانبية شائعة التي قد تظهر في فحوص الدم هي:

- تعداد منخفض لكريات الدم الحمراء (فقر دم) أو تعداد منخفض لكريات الدم البيضاء (قلة العدلات أو قلة الكريات البيض)
- ارتفاع نسب إنزيمات الكبد
- ارتفاع كمية الـ بيليروبين في الدم (مادة تنتج في الكبد) الذي يمكن أن يسبب اصفرار الجلد.

أعراض جانبية غير شائعة

من شأنها أن تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠٠ شخص:

- ضيق تنفس
- غازات (نفخة)
- حكة
- ضعف عضلي.

عرض جانبي غير شائع الذي قد يظهر في فحص الدم:

- تناقص عدد خلايا الدم التي تتدخل في تخثر الدم (*thrombocytopenia*) أو انخفاض بكل أنواع خلايا الدم (*pancytopenia*).

أعراض جانبية نادرة

من شأنها أن تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠٠٠ شخص:

- رد فعل تحسسي خطير يؤدي إلى إنقراض الوجه، اللسان، أو الحنجرة الذي قد يسبب صعوبة في البلع أو في التنفس
- اضطرابات في الكبد، مثل يرقان، تضخم الكبد أو كبد شحمي، التهاب (التهاب الكبد)
- حمض لبني (فائض حمض اللين في الدم: أنظر في السياق بـ "أعراض جانبية ممكنة إضافية في العلاج المشترك لتلوث HIV")
- التهاب البنكرياس (*pancreatitis*)
- آلم في الصدر، إعتلال عضلة القلب (*cardiomyopathy*)
- اختلاجات (تشنجات)
- الشعور بآكتئاب أو قلق، قلة القدرة على التركيز، الشعور بتعاس
- صعوبات هضمية، اضطراب في المذاق
- تغير في لون أظفارك، جلدك أو الجلد بداخل فمك
- شعور شبيه بالإنفلونزا - قشعريرة وتعرق
- شعور بوخز في الجلد (مثل دبائيس وإبر)
- الشعور بضعف في الأطراف
- تفكك نسيج عضلي
- خدر
- التبول بشكل متكرر أكثر
- تضخم الثديين لدى الرجال.

أعراض جانبية نادرة التي يمكن أن تظهر في فحوص الدم:

- ارتفاع إنزيم الأميلاز
- فشل نخاع العظام في إنتاج كريات دم حمراء جديدة (*pure red cell aplasia*).

أعراض جانبية نادرة جداً

من شأنها أن تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠٠٠٠ شخص:

- عرض جانبي نادر جدا الذي يمكن أن يظهر في فحوص الدم:
- فشل نخاع العظام في إنتاج كريات دم حمراء أو بيضاء جديدة (فقر دم لا تنسجي).

إذا تفاقمت إحدى الاعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب أو الصيدلي.

أعراض جانبية ممكنة إضافية للعلاج المشترك لتلوث HIV

إن العلاج المشترك مثل كومبفير قد يسبب تطور حالات طبية أخرى خلال علاج الـ HIV.

تلوثات قديمة قد تحدث

إن الأشخاص الذين يعانون من تلوث HIV متقدم (إيدز) لديهم جهاز مناعي ضعيف، ولديهم ميل أكبر لتطوير تلوثات خطيرة (تلوثات انتهازية). عندما يبدأ هؤلاء الأشخاص علاجاً، فيمكنهم أن يلاحظوا أن تلوثات قديمة ومستترة تحدث وتسبب ظهور علامات وأعراض لتلوث. هذه الأعراض ناتجة على ما يبدو عن زيادة قوة الجهاز المناعي في الجسم، بحيث يبدأ الجسم بمحاربة هذه التلوثات.

بالإضافة للتلوثات الإنتهازية، يمكن أن تظهر أيضاً اضطرابات مناعية ذاتية (حالة تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة نسيج سليم في الجسم) بعد أن بدأت بتناول أدوية لعلاج تلوث الـ HIV لديك. يمكن أن تحدث الاضطرابات المناعية الذاتية بعد عدة أشهر من بدء العلاج. إذا لاحظت أية أعراض لتلوث أو أعراض أخرى مثل ضعف عضلي، ضعف يبدأ في اليدين وراحتي القدمين ويتقدم نحو الأعلى بإتجاه مركز الجسم، ضربات قلب سريعة، رجفان أو فرط نشاط، الرجاء التوجه حالاً إلى طبيبك لتلقي العلاج المطلوب.

إذا كنت تعاني من أعراض لتلوث أثناء تناول كومبفير:

- ➔ توجه حالاً إلى طبيبك. لا تتناول أدوية أخرى ضد التلوث بدون استشارة طبيبك.

الحمض اللبني هو عبارة عن عرض جانبي نادر ولكنه خطير

هناك أشخاص الذين يتناولون كومبفير ويطورون حالة تسمى الحمض اللبني، سوية مع تضخم الكبد.

الحمض اللبني ينتج عن تراكم حمض اللين في الجسم. هذا الأمر نادر؛ وإذا حدث ذلك، فهو يتطور عادة بعد عدة أشهر من العلاج. هذا الأمر يمكن أن يشكل خطراً على الحياة، عن طريق التسبب بفشل لأعضاء داخلية. يتطور الحمض اللبني بشيوع أكبر لدى أشخاص لديهم مرض كبدي أو لدى أشخاص ذوي فرط بدانة (وزن زائد بشكل كبير)، بالأخص لدى النساء.

علامات الحمض اللبني:

- صعوبات في التنفس، تنفس عميق وسريع
- تعاس
- خدر أو ضعف في الأطراف
- غثيان، تقيؤ
- آلم في البطن.

خلال فترة علاجك، يقوم طبيبك بمراقبتك بخصوص تواجد علامات لحمض لبني. إذا وجدت لديك إحدى الأعراض التي ذكرت سابقاً أو أي عرض آخر يقلقك:

- ➔ توجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن.

من الجائز أن تحدث لديك مشاكل في العظام

هناك أشخاص الذين يتعالجون بعلاج مشترك لتلوث HIV ويطورون حالة تسمى *osteonecrosis* (نخر العظام). في هذه الحالة، تموت بعض أجزاء النسيج العظمي جراء انخفاض في تزويد العظم بالدم. من شأن الأشخاص أن تكون لديهم احتمالية أكبر في أن تتطور لديهم هذه الحالة إذا:

- كانوا يتناولون العلاج المشترك لفترة طويلة
- كانوا يتناولون أيضاً أدوية مضادة للإلتهاب المسماة كورتيكوستيروئيدات
- كانوا يشربون الكحول
- كان جهازهم المناعي ضعيف جداً
- كانوا يعانون من زيادة في الوزن.

علامات نخر العظام تشمل:

- تصلب المفاصل
- أوجاع وآلام (بالأخص في الورك، في الركبة أو في الكتف)
- صعوبة في الحركة.

في حال ملاحظتك لإحدى تلك الأعراض:

- ➔ راجع طبيبك.

أعراض أخرى التي يمكن أن تظهر في فحوص الدم

إن العلاج المشترك لتلوث HIV قد يسبب أيضاً لـ:

- ارتفاع نسب حمض اللين في الدم، والذي يمكنه في حالات نادرة أن يؤدي لحمض لبني.

إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبلغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://forms.gov.au/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moh.gov.au>

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم؛ يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/ أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية الى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- عبوة القنبنة: للإستعمال حتى ٣ أشهر من الفتح.
- يجب التخزين بدرجة حرارة دون ٣٠ درجة مئوية.

٦) معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً –

microcrystalline cellulose, sodium starch glycollate, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide, hydroxypropyl methylcellulose, titanium dioxide (E171), polyethylene glycol 400, polysorbate 80

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العلبة –
- كومبفير أقراص مطلية مسوقة ضمن علبه كرتون التي تحوي عبوات لويحة أو قنبنة مع غطاء يصعب فتحه من قبل الأطفال. كل نوع من العبوات يحتوي على ٦٠ قرصاً مطلياً. هي أقراص بلون أبيض مائل للبيج على شكل كبسولة ذات خط للشرط، ومعلمة بالعلامة GXFC3 من كلا الجانبين. من الجائز ألا تسوق كافة أنواع العبوات.
- صاحب الإمتياز: جلاكسو سميكتلاين (اسرائيل) م.ض.، شارع بارزل ٢٥، بيتح – تكفا
- المنتج: جلاكسو سميكتلاين فارماسيو تيكاالس S.A.، بوزنان، بولندا
- أقررت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فُحص ورُخص في تاريخ: تشرين الثاني ٢٠١٦ وتم تحديثها بموجب تعليمات وزارة الصحة في تاريخ آذار ٢٠١٨
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: ٢٩٣٢٨–٣٢–١١٠
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.
- العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات Viiv Healthcare .
- ©2018 مجموعة شركات Viiv Healthcare أو صاحب الإمتياز الخاص بها.