

١,٢٥ ملخ تريتايس  
٢,٥ ملخ تريتايس  
٥ ملخ تريتايس

SANOFI

أقراص

المادة الفعالة:

كل قرص من تريتايس ١,٢٥ mg ملخ يحتوي على: راميبيريل ١,٢٥ mg

كل قرص من تريتايس ٢,٥ mg ملخ يحتوي على: راميبيريل ٢,٥ mg

Ramipril 5 mg

المواد غير الفعالة: أنظر الفقرة ٦.

اقرء النشرة تبعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحتوى هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلمة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي، وصف هذا الدواء على الآخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك حاليهم الطبية مشابهة لحالتك.

(١) لأى غرض مخصوص الدواء؟

الدواء مخصوص بالعاجة ارتقاض ضغط الدم، لتخفيف الخلوة لحدث نوبة قلبية أو سكتة، لتقليل الخطورة لأعاقبة تفاقم مشاكل في الكلى (الدى متلاجئين مع أو بدون مرض السكري)، العاجة قصور القلب، العاجة بعد نوبة قلبية مشتركة مع قصور قبلي.

الخصية العلاجية: خافض لضغط الدم، من فصيلة مثبطات ACE.

(٢) قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء:

\* إذا وجد لديك حساسية مفرطة لراميبيريل أو لمستحضر آخر من فصيلة مثبطات ACE أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة ١). علامات لرد فعل تحسسي يمكن أن تشمل: طفح جلدي، صعوبات في البلع أو التنفس، إرتفاع في الشفتين، في الوجه، في الحجرة أو اللسان.

\* إذا عانيت في الماضي من رد فعل تحسسي خطير المسمى وذمة عانية حيث أن علامات شمل: وخز، شرى (urticaria)، بقع حمراء على اليدين، راحتي القدمين والرقبة، إرتفاع في الحجرة واللسان، إرتفاع حول العينين والشفتين، صعوبات في التنفس والبلع.

\* إذا تناولت في القصور القلبي المزمن لدك تناول حالياً ساكوبيريل/فالسارتان، دواء يستلزم لعلاج نوع من القصور القلبي المزمن (أنظر الفقرة ١).

\* إذا كنت تجري دايابيز أو فلتارنة للدم من نوع آخر، من الجائز أن يكون تريتايس مناسب لك، وذلك مرتبط بنوع الآلة المستعملة.

\* إذا كنت تعاني من مشكلة في الكلى حيث يقل فيها تزويد الكلية بالدم - Renal artery stenosis.

\* خلال أشهر السنة الأخيرة من الحمل (أنطري فقرة «الحمل، الإرasmus والخصوبة»).

\* إذا كنت تعاني من ضغط دم منخفض أو غير مستقر، يتم هذا التقييم من قبل الطبيب.

\* إذا كنت تعاني من السكري أو من خلل في الأداء الوظيفي الكلوي وتتعالج بدواء لخفض ضغط الدم يحتوي على آليسكيرين.

لا تتناول تريتايس إذا كان ما ذكر أعلاه ينطبق عليك. في حالة الشك، إستشر الطبيب قبل تناول تريتايس.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

١) قبل العلاج بالدواء، إحك للطبيب إذا:

• كنت تعاني من مشاكل في القلب، في الكبد أو في الكلى.

• كنت تعاني من فقدان الكثير من الأملاح أو السوائل (تنحة تفتق، إسهال، زبادة التعرق، حمية باليامل، تناول الأدوية المدردة للبول في المرة طولية أو إذا إجترت دايابيز).

• كنت متقدماً إلى خفض نسبة الصوديوم في دمك أو تعاني من حالة طيبة قد تؤدي إلى خفض نسبة الصوديوم في دمك، خاصة إذا كنت مسنًا.

• يوجهك إجراء فحوص دورية لنسب الصوديوم في دمك، خاصة إذا كنت مسنًا.

• كنت تتناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى وذمة، وعالية، مثل مثبطات mTOR (مثل: تيمسيروليموس، إيكيريليموس، سيروبوليوم، فيلابابيليتين، مثبطات نيبيريليسين (NEP inhibitors) - NEP)، أو ساكوبيريل/فالسارتان، بالنسبة لـ ساكوبيريل/فالسارتان، أنظر أيضاً الفقرة «لا يجوز استعمال الدواء».

• كنت تعاني من أمراض النسج الشام مثل تصلب الجلد أو الذبة (lupus erythematosus).

• على إبلاغ طبيبك إذا كنت تعقددين بأنك حامل أو من شأنك أن تصبحي حامل، يوصيك الطبيب عادة بالتوقف عن تناول أي دواء في فترة الحمل أو إذا علمت بأنك حامل، ويوصيك بتناول دواء آخر عوضاً عنه.

• تريتايس غير موصى به خلال الـ ١٢ أسبوعاً الأولى للحمل ويمكن بانتهاء من الأسبوع الـ ١٣، لأنه قد يسبب ضرراً جدياً للجنين.

٢) قبل العلاج بالدواء، إحك للطبيب إذا:

• كنت تعاني من مشاكل في القلب، في الكبد أو في الكلى.

• كنت تعاني من فقدان الكثير من الأملاح أو السوائل (تنحة تفتق، إسهال، زبادة

التنعرق، حمية باليامل، تناول الأدوية المدردة للبول في المرة طولية أو إذا إجترت دايابيز).

• كنت متقدماً إلى خفض نسبة الصوديوم في دمك أو تعاني من

التحسس، كثت تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.

• تناول دوية التي قد تزيد من خطورة جلوث رد فعل تحسسي خطير يسمى

• أو الصيدلي إذا لم تكون قادر على تناول جرعة دوائية عنده الحاجة.