

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ

(ПРЕПАРАТЫ) – 1986

Препарат продается без рецепта врача

## Нурофен жидкие капсулы 200 мг

Состав:

Каждая жидккая капсула содержит: Ибупрофен 200 мг

Ibuprofen 200 mg

Неактивные компоненты:смотрите список в разделе 6.

- Перед началом применения данного препарата внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Настоящая инструкция включает краткую информацию о препарате. Если у Вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

- Данный препарат предназначен для взрослых и для детей старше 12 лет. Лицам младше этого возраста следует обратиться к врачу. Вам следует использовать препарат надлежащим образом. Проконсультируйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации. Обратитесь к врачу, если признаки заболевания (симптомы) усугубляются или не улучшаются в течение 10 дней для взрослого и в течение 3 дней для подростка (12-18 лет).

### 1. Для чего предназначен препарат?

Нурофен жидкые капсулы 200 мг предназначены в качестве обезболивающего средства при боли от слабой до средней степени тяжести, таких как: головная боль, зубные боли, боли, связанные с менструальным циклом, боли в спине и мышцах, в качестве противовоспалительного при ревматических заболеваниях и в качестве жаропонижающего.

Терапевтическая группа: Нестероидные противовоспалительные средства (NSAIDs).

Нурофен жидкие капсулы 200 мг содержат ибупрофен, относящийся к группе препаратов, называемых нестероидными противовоспалительными средствами. Эти препараты действуют, изменяя реакцию организма на боль, отек и высокую температуру.

### 2. Перед применением препарата

Не следует применять препарат, если:

- Вы чувствительны (у Вас есть аллергия) к ибупрофену или к любому из дополнительных компонентов препарата (смотрите список в разделе 6) или к аспирину или к другим нестероидным противовоспалительным препаратам (NSAIDs).
- Вы страдаете от кровотечения или перфорации в пищеварительной системе после использования ибупрофена, аспирина или других нестероидных противовоспалительных препаратов (NSAIDs).
- Вы страдаете от кровотечения или перфорации, в кровотечении из язвенной болезни, перфорации, кровотечения или желудочно-кишечных расстройств.
- Вы ранее испытывали гиперчувствительность, (например: одышка, обострение астмы, насморк и зуд в носу, отек лица, губ, языка или горла или аллергическую сыпь) при приеме ибупрофена, аспирина или подобных анальгетиков (из группы нестероидных противовоспалительных препаратов).
- Вам не исполнилось 12 лет.
- Вы страдаете от тяжелой печеночной недостаточности или тяжелой почечной недостаточности, или тяжелой сердечной недостаточности.
- Вы находитесь на последних трех месяцах беременности (смотрите раздел «Фертильность, беременность и кормление грудью»).

### Особенные предосторожения, касающиеся применения препарата

Перед лечением Нурофеном жидкие капсулы 200 мг сообщите Вашему врачу, если:

- Вы страдаете или страдали в прошлом от астмы.
- Вы страдаете заболеваниями почек или печени.
- Вы страдаете заболеваниями сердца, включая сердечную недостаточность, стенокардию, или если в прошлом Вы перенесли инфаркт миокарда, операцию аортокоронарного шунтирования, заболевания периферических артерий (затрудненного кровообращения в ногах в результате сужения или закупорки артерий) или любой тип инсульты (включая «мини-инсульт» или транзиторную ишемическую атаку).
- Вы страдаете заболеваниями пищеварительной системы (такими как, болезнь Крона или язвенный колит).
- Вы страдаете высоким кровяным давлением, диабетом, высоким холестерином или, если у Вас в прошлом были заболевания

сердца или инсульт, или, если Вы курите.

- Вы страдаете последствиями травмы головы, необъяснимым кровоточением или повышенным внутричерепным давлением.
- Вы страдаете заболеванием соединительной ткани, например, системным красным волчанкой (Лупус).

- Вы старше 65 лет, поскольку пожилые люди имеют более высокий риск возникновения побочных эффектов, таких как, кровотечение и перфорация желудка, которые могут оказаться фатальными.

- Вы постоянно принимаете лекарства.
- Вы страдаете от кровотечения или перфорации желудка после приема ибупрофена или других препаратов группы NSAIDs.
- Вы страдаете ветряной оспой - рекомендуется избегать использования препарата.
- Вы - подросток, страдающий обезвоживанием. В этом случае существует риск повреждения почек.

### Дополнительные предостережения:

Прием данного препарата либо другого обезболивающего группы NSAIDs может увеличить риск возникновения инсульта или инфаркта миокарда. Судя по всему, данный риск связан с приемом других доз препарата. Не превышайте рекомендуемую дозу и рекомендуемую продолжительность лечения.

### Механические взаимодействия:

Если Вы принимаете или принимали в последнее время другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты и биодобавки, сообщите об этом Вашему врачу или фармацевту. В особенности, если Вы принимаете:

- Аспирин или препараты группы NSAIDs (например, COX-2 inhibitors).
- Кортикостероиды (такие как преднизолон), поскольку это может вызвать повышенный риск возникновения язвы желудка и кровотечения.

- Лекарства для лечения сердечной недостаточности, такие как, диуретики.

- Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина для лечения депрессии (SSRIs), поскольку они могут увеличить риск возникновения побочных эффектов в желудочно-кишечном тракте.

- Диуретики, поскольку препараты группы NSAIDs могут ослабить их действие.

- Литии (для лечения депрессии), так как имеются сообщения о возможном повышении уровня лития в крови.

- Метотрексат (для лечения рака и ревматизма), так как имеются сообщения о возможном повышении уровня метотрексата в крови.

- Гипогликемические препараты (пероральные препараты для лечения диабета).

- Амоксициллин (антибиотик).

- Пробенецид (для лечения подагры).

- Циклоспорин или тиокролимус (для подавления иммунной системы), так как существует риск увеличения поражения почек.

- Зидовудин: повышается риск внутреннего кровоизлияния и кровотечения в суставах у пациентов с HIV (+), получающих лечение зидовудином и ибупрофеном одновременно.

- Хинолоны (антибиотики) - так как пациенты, принимающие препараты группы NSAIDs и антибиотики группы хинолов подвергаются риску возникновения судорог.

- Антиагреганты (например, для снижения свертываемости крови, такие как, аспирин, варфарин, тиклопидин).

- Препараты для снижения артериального давления, такие как, бета-блокаторы (например, атенолол), ингибиторы АСЕ (например, каптоприл) и антагонисты ангиотензина II (например, лисинаптэн).

- Мифепристон (для прекращения беременности).

### Фертильность, беременность и кормление грудью:

- Ибупрофен относится к группе препаратов NSAIDs, что может снизить fertilitet женщины. Этот эффект обратим с прекращением приема препарата. Препарат может повлиять на Ваши шансы забеременеть. Если Вы планируете забеременеть или не можете забеременеть, проконсультируйтесь с врачом перед использованием этого лекарства.

- Проконсультируйтесь с врачом, если Вы находитесь в периоде первых 6 месяцев беременности. Не используйтесь это лекарство, если Вы находитесь в периоде последних 3 месяцев беременности.

- Ибупрофен может проникать в грудное молоко при очень низких концентрациях, маловероятно, что этот препарат повлияет на Вашего ребенка. Нет необходимости избегать кормления грудью во время кратковременного лечения рекомендованной дозой.

- Вы страдаете заболеваниями пищеварительной системы (такими как, болезнь Крона или язвенный колит).

- Вы страдаете высоким кровяным давлением, диабетом, высоким холестерином или, если у Вас в прошлом были заболевания

### Введение и управление механизмами

Нет никакого известного эффекта препарата на введение мишины и управление механизмами.

### Использование препарата подростками

Существует риск нарушения функции почек у подростков, страдающих обезвоживанием.

### Важная информация о некоторых компонентах препарата:

Нурофен жидкие капсулы 200 мг содержат содержат 42,1 мг сорбита в каждой жидкой капсуле.

Если Вы страдаете непереносимостью некоторых углеводов, следует проконсультироваться с врачом перед применением данного препарата.

Препарат также содержит Ронсеал4R (E124), который может вызвать аллергическую реакцию.

### 3. Как использовать препарат?

При возникновении сомнений Вам следует обратиться к врачу или фармацевту.

#### Рекомендуемая дозировка, как правило:

Взрослые и дети старше 12 лет:

1-2 жидкие капсулы со стаканом воды, до 3 раз в день.

Следует обходить, как минимум, 4 часа перед приемом следующей дозы.

Не принимать более 6 жидких капсул в течение 24 часов.

Препарата не предназначена для детей младше 12 лет.

#### Нельзя превышать рекомендуемую дозировку.

Подросткам (12-18 лет) - не следует принимать данный препарат более 3 дней.

Взрослым не следует принимать препарат более 10 дней без четких указаний врача.

- Такие препараты, как Нурофен жидкие капсулы 200 мг, могут быть связаны с небольшим увеличением риска инфаркта миокарда или инсульта.

- Пожилые люди подвергаются повышенному риску возникновения побочных эффектов.

- Если у Вас в прошлом были аллергические заболевания, у Вас может возникнуть ошибка.

Сообщите Вашему врачу, в случае возникновения каких-либо необычных симптомов, в особенности, если у Вас появился черный стул, рвота или боль в животе.

Было сообщено, что серьезные поражения кожи (например, синдром Стивенса-Джонсона) могут быть связаны с приемом NSAIDs. При первом проявлении сыпи, сыпи в полости рта или любых других признаков аллергических реакций, следует немедленно прекратить прием Нурофена жидкие капсулы 200 мг. У больных, страдающих язвенной болезнью, и у пожилых людей, существует повышенный риск возникновения желудочных кровотечений, язв и перфорации, связанный с увеличением дозы NSAIDs. Рекомендуется начинать лечение с приема самой малой дозы. Следует проконсультироваться с врачом по поводу заболевания лекарственным препаратом, защищающим желудок.

Если появился побочный эффект, если один из побочных эффектов обострился, или если Вы страдаете от побочного эффекта, не указанного в данной инструкции, Вам необходимо проконсультироваться с врачом.

Сообщение о побочных эффектах можно отправить в Министерство здравоохранения через онлайн форму отчета о побочных эффектах, размещенную на домашней странице веб-сайта Министерства здравоохранения по адресу: ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) или через следующую ссылку:

<https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getsequence.aspx?formType=AdversEffectMedic@moht.gov.il>

### 5. Как хранить препарат?

Избегайте отравления! Данное лекарство, как и любое другое, следует хранить в закрытом, недоступном для детей, и/или младенцев месте, во избежание отравления. **Не высыпайте ровно**, не получив на это четких указаний врача!

- Не используйте препарат после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

### Условия хранения:

Храните при температуре ниже 25°C. Следует хранить препарат в той же упаковке.

Не следует выбрасывать лекарства в унитаз или в мусор. Проконсультируйтесь с фармацевтом о том, как выбрасывать ненужные лекарства, в целях охраны окружающей среды.

### 6. Дополнительная информация:

В дополнении к действующему веществу препарата также содержат:

Capsule contents: Macrogol600, Potassium Hydroxide (minimum 85% purity), Purified water, Capsule shell: Gelatin, Sorbitol liquid, partially hydrated, Ponseal4R (E124), Purified water, Opacode WB white NS-78 (used for the capsule print).

Как выглядят лекарство и что включает упаковка:

- Мягкая полупрозрачная капсула красного цвета, овальной формы, с импринтом белого цвета. Капсулы подаются в формах подиска (блistera).

- Размер упаковки: препарат предоставляется в картонной упаковке, содержащей blister с 4, 10, 16, 20 или 40 капсулами. Не все виды упаковки могут находиться в продаже.

Владелец лицензии и его адрес: Рекитベンизер (Нирист)

Лтд. Ул. Ха нагар 6. Ход ха шарон 4527704.

Элпочта: service.israel@rbt.com

### Производитель и его адрес:

Рекитベンизерхелփер интэрнейшеналтд, Ноттингем, Англия.

Данная инструкция проверена и утверждена Министерством здравоохранения в январе 2018.

Регистрационный номер лекарства из государственного реестра Министерства здравоохранения: 159-74-3477-00