

دير ماكس

صابون مضاد للبكتيريا

المادة الفعالة وتركيزها: Triclosan 1%.

مواد غير فعالة ومتغيرات المحسنة في المنتج: راجع البند رقم 6 «معلومات إضافية». أقر المنشورة بتوعن حتى نهاية قبل استعمال الدواء. تذوي هذه المنشورة على معلومات ملخصة عن الدواء، إذا كانت لديك أي استفسار توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

• يطلب استخدام الدواء بالطريقة الصحيحة.

• استفسر الصيدلي إذا ما كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

• يجب عليك مراعاة الطبيب إذا ما أصبحت أعراض المرض أكثر سوءاً أو لم تتحسن الحالة الصحية بعد أيام.

١. ما هي هدف هذا الدواء؟

هذا الدواء يُخفي علاج وتطهير الالتهابات الجلدية.
المجموعة الطبية: المواد المذهبة (المنظفات).

٢. قبل استخدام الدواء في حالة:

يُمنع استخدام هذا الدواء في حالة:

يُمنع استخدام هذا الدواء في حالة وجود حساسية لديك للمادة الفعالة أو لانية مادة أخرى من المركبات الأخرى للدواء. راجع قائمة المركبات الأخرى في البند رقم 6 «معلومات إضافية».

إذا كانت لديك محسنة لإحدى المواد الغذائية أو لدواء معين، عليك إبلاغ الطبيب بهذا الأمر قبل استخدام الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء:

في حالة تناولك أو إذا ما ثارت في الفترة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية يمكن الحصول عليها بدون وصفة الطبيب أو الإضافات الغذائية، قم بإبلاغ الطبيب أو الصيدلي بهذه الأدواء، وذلك لمنع المخاطر أو عدم فعالية الدواء التي قد تمنع جراء تعاملات الأدوية.

• يُمنع أن يلامس هذا الدواء العيون. في حالة ملامسته للعيون، يجب غسله بصورة فورية بواسطة الماء.

• في حالة استخدامه المتواصل عند الأطفال ما دون جيل نصف عام، يجب استشارة الطبيب.

• الحمل والرضاعة: إذا ما كنت حاملاً أو مرضعاً يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام الدواء.

٣. كيف يستخدم هذا الدواء؟

عليك بالاستشارة الطبية أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً.

انتبه: ليس للأبلاغ هذا الدواء مخصص للاستخدام الخارجي فقط.

ومن ثم غسله وإزالته عن البشرة جيداً. يُمنع إيقافه على البشرة لفترة زمنية طويلة.

يُمنع استخدام الدواء في الكلمة. قوموا بمحض المقص والجرعة الموصى بها في كل مرة ستستخدمون الدواء. قوموا بوضع النظارات إذا ما كنت بحاجة لها.

٤. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء آخر، فإن استخدام دير ماكس قد يتسبب بأعراض جانبية لدى بعض المستخدمين. لا يضم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، فيما تناول من أي منها.

• يجب التوقف عن استخدام الدواء والتوجه إلى الطبيب في حالة التهيج.

التآثر: التألف الجلدي أو الاتكاب الموضعي (عدي) لم تظهر قبل استخدام دير ماكس.

• إذا ما زادت أحدي الأعراض الجانبية سوءاً، إذا ما كنت تعاني من الأعراض الجانبية التي لم يتم ذكرها في النشرة، عليك بالاستشارة الطبية.

٥. كيف تخزن الدواء؟

تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول الأطفال وأي الأطفال. ومكثاً يتم حجب حدوث التسمم. إذا ما قام الولد بابتلاع هذا الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ الموجدة في أقرب مستشفى.

ويحوزتك عبوة الدواء. لا تنتسب بالمعنى المتعتمد بدون تصريح واضح من قبل

الطب. يجب استخدامه خلال 12 شهر بعد فتح العبوة. يُمنع استخدام الدواء بعد تاريـخ انتهاء الصلاحـيـة (exp. date) (الظاهر على العبوة). ينـظرـقـ تـارـيـخـ اـنـتـهـاـءـ الصـالـاحـيـةـ إلىـ الـيوـمـ الـأخـيـرـ منـ الشـهـرـ ذاتـهـ.

• يُمنع تخزينه في درجة حرارة تزيد عن 25° C.

• يجب تخزينه في عبوة الأصلية.

٦. معلومات إضافية
إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي هذا الدواء أيضاً على:

Purified Water, Sodium Laureth Sulfate, Cocamide DEA, Ethoxylated Lanolin, Glycol Stearate, Fragrance, Phenylethanol, Citric Acid, Disodium Chloride.

كيف يبدو هذا الدواء وما هي محتويات العبوة: مستحبط باللون الأصفر

برائحة اليون، تشمل القارورة على 200 غرام فلبيـةـ ضـغـطـ / فـارـوـرـةـ 500

غرام مع مضـضـةـ.

صاحب التسجيل: فيشر مختبرات أدوية (1975) م.ض.، م.ب.، تل. 39071.

الإنتاج: تزويـدـ المنتجـاتـ الطـبـيـةـ الإـسـرـانـيلـيـةـ، مـعـفـارـوتـ مـضـ. كـيـوـبـوتـ

معـارـوتـ 4023000.

تم تحصـنـ هذهـ الشـرـشـةـ وـالـصـارـصـةـ عـلـيـاـنـ بـقـبـلـ وـزـارـةـ الصـحـةـ فـيـ تـارـيـخـ تمـوـزـ 2013.

رقم تسجيل هذا الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 22.58.24975.

من أجل سؤولة القراءة، تمت صياغة هذه المنشورة بصيغة المذكرة على الرغم من أن هذه المنشورة موجهة لكلا الجنسين.