



### ٤ إستعمال الدواء والطعام واستهلاك الكحول

يجب بلع الدواء مع الماء قبل وجة الطعام.  
لا يجوز شرب المشروبات الروحية أثناء فترة العلاج بالدواء.

لأن الكحول قد يضر بعمل الدواء.

لا تستعمل الدواء إذا كانت في فترة الرضاعة أو تنوين الإرضاع.

استشر الطبيب قبل تناول الدواء إذا كانت في فترة الحمّ، من شأنك أن تصبغي أهتمام أو تعقدن أيّدك حامل.

الأعراض التالية قد تحدث لدى الرضاعي الذين تناولوا أهتمامهم برأيد في أشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل: حفّة، تصلب، وأو ضفت العضلات، الصلب إلى التون، إصبعية، مشاكل في التنفس والإطعام، إذا لاحظت ظهور هذه الأعراض لدى طفلك، يجب مراجعة الطبيب.

### ٥ السيادة واستعمال الماكولات

قد تشعر بذلك سبلاً يشكل أقل، لديك ميل للنوم أو نعسان، وتعاني من تشوّش في الرؤيا، أثناء تناول الدواء، في حال حدوث هذا الأمر فلا يجوز السيادة أو شغيل الماكولات.

### ٦ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على لكتوز، نوع من السكر (أنظر الفقرة ٦ - «معلومات إضافية»)، إذا كان لك من قبل طبيب بذلك حساساً لسكريات معينة، فقم بإستشارته قبل تناول الدواء.

### ٧ كيفية استعمال الدواء؟

يجب الإستعمال دائمًا حسب تعليمات الطبيب، عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً. الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

#### تناول الدواء

يجب تناول الدواء غير الفموي.  
• يجب بلع الدواء بشكّل الكامل مع الماء، عند الحاجة بالإمكان شطر الصوص للإستعمال الفموي، لا تتوفر معلومات بخصوص سحق أو مضخة القرص.

• يجب تناول الدواء قبل وجة الطعام.

• إذا كنت تشعر بأن تأثير الدواء أضعف عن أقوى مما ينتهي، لا تغير الجرعة الدوائية من تلقاء نفسك، استشر الطبيب.

كم يجب أن تتناول  
تقليل الجرعة الدوائية الواحد عليك تناولها من برأيد بمفرده.  
يجب الحرص على اتباع تعليمات الطبيب بمدحورها.

#### الكتاب

عادة، إذا كانت الجرعة الدوائية اليومية هي حتى ٤٠٠ ملغ، يجب تناول الدواء مرة في اليوم، إذا كانت الجرعة الدوائية اليومية أكبر من ٤٠٠ ملغ، يجب تقسيم الجرعة الدوائية اليومية إلى مرتين في اليوم.

#### المسنون

يجب الإستعمال بحذر لدى المسنين، جراء خطورة حدوث إنخفاض في ضغط الدم وضرر في القسطنة.

**أشخاص لديهم مشاكل في الكلى**  
من الجائز أن يصف لك الطبيب جرعة دوائية أكثر إنخفاضاً.

**الأطفال**  
لا يستعمال هذا الدواء لدى الأطفال والمرأهقين دون عمر ١٨ سنة.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

- كنت تعاني من مرض قلبي أو لديك سابقة عائلية لمشاكل في القلب.
- كنت تعاني من عوامل خطيرة لحدث سكتة دماغية.

كنت أنت أو شخص من عائلتك تعاني أو عانى في الماضي من خثارات دموية لأنّ وجدت علاقة بين الأدوية المضادة للذهان وبين تشكّل الخثارات الدموية.

كنت تعاني من مرض السكري أو من عوامل خطيرة لحدث سكري.

كنت تعاني من نبض بطيء (دون ٥٥ نبضة في الدقيقة).

كنت لك لأن لديك إنخفاض في نسب البيوتاسيوم في دمك.

كنت مسؤناً لأن المنسنين لديهم احتمالية أكبر بأن يتظور لديهم ضغط دم منخفض أو ضرر في القسطنة، لدى المنسنين الذين يعانون من خرف ويتأثرون بأدوية مضادة للذهان، بلغ عن إيقاع غفف في عدد حالات الوفاة مقارنة بهؤلاء الذين لا يتناولون أدوية مضادة للذهان.

كنت تعاني من إنخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء (agranulocytosis) بسبب نقص في الأوكسجين.

كنت تعاني من تلوثات في أوقات متقاربة والتي تتجلّى بسخونة، قشعريرة دهنية، الارق في المنحني أو تقرّرات في الفم، يمكن أن تكون هذه التلوثات مشكلة في الدم تسمى خلايا الدم البيضاء (leukopenia).

لديك أو لدى شخص آخر من عائلتك مرض لبرولاكتين.

لديك سبب مرتفعة من البرولاكتين.

إذا كان ما ذكر سابقاً يخصك (أو في حالة الشك)، استشر الطبيب قبل تناول برأيد.

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات غذائية، إحدى للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

لا يجوز تناول برأيد، إذا كنت تتناول الأدوية التالية:

• ليفودوبا - لعلاج مرض الباركنسون.

• أدوية من مجموعة «مقدّلات ذات فعل دوّياميّي»، مثل روبيبرين، بروبروكبيپين.

إشتشر الطبيب إذا كنت تتناول الأدوية التالية:

• أدوية لعلاج عدم إنتظام نظم القلب مثل كينينين، ديزوبيراميد، أميدورون، سوتاولون.

• أدوية إضافية مضادة للذهان التي تستعمل لعلاج المشاكل النفسية.

• أدوية من فصيلة الآثيونات لعلاج الألام الشديدة، مثل مورفين أو بيبيدين.

• أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب، مثل ديلاترام، فيراباميل، جوانفاسين وديجييتاليس.

• كوكينين المستعمل لعلاج الشقيقة، هبات الحر أو ارتفاع ضغط الدم.

• ميفاكومين لعلاج الملاريا.

• أدوية للتهاب والتورم مثل باربيتورات وبينزوديازيبينات.

• مواد التخدير.

• أدوية من فصيلة مضادات الهيستامين مثل بروميتازين الذي قد يسبب التعبان.

إذا كان ما ذكر سابقاً يخصك (أو في حالة الشك)، استشر الطبيب قبل تناول برأيد.

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادة  
مستحضرات) - ١٩٨٦  
يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط.

## ١٠٠ ٤ پرإيد أعراض مطالية

### المادة الفعالة وكيفيتها:

برأيد ١٠٠: يحتوي كل قرص على

Amisulpride ١٠٠ ملغ - ١٠٠ mg

برأيد ٤٠٠: يحتوي كل قرص على

Amisulpride ٤٠٠ ملغ - ٤٠٠ mg

المواد غير الفعالة: أنظر الفقرة ٦.

اقرأ النشرة تمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.  
احفظ هذه النشرة، من الجائز أن تحتاج إلى قراءتها ثانية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت أدلة أصلية، اضغط على الرابط، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصفت هذه الدواء لعلاج الأرق، لا تطبّع المخزون الشاهي للحالات.

لا يجوز الإستعمال لدى الأطفال ومرأهقين دون عمر ١٨ سنة.

إذا تفاقم عرض جانبي أو إذا ظهر عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة الرجاء راجع الطبيب أو الصيدلي.

### (١) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لعلاج مرض إنفصام الشخصية.  
الفصيلة العلاجية: يتميّز برأيد بجموعة الأدوية مضادة للذهان من فصيلة substituted benzamides.

### (٢) قبل إستعمال الدواء

#### لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

كنت تعساس (اليريجي) لـ Amisulpride أو لكل واحد من مركبات الدواء (انظر الفقرة ٦). علامات لرد فعل تحسسية تشمل: ملطف، مشاكل في البصر أو في التنفس، إلتحاش الشفتين، الووجه، الالعوام أو اللسان.

كنت في فترة الرضاعة (انظر فقرة «الحمل والإرضاع»).

كنت تعاني من اضطرابات في القولون أو من ورم متعلّق بالبرولاكتين.

كنت تعاني من ورم في الغدة الكظرية (الماسبي - Pheochromocytoma)

- كنت تتناول ليفودوبا، دواء لعلاج مرض الباركنسون، ومقدّلات ذات فعل دوّياميّي مثل بروبروكبيپين، روبيبرين، (انظر الفقرة «لا يجوز تناول برأيد إذا كنت تتناول الأدوية التالية»).

- كنت ما دون عمر ١٨ سنة.

- شخص لديك ورم في الغدة الخامية.  
إذا كان ما ذكر سابقاً يخصك (أو في حالة الشك)، استشر الطبيب قبل تناول برأيد.

### تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج - برأيد، إحكام الطبيب إذا:

• كنت تعاني من تلال في الأداء الوظيفي الكلوي.

• كنت تعاني من نوبات الباركنسون.

• عانيت ذات مرة من نوبات صرع.

• لديك اضطراب/عدم إنتظام في نظم القلب.

## الفحوصن والمتابعة

إن تناول برايد قد يغير من نتائج فحوص دم معينة، من بينها فحوص التي تقس هرمون «برولاكتين» وإنزيمات الكبد. إذا كنت تتوى اختيار فحوص دم، فمن المهم أن تخبر الطبيب بذلك تناول برايد. إذا توفر لديك أسلحة إضافية حول استعمال الدواء، إسال الطبيب أو الصيدلي.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر أو إذا بلغ طفل بالخطأ في الدواء، توجه بلا للطبيب لأغذية الطوارئ في المستشفى، وأحضر علىة الدواء معلقاً لعلم الطبيب ما تناول. قد تتعاني من الأعراض التالية: الشعور بثقلة في المخالب أو في اللسان، ارتجاف، تصلب العضلات، تدلى في العضلات أو شخش، تباطؤ في الحركات، إفراز لعاب أكثر من المعتاد أو الشعور بقلة راحة.

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى ١٠٠٪ من المستعملين من بين ١٠٠٪: حرکات لا إرادية، خاصة البدين والرجلين (بالمكان تقليل هذه الأعراض وذلك إذا قام الطبيب بخطفه)، تشنق، ارتجاف، تصلب العضلات أو شخش، تباطؤ في الحركات، إفراز لعاب أكثر من المعتاد أو الشعور بقلة راحة.

إذا تسببت تناول الدواء في الوقوع المطلوب، لا يجوز تناول جرعة دوائية مبالغة. تناول الجرعة الدوائية التالية في الوقت العادي واستشر الطبيب.

يجب الم關注ة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توفرت عن تناول الدواء. واصل تناول برايد، إلى أن يوصيك الطبيب بالتوقف. لا يجوز التوقف على ملاك صحية، إذا استشاره الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على ملاك الصحية. إذا توفرت على مرصد قد يعود أو ينفاذ، لا يجوز التوقف بشكل مفاجئ على برايد، إلا إذا تسببت تغييرات دوائية في الجسم. إن التوقف المفاجئ قد يؤدي إلى اعراض خطيرة مثل: غثيان أو تقيّق؛ تعرق؛ صعوبات في النوم أو الشعور بقلة راحة؛ تصلب العضلات أو حرکات لا إرادية للجسم؛ تكرار الأعراض.

لَا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

## ٤. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال برايد قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين، لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية عند الجميع لأنها تتعانى أي منها.

يجب تشخيص عن الاستعمال والتوجه حالاً إلى الطبيب أو مستشفي إذا:

• كدت تعاني من سخونة مرتفعة، تعرق، تصلب العضلات، ضربات قلب سريعة، تنسف سريع و الشعور بارتباك، ميل إلى النوم أو صحبة، يمكن أن تكون تلك أعراض لمرض جانبي خطير، الذي تثار ويسمي **neuroleptic malignant syndrome** - المتلازمة العصبية الخطيرة.

• لديك بضم مختلف عن المعتاد، نبض سريع جداً أو ألم في الصدر، الذي قد ينتهي بهدوث نوبة قلبية أو إضطراب في وظيفة القلب الذي يشكل خطراً على الحياة.

• كنت تعاني من خدرات دموية في الأوردة، خاصة في الرجلين (الأعراض تشمل إنتفاخ، ألم وإنحراف في الرجل، الذي قد تنتقل عبر الأوردة المدموعة إلى الرئتين ويزود إلى ألم في الصدر وصعوبات في التنفس، إذا لاحظت تلك الأعراض توجه للتلقيح عن أعراض جانبية، بدلاً من ذلك، بالإمكان التبليغ لنشرة **"يونيفارم م-ضم"**.

## ٥. كيفية تخزين الدواء؟

### تجنب التسمم!

يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالسم. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. يجب تخزينه في درجة حرارة دون ٢٥ درجة مئوية وفي مكان محظى من الضوء.

## ٦. معلومات إضافية

يحتوى الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا على المواد التالية: Microcrystalline cellulose, Lactose monohydrate, Sodium starch glycolate, Hydroxypropyl methylcellulose, Magnesium stearate, Coating blend (white).

يحتوى كل قرص من برايد ١٠٠ ملجم على ٢٢,٧ ملجم لكتوز، موthonhydrates.

يحتوى كل قرص من برايد ٤٠٠ على ٩٠,٨ ملجم لكتوز، موthonhydrates.

كفت بيدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

برايد ١٠٠ هي أعراض مطلبية مستمرة، محدبة الجانبين، لونها أبيض، مع خط للشارط في جانب واحد.

برايد ٤٠٠ هي أعراض مطلبية بيضاء، محدبة الجانبين، لونها أبيض، مع خط للشارط في جانب واحد.

برايد معبأ ضمن لوحيات (بليستر) التي يتم إدخالها إلى علبة كرتون.

بال بالنسبة لـ برايد توفر على بأحجام ذات ٧,٥، ١٠، ١٤، ٢٠، ٢٥، و ٣٠ قرصاً.

من الجائز أن تستوقي كافة أحجام العلب.

اسم صاحب الامتياز وعنوانه: يونيفارم م-ضم، ص.ص. ٦١٢٢٣٠١، ٢١٤٢٩.

اسم المنتج وعنوانه: يونيفارم م-ضم، بارك الصناعة "ماقو كرمل".

أقرت وزارة الصحة صيغة هذه الشرة ومحتها مُحسن وُخص بتأريخ شباط ٢٠١٦ وتم تحديتها بموجب تعليمات وزارة الصحة بتاريخ تموز ٢٠١٨.

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: برايد ١٠٠: ١٠٠٠١٠٠٠١٠٠٠١٠٥٥٤٢٣٩٠١٠١، برايد ٤٠٠: ١٠٠٠١٣٤٤١٦٠١٠٥٥٤٤١٦٠١٠٥٥.

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكل الجنسين.

غير شائعة (أعراض تظهر لدى ١٠٠-١٠١ مستعملين من بين ١٠٠٪):

- كنت تعاني من رد فعل تحسسي، الأعراض قد تشمل: طفح حاک ومتكل، مشاكل في البالع أو في التنفس، إنتفاخ في الشفتين، في الوجه، البلعوم أو في اللسان.

لديك نوبة صرع.

يجب مراجعة الطبيب بأسرع ما يمكن إذا كنت تعاني من الأعراض التالية:

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من ٩٧٪ من المستعملين واحد من عشرة: ارتجاف، تصلب العضلات، تدلى في العضلات أو شخش، تباطؤ في الحركات، إفراز لعاب أكثر من المعتاد أو الشعور بقلة راحة.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى ١٠-١١٪ من المستعملين من بين ١٠٠٪: حرکات لا إرادية، خاصة البدين والرجلين (بالمكان تقليل هذه الأعراض وذلك إذا قام الطبيب بخطفه)، تشنق، ارتجاف، تصلب العضلات أو شخش، تباطؤ في الحركات، إفراز لعاب أكثر من المعتاد أو الشعور بقلة راحة.

أعراض جانبية إضافية (adverse):

- أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى ١٠-١١٪ من المستعملين من بين ١٠٠٪: أرق، قلق، صحبة، الشعور بنعاس وميل إلى النوم؛ إمساك، غثيان، تقيّق، ارتجاف، تصلب العضلات أو شخش، تباطؤ في المخالب والnasاء، الالم في الوركين؛ انتفاخ شاذ للحلب في الثدي لدى الرجال والنساء، الالم في الثديين؛ إنقطاع الدورة الشهرية؛ تضخم الثديين لدى الرجال؛ اضطرابات في إنقباض القصبات الذكري أو في ذقنة السائل المنوي؛ الشعور بدوار (الذي قد ينبع من إنخفاض ضغط الدم).

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى ١٠-١١٪ من المستعملين من بين ١٠٠٪: فرف سكر الدم (hyperglycemia) - يجاوط ظهر القلب.

أعراض جانبية ذات شعوب غير معروفة (أعراض شيعوها لم يحدد بعد): الشعور بارتباك؛ إنرفاع في نسب التحوم (شحوم الثلاثية) أو الكوليسترون في الدم؛ إرهاق، ضغف عام، ارتجاع، الالم.

في الحالات الأخرى عن نقص في الأداء الظيفي للعضلات. قد ينجم هذا الأمر عن إنخفاض في نسبة الصوصويوم في دمك؛ الشعور بوشك، إرتجاك أو ضغف، غثيان، فقدان الشهية الطعام، عصبية.

الهرمونون المضاد لإدرار البول antidiuretic hormone (SIADH)؛ ورم حميد (مثل ورم برولاكتيني)؛ تشوش الرؤية؛ حالة تسمى **هشاشة العظام**، عندما تصيب عظامك قابلة للكسر بشكل أثني؛ إحتقان الأنف.

إذا ظهر عرض جانبي إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تتعانى من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الرابط ["تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي"](#) الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الموقع المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، بدلاً من ذلك، بالإمكان التبليغ لنشرة **"يونيفارم م-ضم"**.

يجب تشخيص عن تلوثات بتواتر أكبر من المعتاد. قد يحدث هذا الأمر بسبب مشكلة في الدم تسمى نقص الكريات الحمبة (agranulocytosis) أو إنخفاض في عدد خلايا الدم (neutropenia) ( neutropenia )