

TRAMARAZ

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - ١٩٨٦

يُسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط.

ترامراز قطرات, ١٠٠ ملغ/ملل

كل ١ ملل (٤٠ قطرة) يحتوي على:

١٠٠ ملغ ترامادول هيدروكلوريد tramadol hydrochloride 100 mg
المركبات غير الفعّالة مفصّلة في البند ٦.

اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. وصف هذا الدواء لمعالجك. لا تطعه لآخرين. فقد يضر بهم حتى لو بدا لك أن حالتهم الطبية مماثلة.

الدواء مخصّص للكبار والأطفال فوق جيل ١٤ سنة.

الأدوية من فصيلة الأفيونات قد تؤدي للإدمان، خصوصاً عند الاستعمال المتواصل، ويمكن أن تكون عرضة لإساءة الاستخدام وفرط الجرعة. رد الفعل تجاه جرعة زائدة من الممكن أن يتجلّى بنفثس بطيء وحتى التسبب بالموت.
تأكد من كونك تعرف اسم الدواء، المقدار الدوائي الذي تتناولُه، وتيرة الإعطاء، فترة العلاج، الأعراض الجانبية والمخاطر الممكنة.

معلومات إضافية حول خطورة التعلّق والإمان يمكن إيجادها عبر الرابط:

https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/DocLib/opioids_ar.pdf

١. لأي غرض مُخصّص الدواء؟

لتسكين الآلام المتوسطة حتى القوية

الفصيلة العلاجية: مسكن آلام أفيوني

٢. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (اليرجي) للمادة الفعّالة (ترامادول هيدروكلوريد)، أو لأحد مركبات الدواء الأخرى أو للأفيونيات.
- إذا كنت تعالج للطعام من مواد مخدرة.
- إذا كنت حامل أو مرضعة.
- عند تسمم حاد نتيجة للكحول، أقراص منومة، مسكنات الأم أو أدوية ذهانية أخرى (أدوية تؤثر على المزاج والأحاسيس).
- إذا كنت تتناول معيقات مونامين أوكسيداز (أدوية معينة لعلاج الاكتئاب) أو إذا تناولتها خلال الأسبوعين قبل بدء العلاج بترامراز قطرات.
- إذا كنت مصاباً بمرض الصرع ولا يتم السيطرة على النوبات بشكل لائق من خلال العلاج الذي تحصل عليه.
- لعلاج الأطفال تحت جيل ١٤ سنة.
- إذا كنت تعاني من فشل كبد أو كلي وخيم (إخلاء كرياتينين دون ١٠ ملل/اللدقيقة).
- لدى معالجين لديهم ميول انتحارية أو ميل للإدمان أو تعلق بالمخدرات/أدوية أو كحول.

قبل استعمال قطرات ترامراز، أخبر الطبيب إذا:

- * كنت تعاني أو عانيت في الماضي من صعوبات في التنفّس (خلل في مركز التنفّس أو وظيفة التنفّس).
- * كان لديك سابقة أو ميل للصرع أو الانقباضات، أو أنك في اختطار لأن تصاب بنوبات (مثل إصابة تماغية، اضطراب ابيضي، فطام من الكحول أو من المخدرات، تلوّثات في جهاز الأعصاب المركزي)- قد يزيد الاختطار لحدوث نوبات.
- * لديك سابقة من أعراض جانبية خلال استعمال الدواء أو مسكنات آلام أفيونية أخرى.
- * كنت تعاني من ضغط دم مرتفع في الدماغ في أعقاب إصابة في الرأس أو مرض دماغي.

* كنت تعاني من اضطرابات في الوعي (إذا كنت تشعر بأنّه يوشك أن يغمى عليك).

*كنت في حالة صدمة (تعرق بارد يمكن أن يكون علامة على ذلك).

*كنت تعاني من مرض كبد أو كلي.

*كنت تعاني من اضطراب نفسي أو اكتئاب.

*كنت تعاني من ألم في البطن بشكل فجائي أو من مصدر غير معروف.

*كنت تعاني من حساسية أيّا كانت لطعام أو دواء معين.

* كنت فوق جيل ٦٥ سنة.

تحذيرات خاصة تتعلّق باستعمال الدواء:

الاستعمال المتواصل قد يسبب التعلّق الجسدي والنفسي!

*الاستعمال المتواصل قد يسبب تعلق بالدواء – يقل رد الفعل نحو الدواء مع مرور الوقت ولذلك هناك حاجة لجرعات أكبر.

*لا يجوز استعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة أو لفترة متواعدة من دون استشارة طبيب.

*لا يجوز استعمال المستحضر لتسكين آلام خفيفة.

*تم التبليغ عن نوبات صرع في معالجين تناولوا ترامراز قطرات بالجرعة الموصى بها. قد يزيد الاختطار في جرعات تزيد عن الجرعة القصوى اليومية الموصى بها (٤٠٠ ملغ).

*يجب الاستعمال بحذر في معالجين موجودين في اختطار لكبت التنفّس.

إذا كنت تأخذ، أو إذا أخذت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. على وجه الخصوص إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً:

*معيقات مونامين أوكسيداز أنظر البند ٢، البند الفرعي "لا يجوز استعمال الدواء".

قد يزيد الاختطار لأعراض جانبية إذا كنت تتناول أدوية معينة سوية مع ترامراز قطرات، سوف يوجّهك الطبيب بخصوص تناول ترامراز قطرات وبأي جرعة، ولذلك يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول:

*أدوية تؤثر على جهاز الأعصاب المركزي التي قد تسبب تشوش أو شعور بالإغماء مثل: فينوثيازينات، مرخيات العضل، أدوية للتهدئة، للنوم، للباركيتسون، للصرع، ضد الحساسية، مواد مخدرة لجرحات ومسكنات آلام أخرى مثل مورفين، كودائين (حتى لو كان كدواء للمسعال) والكحول. قد تشعر بنعاس أو أنه يوشك أن يغمى عليك، إذا حدث ذلك- بلغ الطبيب.

* أدوية قد تسبب اختلاجات مثل مضادات الاكتئاب من نوع معين أو مضادات ذهانية- استعمال ترامراز قطرات بموازاة استعمال هذه الأدوية قد يزيد من اختطار حدوث نوبات اختلاجية.
يزيد تناول ترامراز قطرات من اختطار حدوث اختلاجات في معالجين يستعملون بشكل موزاي:

معيقات انتقائية لاعادة استيعاب سيروتونين (SSRI)، مضادات اكتئاب ثلاثية الحلقة (TCA) أو مركبات ثلاثية الحلقة أخرى أو أفيونيات أخرى.

تناول ترامراز قطرات يزيد من الخططار الاختلاجات أيضاً في معالجين يستعملون معيقات مونامين أوكسيداز (MAOI) –

انظر البند ٢ أيضاً، البند الفرعي "لا يجوز استعمال الدواء"، وفي معالجين يستعملون أدوية عصبية أو أدوية تخفض من عتبة الاختلاجات.

*أدوية معينة مضادات الاكتئاب، مثل/ معيقات انتقائية لإعادة استيعاب سيروتونين (SSRI)، معيقات اعادة استيعاب سيروتونين ونورأدرينالين (SNRI)، مضادات اكتئاب ثلاثية الحلقة (TCA)، معيقات مونامين أوكسيداز (MAOI)، تريبتونات، لينزوليد، ليثيوم أو الدواء النباتي عشبة زهر الرمان (سانت جونز وورث)- يمكن أن تسبب "متلازمة السيروتونين" والتي أعراضها على سبيل المثال: انقباض في العضلات بشكل لا إرادي وبوتيرة معينة (يشمل عضلات تتحكم بحركات العينين)، تشنجات العضل أو توتر زائد في العضل، ارتباك، قلة رجفه هدوء، سخونة فوق ٣٨ درجة مئوية، تعرق زائد، ارتكاسات مبالغ بها، غيبوبة، نبض سريع، ضغط دم غير منظم، قلة تناسق، غثيان، تقيؤ وإسهال.

*مضادات التخثر من عائلة مشتقات الكومارين (مثل: وارفارين) يحتمل تأثير على نشاطها بخصوص تخثر الدم ويمكن أن يظهر نزيف.

* ديجوكسين- الاستعمال بشكل متزامن مع ترامراز قطرات يمكن أن يزيد اختطار سمية ديجوكسين.

*كواندين، فلوأوكسائين، پاروكسائين، أميتريتيلين، كيتوكونازول، أريثرومايسين.

يمكن أن يقل تأثير ترامراز قطرات المسكن للألم وكذلك يكون طول تأثير الدواء أقصر إذا كنت تتناول أدوية تحتوي على:

* كاربامزيبين (لعلاج نوبات صرع) – الاستعمال سوية مع ترامراز قطرات لا يوصى به.

* مسكنات ألم معينة مثل: فينتوزاسين، بوپرنورفين، تالفوفين.

* أوندانسيترون (لعلاج الغثيان).

* ريفامبيسين.

سوف يوصيك الطبيب بخصوص هل ينبغي تناول ترامراز قطرات وبأي جرعة.

استعمال الدواء والطعام:

الطعام لا يؤثر على عمل ترامادكس نقاط يمكن تناول الدواء دون علاقة بزمن الوجبات
استعمال الدواء واستهلاك الكحول: لا يجوز استهلاك الكحول. لا يجوز شرب النبيذ أو المشروبات الروحية خلال العلاج بالدواء لأن تأثيره قد يزيد.

الحمل والإرضاع

لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت حامل أو مرضعة.

تتوفر معلومات قليلة للغاية عن استعمال الدواء خلال الحمل. استعمال ترامراز قطرات بشكل ثابت في الحمل قد يسبب نوبات اختلاجية، ادمان أو أعراض فطام لدى المولود، موت الجنين أو إنبجاب مولود ميت.

إذا كنت حامل، قد تكوني حامل أو تتوين الدخول في حمل أو إذا كنت مرضعة- استشيري الطبيب.

القيادة واستعمال ماكنات

يمكن أن يؤثر استعمال هذا الدواء على اليقظة وقد يسبب دوام وتشوش الروية ولذلك يوجب الحذر في قيادة مركبة، تشغيل ماكنات خطيرة وفي كل نشاط يلزم اليقظة. بخصوص الأطفال، يجب تحذيرهم من ركوب الدراجة أو من اللعب بالقرب من الشارع والخب.

معلومات مهمة عن بعض من مركبات الدواء:

تحتوي القطرات على سوكروز: إذا قيل لك في الماضي من قبل طبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة أو سكري، توجه إلى الطبيب قبل بدء العلاج بهذا الدواء. قد يضر الأسنان.

٣. كيف تستعمل الدواء؟

*يجب الاستعمال دوماً حسب تعليمات الطبيب. عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً.

*تلازم الجرعة مع شدة الآلام وحساسيتك الشخصية للألم. بشكل عام، يجب أخذ الجرعة الأقل التي تسكن الألم.

الجرعة وكيفية العلاج تحددان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة المتبعية في الكبار والمراهقين من جيل ١٤ فما فوق:

٥٠-١٠٠ ملغ (٢٠-٤٠ قطرة) كل ٦-٤ ساعات.

لا يجوز تناول أكثر من ٤٠٠ ملغ ترامادول هيدروكلوريد (١٦٠ قطرة) في اليوم.

يجب الانتظار على الأقل ٤ ساعات بين جرعة واحدة وأخرى.

عند الحاجة، في مرضى مسنين (فوق جيل ٦٥ سنة)، في مرضى يعانون من فشل كلي أو كبد حاد، قد يوصى الطبيب بفضفض جرعة الدواء و/أو إطالة الفترات بين الجرعات.

لا يجوز تخطي الجرعة الموصى بها.

*يجب البلع مع قليل من الماء أو التتقيط على قليل من السكر.

للقنبنة ختم إغلاق آمن ليمنع فتحها من قبل الأطفال.

لتفتح: اضغط على الغطاء وبرمه. لإخراج القطرات، امسك القنبنة رأساً على عقب (بالمقلوب بحيث يكون الغطاء نحو الأسفل) بشكل عمودي. بعد الاستعمال قم بلولبة الغطاء حتى اغلاقه بشكل تام.

لا يجوز تناول الدواء لفترة أطول من المطلوب، إذا كان ينبغي عليك أن تتلقى العلاج لفترة طويلة، سوف يفحص الطبيب على فترات منتظمة وقصيرة (مع وقف العلاج، وفقاً للحاجة) هل يمكنك أن تستمر بتناول الدواء وبأي جرعة.

إذا شعرت بأن تأثير الدواء أقوى من اللازم أو أضعف من اللازم، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

انتبه! يجب الحرص على قياس الجرعة بالقطارة.

إذا أفرطت في تناول الجرعة قد تظهر أعراض جانبية مثل: انكماش الحدقات، غثيان وتقيؤ، ضعف في عضلات الهيكل العظمي، جلد بارد ورطب، صدمة- اضطرابات في نظم القلب، هبوطي في ضغط الدم، نبض سريع، نبض بطيء، انهيار، اضطراب في الوعي، والاعراض التي يمكن أن يتفاقم حتى ذهول (اضطراب الحواس) وغيبوبة، نوبات صرع، نوبات تشنجية، اختلاجات، وذمة رتئين، صعوبات في التنفّس حتى توقف التنفّس. تنفس سطحي، كبت التنفّس، كبت جهاز الأعصاب المركزي، سكتة قلبية وموت.

إذا أفرطت بالخطأ في تناول جرعة أو إذا بلغ طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، واحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، قد يعود الألم. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة للتعويض عن جرعة نسيت، خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصى من قبل الطبيب.

حتى لو طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز وقف العلاج بالدواء من دون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

إذا توقفت أو أنهيت العلاج بترامراز قطرات بوقت مبكر، قد يرجع الألم. إذا كنت ترغب في إيقاف العلاج، توجه إلى الطبيب. عادة، لن تكون هناك أعراض جانبية من إيقاف العلاج، ولكن قد يشعر بعض المعالجين بسوء في أعقاب إيقاف تناول الدواء. قد يشعرون بالتوتر، قلة النبات، قلة الهدوء، قلق، نوبات فزع، أفكار وهمية، هلوسة، تهيؤات، أو هام ملاحقة (التخيل بأن هناك من يلاحقك)، فقدان الهوية، مشاعر غير عادية (مثلاً: حكة، نخر، قلة الشعور)، طنين في الأذنين، عصبية، صعوبة في النوم، رجفة، ارتباك، فرط نشاط، مشاكل في المعدة والأمعاء، غثيان، إسهال، انقباضات في البطن، قهيم، تقيؤ، تعرق، تصلب , ألم ألم ظهر, آلام مفاصل, آلام عضلات, انتصاب الشعر ("جلد وز"), دمع، جريان الأنف، تشاؤب , قشعريرة، توسع البؤبؤين، ضعف , أعراض في سبل التنفّس العلوية، ارتفاع بوتيرة التنفّس، ارتفاع بضغط الدم أو ارتفاع بوتيرة القلب.
أعراض جانبية أخرى في جهاز الأعصاب مثل: هوس، تغير في النظرة إلى الذات (Derealization)،(Depersonalization).
تغير في النظرة إلى الواقع (Derealization).
إذا ظهرت واحدة من هذه الأعراض الجانبية بعد وقف العلاج- عليك أن تستشير طبيبك.
*لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من الملصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

٤. الأعراض الجانبية:

ككل أي دواء، قد يسبب استعمال ترامراز قطرات أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين.

لا تفزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تصاب بأي واحدة منها.

يجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب فوراً في حال ظهور:

*ردود فعل تحسسية تتجلى من خلال انتفاخ الوجه، اللسان، الحلق أو البلعوم، صعوبات في البلع، طفح في الجلد أو شرى سوية مع صعوبات في التنفّس، أزيز في التنفّس وانتفاخ الجلد.

*صدمة (فشل فجائي في دورة الدم).

*تشنجات (يزيد الاختطار بأخذ جرعات مرتفعة).

*طفح وخيم مع احمرار، تقشر وانتفاخ الجلد الذي يشبه حروق وخيمة (تقشر الأنسجة الممتوتة البشرية التسممي) أو شكل وخيم من طفح في الجلد مع تورد، سخونة، حويصلات وتقرحات (متلازمة ستيفنس-جونسون).

***أعراض جانبية تتبع من جرعة مفرطة-** انظر البند ٣، البند الفرعي "إذا تناولت بالخطأ جرعة أعلى من اللازم".

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جدًا، أعراض تظهر في أكثر من مستخدم ١ من بين ١٠:

*غثيان

*دوخة

أعراض جانبية شائعة , أعراض تظهر في ١ – ١٠ مستخدمين من بين ١٠٠:

*صداع، نعاس

*إمساك، جفاف في الفم، تقيؤ، مشاكل في الهضم، ألم بطن

*تعرق

*أعراض سن الإياس لدى النساء

*تعب، شعور بالوهن، كسل، قلة الطاقة/خائر القوى.

أعراض جانبية غير شائعة , أعراض تظهر في ١ – ١٠ مستخدمين من بين ١,٠٠٠:

*ردود فعل متصالية مع مسكنات الآلام الأخرى (مثل: أسبرين، إيبوبروفن، نابروكسين).
*تأثير على القلب وعلى الدورة الدموية (مثل خفقان القلب، نبض سريع، شعور بالإغماء أو انهيار- يمكن حدوث هذه الأعراض الجانبية خاصة في معالجين في وضعية منتصبه أو في حال بذل جهد جسدي).

*قهم، الرغبة بالتقيؤ، مشاكل في المعدة (مثل شعور بضغط في المعدة، انتفاخ)، إسهال

*ردود فعل في الجلد (مثل حكة، طفح).

أعراض جانبية نادرة، أعراض تظهر في ١ – ١٠ مستخدمين من بين ١٠,٠٠٠:

*نبض بطيء، ارتفاع بضغط الدم.

*تغير في الشهية، شعور غير اعتيادي (مثل حكة، نخر، قلة الأحاساس)، رجفة، تنفّس بطيء (إذا تم تجاوز الجرعة الموصى بها، أو إذا يتم تناول أدوية أخرى بشكل متزامن التي تثبط وظيفة المخ)، نوبات صرع (حدثت خاصة بجرعات عالية أو عندما يتم أخذ الدواء سوية مع أدوية أخرى التي يمكن أن تسبب نوبات، مثل معيقات انتقائية لإعادة استيعاب سيروتونين (SSRI)، تشنج العضلات، قلة التناسق في الحركة، فقدان وعي عابر (إغماء)، ارتفاع في تصلب العضلات، اضطرابات في مذاق.

*هذيان، ارتباك، اضطراب في النوم، قلق وكوابيس.

قدّ تظهر شكوى ذهانية بعد العلاج بالدواء. طبيعة وقوة هذه الشكاوى قد تتغير حسب شخصية المعالج وطول فترة العلاج. قد تظهر هذه التأثيرات كتغير في المزاج (خاصة مزاج عالي، في بعض الأحيان مزاج عصبى)، تغيرات في النشاط، بطء النشاط (لكن في بعض الأحيان ارتفاع بالنشاط) وانخفاض في الإدراك الذهني والحسي (تغير في الحواس والإدراك وانخفاض القدرة على اتخاذ القرارات، التي يمكن أن تؤدي إلى أخطاء في ترجيح الأمور).

*يمكن حدوث تعلق إذا تم أخذ الدواء على مر فترة من الوقت (لكن اختطار ذلك منخفض).

*أفكار انتحارية، سوء استعمال أدوية وإدمان.

*تشوش الروية

*ضيق تنفّس

*بلغ عن تقاغم في الربو لكن لم يحدد هل حدث هذا نتيجة لترامراز

*اضطراب في المعدة والأمعاء

* ضعف العضلات

*صعوبات أو ألم عند التبول، قلة البول

*اضرابات في الدورة الشهرية

*انخفاض في الوزن

أعراض جانبية نادرة جدًا، أعراض تظهر في أقل من مستخدم ١ من بين ١٠,٠٠٠:

*ارتفاع في قيم انزيمات الكبد

*توسع الحدقات

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (لم يحدد شيوعها بعد):

*اضطرابات في النطق

*تهيج في جهاز الأعصاب المركزي. تشمل الأعراض: عصبية، قلق، قلة الهدوء، رجفة، تشنجات، شق، قلة النبات النفسي وتهيؤات

*نقص السكر في الدم- مستوى منخفض أكثر من اللازم من الجلوكوز (سكر) في الدم.

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف والعلاقة بينها وبين تناول الدواء غير واضحة:

*اضطراب في الروية

*شعور بالمرض

*تقلص الحدقات

*غازات

*تبول بوتيرة عالية، احتباس البول

*إصابة بالصدفة، موت، متلازمة سيروتونين (أنظر البند ٢، البند الفرعي "إذا كنت تأخذ، أو إذا أخذت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات تغذية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك").

*مشي غير سليم، فقدان الذاكرة، اكتئاب، صعوبات في التركيز، اضطرابات في الحركة.
*فصص مخطط كهربية القلب غير سليم، انخفاض في ضغط الدم، ضغط دم منخفض أو مرتفع، اقنار قلبي، وذمة رئوية، انصمام رئوي.
*صداع نصفي.

*نزف في جهاز الهضم، التهاب في الكبد، التهاب في الفم، فشل كبدِي.

*ارتفاع في قيم الكرياتينين، انخفاض في الهيموجلوبين، ظهور بروتين في البول.

*كتاراكت (سادماء بوضاء)، صمم، رنين في الأذنين.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تقاغم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبيّ لم يُذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية إلى وزارة الصحة من خلال الضغط على رابط "التبليغ عن أعراض جانبية في أعقاب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية من موقع وزارة الصحة (**www.health.gov.il**) الذي يوجه إلى نموذج انترنتي للتبليغ عن أعراض جانبية.

٥. كيفية تخزين الدواء؟

*يجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون أمر صريح من الطبيب.

*لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

*يُخزّن بدرجة حرارة تحت ٢٥ درجة مئوية.

*يُخزّن في العبوة الأصلية.

*لا يجوز استعمال الدواء بعد أكثر من ٢١ شهر من يوم فتحه.

٦. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعّالة يحتوي الدواء أيضا على:

Purified water, sucrose, propylene glycol, glycerol, sodium cyclamate, saccharin sodium, potassium sorbate, macrogolyglycerol hydroxstearate, peppermint aroma, anise aroma.

كل ملل يحتوي على ١٠٠ ملغ سوكروز

كيف يبدو الدواء وما محتوى العبوة:

محلول شفاف حتى مائل للصفرة، لزج قليلاً.

تشمل قنبنة الدواء قطارة لقياس دقيق لكمية الدواء. كل قنبنة تحتوي على ١٠ ملل من المستحضر.

رقم تسجيل الدواء: ١٥٤٠٨٨-٣٤٢٠٥٠٠٠

المنتج:

ABC Farmaceutici S.p.A. – Canton Moretti, 29 – San Bernardo d’Ivrea (TO), Italy

صاحب التسجيل:

راز للصيدلة م.ص، همتيخت ٦، كديما.

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصّص لكلا الجنسين.

تم فحص هذه النشرة والمصادقة عليها من قبل وزارة الصحة بتاريخ ٢٣/١١/١٥ وتم تحديثها وفقاً لتعليمات وزارة الصحة بتاريخ شباط ٢٠١٩.