



- لديك تضيق في الصمام الأبهري أو التاجي (تضيق صمامات القلب) أو اعتلال عضلة القلب الضخامي (مرض يؤدي لسماكة عضلة القلب)
- لديك سكري
- كان لديك داء النقرس
- لديك أو كانت لديك حالة من التحسس، الربو أو حالة تسبب لك آلاماً في المفاصل، طفح جلدي وسخونة (لوبيوس - ذئبة احمرارية جهازية)
- لديك نسب مرتفعة من الكالسيوم أو نسب منخفضة من البوتاسيوم أو كنت تخضع لحمية فقيرة البوتاسيوم
- كنت تعاني من فرط الألدوستيرونية الأولية (متلازمة تحدث في أعقاب خلل في الغدة الكظرية وتتعلق على إجراء فحوص وظائف الغدة نظيرة الدرقية، أنت ملزم بإبلاغ طبيبك أو الطاقم الطبي بأنك تتناول أقراص لوتان بولوس
- كنت تتناول من فرط الألدوستيرونية الأولية (متلازمة تحدث في أعقاب خلل في الغدة الكظرية وتتعلق بزيادة إفراز هورمون الألدوستيرون من قبل الغدة)
- كنت تتناول أي واحد من الأدوية التالية التي تستعمل لمعالجة ارتفاع ضغط الدم:
  - مثبطات ACE (مثلاً إينالابريل، ليزينوبريل، رامبيريل)، خاصة إذا وجدت لديك مشاكل في الكلى تتعلق بالسكري
  - اليوسكربين

من شأن طبيبك أن يقوم بفحص الأداء الوظيفي لكليتيك، ضغط الدم وكمية الشوارد الكهربائية (مثلاً، البوتاسيوم) في دمك بفواصل زمنية محددة.

انظر أيضاً المعلومات تحت عنوان «لا تتناول لوتان بولوس إذا».

❗ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، يتوجب عليك إبلاغ الطبيب المعالج أو الصيدلي عن ذلك.

قد يحصل تداخل دوائي بين الأدوية المدرة للبول مثل هيدروكلوروثيازيد الموجود بـ لوتان بولوس وبين أدوية أخرى.

• لا يجوز تناول لوتان بولوس بمشاركة الأدوية التي تحتوي على الليثيوم من دون إجراء مراقبة حثيثة من قبل طبيبك.

• من شأن وسائل الحذر الخاصة (مثلاً: فحوص الدم) أن تكون مناسبة إذا كنت تتناول إضافات البوتاسيوم، بدائل الملح الحاوية على البوتاسيوم أو الأدوية الحافظة للبوتاسيوم، مدرات بولية أخرى، وبعض المسهلات، أدوية لعلاج داء النقرس، أدوية للسيطرة على نظم القلب أو للسكري (الأدوية الفموية أو الإنسولين).

من المهم أيضاً أن يعرف طبيبك إذا كنت تتناول:

- أدوية أخرى لتخفيف ضغط الدم الكبد
- ستيرويديات
- أدوية لعلاج السرطان
- مسكنات الألم
- أدوية لعلاج التلوثات الفطرية
- أدوية لمعالجة التهاب المفاصل (داء الرثية)
- المستحضرات الحاوية على الراتنجات لمعالجة ارتفاع الكولسترول، مثل كوليستيرامين
- أدوية لإرخاء العضلات
- الأقراص المنومة
- الأدوية الأفيونية المفعول مثل المورفين
- الألبينات الراجعة للضغط، مثل أدريالين أو أدوية أخرى من نفس المجموعة
- الأدوية الفموية لداء السكري أو الإنسولين

من الجائز أن يضطر طبيبك لتغيير المقدار الدوائي و/أو لاتخاذ وسائل حذر أخرى:

إذا كنت تتناول مثبطات ACE أو اليوسكربين (انظر أيضاً المعلومات تحت عنوان «لا تتناول لوتان بولوس إذا» - وتحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال لوتان بولوس)

الرجاء بلع طبيبك بأنك تتناول لوتان بولوس أيضاً إذا كنت مقبل على إجراء تصوير واستعطي لك مادة ظليلة تحتوي على اليود.

❗ إستعمال الدواء والطعام:

إن الكميات المبالغ فيها من الملح في الغذاء قد تعاكس تأثير أقراص لوتان بولوس.

بإمكان تناول أقراص لوتان بولوس مع أو بدون طعام.

❗ إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول:

يوصى بعدم شرب الكحول في أثناء تناول هذه الأقراص. إن الكحول وأقراص لوتان بولوس قد تزيد من تأثيرات بعضها البعض.

❗ الحمل والإرضاع:

الحمل

يتوجب عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تعتقدين بأنك حامل (أو من شأنك أن تصبحي حاملاً). يوصيك طبيبك عادة بالتوقف عن تناول لوتان بولوس قبل حصول الحمل أو لحظة أن عرفت بأنك حامل ويوصيك بتناول دواء آخر عوضاً عن لوتان بولوس.

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - ١٩٨٦  
يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

## لوتان بولوس أقراص

التركيب:

يحتوي كل قرص من لوتان بولوس:

لوسارتان بوتاسيوم ٥٠ ملغ

هيدروكلوروثيازيد ١٢.٥ ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة، الرجاء أنظر الفقرة ٦.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

• تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن لوتان بولوس. إذا توغرت لديك أسئلة إضافية، إسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

• وصف هذا الدواء للعلاج من أجهك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم، حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

لوتان بولوس غير مخصص للأطفال والمراهقين ما دون عمر ١٨ سنة.

(١) لأي غرض مخصص الدواء؟

لوتان بولوس مخصص لمعالجة ارتفاع ضغط الدم، ويساعد أيضاً على تقليل خطورة حدوث مرضي يعانين من ضغط دم مرتفع وسماكة في البطين الأيسر (البطين الأساسي) للقلب.

الفصيلة العلاجية: لوتان بولوس هو عبارة عن مزيج من حاجب للمستقبل أنجيوتنسين II (لوسارتان) ومدر للبول من نوع تيازيد (هيدروكلوروثيازيد).

(٢) قبل إستعمال لوتان بولوس

❗ لا تتناول لوتان بولوس إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) لـ لوسارتان، هيدروكلوروثيازيد أو لكل واحد من المركبات الأخرى لهذا الدواء (انظر معلومات إضافية في الفقرة ٦).
- كنت حساساً لمواد أخرى التي تعتبر من مشتقات سولفوناميدات (مثلاً: تيازيدات أخرى، بعض الأدوية المضادة للجراثيم مثل كو-تريموكسازول، إسبال طبيبك إذا لم تكن واقفاً).
- لديك خلل خطير في وظيفة الكبد.
- لديك نسب منخفضة من البوتاسيوم، نسب منخفضة من الصوديوم أو نسب مرتفعة من الكالسيوم، التي لا يمكن تصحيحها بالعلاج.
- كنت تعاني من داء النقرس.
- كنت حامل أكثر من ثلاثة أشهر (يُفضل أيضاً الإمتناع عن لوتان بولوس في بداية الحمل - أنظري فقرة «الحمل والإرضاع»).
- لديك ضرر خطير في وظيفة الكلى أو أن كليتيك لا تنتج البول أبداً.
- لديك السكري أو خلل في وظائف الكلى وكنت تتعالج بدواء لتخفيف ضغط الدم الحاوي على أليوسكربين.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال لوتان بولوس:

تحدث مع طبيبك، الصيدلي أو الممرضة قبل أن تتناول الدواء.

يتوجب عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تعتقدين بأنك حامل (أو من شأنك أن تصبحي حاملاً). لا يوصى بإستعمال لوتان بولوس في بداية الحمل ولا يجوز تناوله إذا كنت في الثلث الثاني والثالث من الحمل، وذلك لأنه قد يسبب ضرراً خطيراً للرضيع إذا تم تناوله في هذه المرحلة (أنظري فقرة «الحمل والإرضاع»).

قبل العلاج بـ لوتان بولوس من المهم إبلاغ الطبيب إذا:

أصبحت في الماضي بسرطان الجلد، أو إذا تطورت لديك آفة غير متوقعة في الجلد خلال فترة إستعمال الدواء

إن إستعمال هيدروكلوروثيازيد قد يزيد من خطورة تطور سرطان في الجلد وفي الشفتين (سرطان جلد من نوع غير الميلانوما)، خاصة في الإستعمال طويل الأمد بمقادير واثنية عالية. يجب حماية الجلد من التعرض للشمس والأشعة فوق البنفسجية (UV) خلال فترة إستعمال لوتان بولوس

- كنت تتلقى مدرات بولية
- كنت تخضع لحمية فقيرة بالألماج
- كنت تعاني من أنغيت من تقيؤ و/أو إسهال شديد
- لديك قصور في القلب
- لديك خلل في وظائف الكبد (أنظر الفقرة ٢ «لا يجوز إستعمال لوتان بولوس إذا»)
- لديك تضيق في الشرايين المؤدية لكليتيك (تضيق في شرايين الكلية) أو لديك كلية واحدة فقط تعمل، أو إذا اجترت زراعة كلية في الأونة الأخيرة
- لديك تضيق في الشرايين (تصلب عسدي)، نحة صدرية (آلام في الصدر نتيجة تدني وظيفة القلب)

لا يوصى بإستعمال **لوتان بولوس** خلال فترة الحمل ولا يجوز تناوله إذا كنت في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل، وذلك لأنه قد يسبب ضرراً خطيراً لرضيك إذا تم تناوله بعد الشهر الثالث من الحمل.

#### الإرضاع

بلغي طبيبك إذا كنت مرضعة أو مقبلة على البدء في الإرضاع. لا يوصى بإستعمال **لوتان بولوس** لدى الأمهات المرضعات، ومن شأن طبيبك أن يختار من أجلك علاجاً آخر إذا كنت ترغبين بالإرضاع.

#### ❗ الإستعمال لدى الأطفال:

لا توجد معلومات حول إستعمال **لوتان بولوس** لدى الأطفال. لذلك، لا يجوز إعطاء **لوتان بولوس** للأطفال.

#### ❗ الإستعمال لدى الكبار:

**لوتان بولوس** يعمل ويتم تحميله بشكل جيد ومشاوي لدى غالبية المرضى البالغين الكبار والأصغر سناً. بالنسبة لغالبية المرضى الكبار يتطلب الأمر نفس المقدار الدوائي كما هو الحال لدى المرضى الأصغر سناً.

#### ❗ السيقاة وإستعمال الماكنتا:

عندما تبدأ بالعلاج بهذا الدواء، لا يجوز إجراء المهام التي تتطلب الانتباه الخاص (مثلاً: سيقاة المركبات أو تشغيل الماكنتا الخطرة) إلى أن تعرف كيفية إستجابتك للدواء.

#### ❗ معلومات هامة حول بعض مركبات **لوتان بولوس**:

تحتوي أقراص **لوتان بولوس** على اليوتاسيوم (لمحتوى اليوتاسيوم، أنظر الفقرة ٦).

تحتوي أقراص **لوتان بولوس** على الكلتوز (لمحتوى الكلتوز، أنظر الفقرة ٦).

إذا قيل لك من قبل طبيبك بأن لديك عدم تحمل لبعض السكريات، اتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

### ٣) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال **لوتان بولوس** دائماً بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

من المهم مواصلة تناول **لوتان بولوس** لطالما وصفه لك طبيبك وذلك للمحافظة على السيطرة على ضغط دمك. بالإمكان تناول **لوتان بولوس** مع أو بدون طعام، يجب إلب الدواء مع كمية قليلة من الماء.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج مع جدولان من قبل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

#### إرتفاع ضغط الدم

المقدار الدوائي الإعتيادي من **لوتان بولوس** لغالبية مرضى إرتفاع ضغط الدم هو قرص واحد من **لوتان بولوس** اليوم، وذلك للسيطرة على ضغط الدم لطيلة فترة من الزمن قدرها ٢٤ ساعة. المقدار الدوائي اليومي الأعظمي هو قرصين لليوم من **لوتان بولوس**، مرة في اليوم.

**المرضى الذين يعانون من ضغط دم مرتفع مع سماكة في البطين الأيسر**

يتم تحديد المقدار الدوائي من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز المقدار الموصى به.

إذا دعت الحاجة، بالإمكان شطر القرص للمحافظة على الإستعمال الفوري.

لا توجد معلومات حول سحق أو مضغ القرص.

إذا تناولت من **لوتان بولوس** أكثر مما توجب عليك تناوله

فرط الجرعة يمكن أن يؤدي لهبوط في ضغط الدم، ضربات قلب، تباطؤ نظم القلب، تغيرات في صيغة الدم وتجفاف. إذا تناولت مقدارا دوائياً مفرطاً أو إذا بلغ طفلك الخطأ من الدواء، توجه حلاً إلى الطبيب أو لفرقة الطوارئ في المستشفى وأخضرك معك علبه الدواء.

إذا نسيت تناول **لوتان بولوس**

حاول أن تتناول **لوتان بولوس** بكل يوم كما وصف لك. لكن، إذا نسيت تناول مقدراً دوائياً، لا تتناول مقدارا دوائياً إضافياً. بل عد لجدول أوقات تناول الإعتيادي.

يجب المواظبة على العلاج كما أوصيت من قبل الطبيب.

كيف يمكنك المساهمة في نجاح العلاج؟

من المهم مواصلة تناول **لوتان بولوس** لطالما وصفه لك طبيبك وذلك للمحافظة على السيطرة على ضغط دمك. لا يجوز تناول أدوية في العمتة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقادير الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، اسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

### ٤) الأعراض الجانبية

كما بكل الأدوية، إن إستعمال **لوتان بولوس** قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا ننهدش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

**يجب التوقف عن إستعمال الدواء والتوجه حلاً إلى الطبيب أو لفرقة الطوارئ الأقرب إذا ظهر:** رد فعل تحسسي شديد (طفح، حكة، إنتفاخ الوجه، الشفتين، المم أو الحنجرة التي قد تسبب صعوبات في البلع أو في التنفس). هذا العرض الجانبى خطير لكن نادر، الذي يظهر بشيوع قدره ١ - ١٠ متعالجين

من بين ١٠٠٠٠. من الجائز أن تحتاج لعلاج طبي طارئ أو المبيت في المستشفى.

**يلج على حدوث الأعراض الجانبية التالية:**

**شائعة** (قد تؤثر على حتى شخص واحد من بين ١٠):

سعال، إلتهاب الطرق التنفسية العلوية، احتقان الأنف، إلتهاب الجيوب الأنفية، مشاكل في الجيوب الأنفية؛ إسهال، ألم في البطن، غثيان، مشاكل في الهضم؛ آلام عضلية أو تقلصات، ألم في الرجل، الم في الظهر؛

أرق، صداع، دوام؛ ضعف عام، إرهاق، آلام في الصدر؛ إرتفاع نسب اليوتاسيوم في الدم (التي قد تؤدي لعدم إنتظام نظم القلب). إنخفاض نسب الهيموغلوبين؛ تغيرات بوظائف الكلى تشمل فشل كلوي؛ سكر منخفض جداً في الدم (انخفاض السكر في الدم)

**غير شائعة** (قد تؤثر على حتى شخص واحد من بين ١٠٠ شخص):

فقر دم، نطف حمراء أو بنية على الجلد (أحياناً وبالأخص على راحتي القدمين، الرجلين، الذراعين والألية)، مع آلام في المفاصل، إنتفاخ اليدين وراحتي القدمين وآلم في البطن)، كدمات، تناقص خلايا الدم البيضاء، مشاكل في تخثر الدم، تناقص عدد الصفائح الدموية؛ فقدان الشهية للطعام، إرتفاع نسب حمض البول أو داء النقرس، إرتفاع نسب السكر في الدم، نسب شاذة للشوارد الكهربية في الدم؛ قلق، عصبية، اضطرابات من الهلع (تكرر نوبات الهلع)، إرتباك، إكتئاب، آلام شاذة، إضطرابات في النوم، نعاس، ضعف الذاكرة؛ الشعور ب «دابيس وإير» أو شعور مشابه، آلم في الأطراف، رجفان، شقيقة، إغماء؛ تشوش الرؤية، الشعور بحرق أو وخز في العينين، إلتهاب الملتحمة، تدهور الرؤية، رؤية الأشياء بلون أصفر؛ طنين، ضجيج، زئير أو ضربات في الأذنين، ترتج (فيرتيجو)؛ ضغط دم منخفض، الذي من شأنه أن يكون متعلق بتغيرات في الوضعية (الشعور بدوار أو ضعف عند النهوض)، نذبة (آلم في الصدر)، شذوذ بنظم القلب، حادث دماغي (TIA - نوبة إقفارية عابرة «سكتة خفيفة»، نوبة قلبية، خفقان القلب؛ إلتهاب الأوعية الدموية الذي يتراقظ غالباً بطبخ جلدي أو كدمات؛ آلم في الحنجرة، ضيق تنفس، إلتهاب القصبات، التهاب الرئتين، ماء في الرئتين (الذي يسبب صعوبة في التنفس)، رعاف، رشح، إحتقان؛ إمساك، إمسك شديد، غازات، إنتزاج في البطن، تشنجات في البطن، تقيؤ، جفاف الفم، إلتهاب الغدد اللعابية، آلم في الأسنان؛ يرقان (اصفرار العينين والجلد)، إلتهاب البنكرياس؛ شرى، حكة، إلتهاب الجلد، طفح؛ احمرار الجلد، حساسية للصوص، جفاف الجلد، تورم، تعرق، تساقط الشعر؛ آلم في الذراعين، الكدمات، الوكرين، الركبتين أو في مفاصل أخرى؛ إنتفاخ المفاصل، تصلب، ضعف العضلات؛ كثرة التبول بما في ذلك بالليل، عدم سلامة الأداء الوظيفي للكلى يشمل إلتهاب الكلى، تلوث في المسالك البولية، سكري في البول؛ تناقص الرغبة الجنسية، ضعف جنسي؛ إنتفاخ الوجه، إنتفاخ موضعي (وذمة)، سخونة.

**نادرة** (قد تؤثر على حتى شخص واحد من بين ١٠٠٠ شخص):

إلتهاب الكبد (Hepatitis)، شذوذ في فحوص وظائف الكبد

**غير معروف** (ليس بالإمكان تقدير شيوعها من المعلومات المتوفرة):

سرطان الجلد والشفتين (سرطان جلدي من نوع غير الميلانوما)؛ أعراض تشبه الإنفلونزا؛ آلام عضلية مجهولة السبب مع بول داكن (بولون الشاي) (انتحال العضلات المخططة)؛ إنخفاض نسب الصوديوم في الدم؛ شعور عام غير جيد؛ اضطرابات في حاسة المذاق

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

#### التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب دواء» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية. بدلاً من ذلك، بالإمكان تبليغ شركة «يونيفارم م.ض.»

### ٥) كيفية تخزين **لوتان بولوس**؟

● تجنب التسمم؛ يجب حفظ هذا الدواء، مثل كل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال

● لا يجوز إستعمال **لوتان بولوس** بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر المذكور.

● يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة ما دون ٢٥ درجة مئوية وفي مكان محمي من الضوء.

### ٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً:

Lactose; Microcrystalline cellulose; Pregelatinized starch; Magnesium stearate; Opadry white Y-1-7000.

يحتوي **لوتان بولوس** على كمية اليوتاسيوم التالية: ٤,٢٤ ملغ (٠,١٠٨ ميلي مكافئ) يحتوي **لوتان بولوس** على كمية الكلتوز التالية: ٩٤,٢ ملغ

**كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العبوة:**

**لوتان بولوس** معبأ ضمن ليوحات (بليستر) بداخل علبه كرتون. بكل علبه يوجد ٥, ٧, ١٠, ١٤, ١٥, ٢٠, ٢٨ أو ٣٠ قرصاً. من الجائز ألا تتسوق كافة أحجام العلب.

أقراص **لوتان بولوس** هي مطلية، بيضوية، محمية الجانبين مع خط للسطح من جانب واحد، ذات لون أبيض. إسم صاحب الإمتياز: يونيفارم م.ض./ص.ب. ٢١٤٢٩ - تل - أبيب، ٦١٢٢٣٠

إسم المنتج وعنوانه: تريما م.ض، كيبوتس معبروت. أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحتواها فحص ورخص في تاريخ تشرين الثاني ٢٠١٤ وتم تحديثها بحسب تعليمات وزارة الصحة في تاريخ شباط ٢٠١٩

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الكوكمي في وزارة الصحة: ١٢٧ ٩٥ ٣١٥٣ ٠٠

من أجل سهولة وتكوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.