



يجب ابلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول:
• أدوية لتخفيض ضغط الدم - حباجات بيتا، أدوية تخفيض الـ ACE أليسكيرين، دياروكسيد ومثباتات الإنزيم مثل - إنالابيريل، كابتوبيريل، ليزينوبريريل ورامبيبريل.

• إضافات البوتاسيوم أو دوائى الملح الماوية على بوتايسيوم مثل - إنالابيريل، كابتوبيريل، ليزينوبريريل ورامبيبريل.

• هيبارين (دواء يستعمل لتخفيض الدم).

• أدوية درجة البول (Diuretics)، لطرح السوائل من الجسم.

• مسهلات.

• بيتاسيلين أو مزيج دوائين لعلاج تلوث جرثومي - تريميپورازيم، وسولفاميفونوكسازول.

• مضادات الالتهابات لاستير وثانية (NSAIDs) المستعملة أيضاً لتسكن الألم مثل - سيبيرين (إذا كنت تتناول أكثر من ۲ غرام في اليوم)، إبويورفين، تايروكين، ديكوفيناك، أوروبوكسيب، سيلوكوكسيب.

• كوكسيبيتون أو كوليستيرامين (أدوية لتخفيض الكوليسترول).

• أمفوتيريسين (مضاد حيوي يستعمل لعلاج تلوث فطري منتشر)، لينيرون (دواء يستعمل لعلاج مشاكل تنفسية).

• إضافات البوتاسيوم أو فيتامين D.

• حباجات بيتا، دياروكسين، مستحضرات لتنظيم وتيرة دقات القلب).

• مستحضرات مضادة لل kokilin (مثل - أتروپين، بيبيردين).

• مستحضرات سامة للخلايا (مثل - سيلوكوفوسفاميد، ميتوتريكسات)، أدوية لعلاج السرطان.

• أدوية ستيروئيدية مثل - بريديزنيون.

• أماتاينون الغدة الكظرية (ACTH) (أمثلة - باربیتوروات (أدوية لعلاج الصرع أو اللختة)).

• أدوية مضادة للذهان التي قد تؤثر على نسب البوتاسيوم في الدم.

• كاربإتكوسولون (دواء يستعمل لعلاج أمراض في المريء أو تقرحات في جوف الفم).

• أدوية مضادة للسلكي (لما في ذلك إينسولين).

• سيلوكوسورين (دواء يستعمل لعلاج رغيف نسيج مزروع بعد زرع أعضاء).

• أدوية إضافية حيث أن استعمالها قد يؤدي إلى زيادة انتخاف ضغط الدم مثل - باكلوتين (دواء مخمى العضلات)، أميفوستين amifostine (دواء لعلاج السرطان) وأدوية معينة مضادة للذهان.

• مواد طلية الحاجوة بود المخصصة للتصوير.

٤ استخدام الدواء والطعام:
بالإمكان تناول الدواء بدون علاقة بوجبات الطعام.

٥ إستعمال الدواء واستهلاك الكحول:
يجب التحدث مع الطبيب حول عادات استهلاك الكحول.

قد يشعر بعض الأشخاص الذين يتناولون كاندور بلوس بدوره وضعف عند إستهلاك الكحول.

٦ الحمل والإرضاع

عليك ابلاغ الطبيب إذا كنت في فترة الحمل، تعتقدين بأنك حامل أو تخطيطن للحمل خلال فترة العلاج.

غالباً، يوصي الطبيب بالتوقف عن إستعمال كاندور بلوس

والانتقال لدواء آخر قبل حصول حمل أو متابعة بعد إكتشاف

حصول حمل. لا يوصي بإستعمال كاندور بلوس في بداية

الحمل ويمنع بعد الشهر الثالث من الحمل، لأن ذلك قد يسبب

ضرراً خطيراً للجنين، وذلك إذا تم تناوله بعد الشهر الثالث

من الحمل.

- كنت تتناول دواء لخفض ضغط الدم يحتوى على أليسكيرين aliskiren
- كنت تتناول دواء لخفض ضغط الدم يحتوى على أليسكيرين aliskiren ولديك مشاكل في وظيفة الكلى.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال كاندور بلوس:

١ قبل العلاج بـ كاندور بلوس، إحدى للطبيب إذا:

• أُصبت في الماضي بسرطان الجلد، أو إذا ظهرت لديك آفة غير متوقعة في الجلد خلال فترة إستعمال الدواء، إن إستعمال هيدروكlorوتايزيد قد يزيد من خطورة ظهور سرطان في الجلد أو في الشققين (سرطان بطان بطان ليس من نوع ميلانوما)، خاصة بالإستعمال المطول وبجرعات ودوائة مرتفعة.

يجب وقاية الجلد من التعرض للشمس والأشعة فوق البنفسجية (UV) خلال فترة إستعمال كاندور بلوس.

• كنت تعاني من حمل في وظيفة الكلى، الكبد أو الكلى.

• وجدر لديك سكري.

• وجدت لديك ذبة حمامية جهازية (لوبيوس).

• اجترت في الآونة الأخيرة عملية زرع كلية.

• كنت تعاني من إسهالات وقيحات أو عانيت في الآونة الأخيرة من تقيحات شديدة.

• كنت تعاني من مرض ياسم بفرط الأدولاستيروننة الأولى، إذا كنت تعاني من مرض في الغدة الكظرية المسمى متلازمة كون (Conn's).

• وجدر لديك متضخم دم منخفض.

• عانيت في الماضي من سكتة عروقية.

• كنت مقدماً على إجراء عملية جراحية، عليك إبلاغ الطبيب أو طبيب الأسنان بأنك تتناول كاندور بلوس، إن مشاركة كاندور بلوس مع مواد التخدير يمكن أن يؤدي إلى انتخاف ضغط الدم.

• كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.

• كنت تتناول واحداً من الأدوية التالية المستعملة لعلاج ارتفاع ضغط الدم:

• مثباتات الإنزيم ACE (مثل إنالابيريل، ليزينوبريريل، رامبىبريل) خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى ذات صلة بمرض السكري.

• أليسكيرين aliskiren.

في هذه الحالة يجب تناول الدواء إذا: ينتهي إلى جاهزك سيليكستيل (Candesartan cilexetil) هو دواء حجب ثأثيرات الهرمونات المستقبل أنجيوتنسين II، ويعدل عن طريق الأدوية المعدومة وإيقاف ضغط الدم.

هيدروكlorوتايزيد (Hydrochlorothiazide) هو دواء ينتهي إلى فضيلة مستحضرات المسماة مدرات مياهية.

يعلم الدواء على طرح محل كاربيد الصوديوم والماء عن طريق الجهاز البولي وبذلك يؤدي إلى خفض ضغط الدم.

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

١٩٨٦ - مستحضرات

سوق الدواء حبس وصفة طبيب فقط

كاندور بلوس

أعراض

التراكيب:

كل قرص من كاندور بلوس يحتوى على:
كانديسارتان سيليكستيل ١٦ ملغم

Candesartan cilexetil 16 mg

هيدروكlorوتايزيد ١٢.٥ ملغم

Hydrochlorothiazide 12.5 mg

المركبات غير الفعالة الرجاء أنظر الفقرة ٦ - معلومات إضافية.

٢ إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.
احفظ النشرة، من الجائز أن تحتاجها ثانية.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذه الدواء لعلاج مرض، لا لطيف الآخرين، فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

الدواء غير مخصص لأطفال ولامراهقين دون عمر ١٨ سنة.

٣ لأي أعراض مخصوص الدواء؟

كاندور بلوس مخصوص لمعاصن لمعالجة إرتفاع ضغط الدم، عندما يكون العلاج بـ كانديسارتان (candesartan) أو هيدروكlorوتايزيد (hydrochlorothiazide) لوحده غير كاف.

الفصيلة العلاجية:

كانديسارتان سيليكستيل (Candesartan cilexetil) هو دواء ينتهي إلى جاهزيات الهرمونات المستقبل أنجيوتنسين II، يعمل عن طريق حجب ثأثيرات الهرمون أنجيوتنسين II، ويؤدي إلى توسيع الأوعية المعدومة وإيقاف ضغط الدم.

هيدروكlorوتايزيد (Hydrochlorothiazide) هو دواء ينتهي إلى فضيلة مستحضرات المسماة مدرات مياهية.

يعلم الدواء على طرح محل كاربيد الصوديوم والماء عن طريق الجهاز البولي وبذلك يؤدي إلى خفض ضغط الدم.

٤ قبل إستعمال الدواء

٤ لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

• كنت تعساس المواد الفعالة كأنديسارتان سيليكستيل أو هيدروكlorوتايزيد أو أحد المركبات غير الفعالة (أنظر الفقرة ٣).

• كنت في فترة الحمل بعد الشهر الثالث (يُفضل أيضاً الامتناع عن إستعمال الدواء في بداية الحمل، لمعلومات إضافية انظر فقرة "الحمل والإرضاع" لاحقاً).

• علم بوجود جنسانية لأدوية من فضيلة السولفونايدات، إذا لم تكن وأنثاً من هذا الأمر فيجب استشارة الطبيب.

• كنت تعاني من القرص (gout).

• كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الكبد أو الكلية، أو إنسداد في الطرق الصفراوية.

• في حالة وجود اضطرابات في توازن السوائل أو الشوارد الكهربائية (مثل - إنخفاض نسبة كاربيد الصوديوم أو إرتفاع نسبة الصوديوم).

- ألم مفاجئ في العينين (جلووكوما حادة مقلقة الزاوية).
 - مرض لوبيوس الجهازي والجلدي (عبارة عن حالة تحسس التي يتقطل بإحمرار، حويصلات، تقرش وتدرن في الجلد).
 - إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبى لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.
 - الأماكن التالية عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "يلتف عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov) الذي يوجهك إلى النموذج المبادر للتليغ عن أعراض جانبية.
 - يدل ذلك بالإمكان تلبية شركة "يونيفارم مصر".
- (5) كيفية تخزين الدواء**
- تحنى التسميم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الرضيع، وذلك لتفادي اصطيافهم بالتسنم. لا يسبب التقى بدون تعلميات صريحة من المطبخ.
 - لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبة.
 - يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. في حالة الفتح، عليك استشارة الطبيب الذي صرف لك الدواء.
 - يجب التخزين بدرجارة حرارة دون درجة مئوية في مكان ممحي من الضوء.
- (6) معلومات إضافية**
- يحتوي الدواء إلإضافة إلى المواد الفعالة أيضًا:
- Lactose monohydrate; Hydroxypropyl cellulose; Poloxamer 188; Magnesium stearate; Iron oxide red.
- يحتوي كل قرص من كاندور بلوس على ١٦٠,٤ ملغ لكتوز.
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
- إن أقراص كاندور بلوس هي سادسية الشكل، لونها وردية فاتحة مع خط للنطرر تم إدخالها إلى ستراتيكوتون. في كل قليلة يوجد قرصاً (بلسيست) بالإضافة إلى مضمون لوحات بالمطبخ.
- باليessence لـ كاندور بلوس توفر على بأحجام .٥، .٧، .٩، .١٠، .١٢، .٢٠، .٢٢، .٢٣، .٢٨، .٣٠، .٣٢، .٣٥، .٣٧، .٣٩، .٤٠، .٤٢، .٤٤، .٤٦، .٤٨، .٤٩، .٥٠، .٥٢، .٥٤، .٥٦، .٥٨، .٦٠، .٦٢، .٦٤، .٦٦، .٦٨، .٦٩، .٧٠، .٧٢، .٧٤، .٧٦، .٧٨، .٧٩، .٨٠، .٨٢، .٨٤، .٨٦، .٨٨، .٨٩، .٩٠، .٩٢، .٩٤، .٩٦، .٩٨، .٩٩، .١٠٠.
- اسم صاحب الإمتياز: يونيفارم مصر، ص.ب. ٢٤٩٦، تل أبيب، ٦١٢١٣٢٠١.
- اسم المنتج وعنوانه:
- تربيه مصر، كيبوتس بربورت.
- أقررت وزارة الصحة صفة هذه النشرة ومحتها مُجمِّعًا رُخص في تاريخ تشرين الأول ٢٠١٤ وتم تحديدها بموجب تعليمات وزارة الصحة بتاريخ شباط ٢٠١٦ رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: كاندور بلوس: ١٥٢٧٥٣٤٥٦٠٠.
- من أجل سهولة وتهيئة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر، على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص للكلا الجنسين.
- أعراض جانبية شائعة، تظهر بأوقات متقاربة (تؤثر على أقل من مريض واحد من بين ١٠٠):
- إنخفاض كمية الصوديوم في الدم، في حال حدوث إنخفاض شديد، من المجاز أن تشعر بضعف عام، قلة الحيوية أو تقلصات عضلية.
 - إنخفاض كمية الكالسيوم في الكلية أو قصور في القلب، إذا كان التغير شديداً، من المجاز أن تشعر بارهاق، صعف عام، اضطرابات في نظم القلب أو الشعور بوخز وتتنفس.
 - إنفاق نسب الكوليسترول، السكر أو حمض البول في الدم.
 - سكر في البول.
 - دوار وضغط عام.
 - صداع.
 - تلوث في الطرق التنفسية.
- أعراض جانبية غير شائعة (تؤثر على أقل من مريض واحد من بين ١٠٠):
- ضغط دم منخفض - يمكن أن يسبب لك الشعور بالإغماء أو الدوار.
 - فقدان الشهية للطعام، إمساك، إمساك، معدة عصبية.
 - طفح، شرى، طفح ناتج عن حساسية لضوء الشمس.
- أعراض جانبية نادرة (تؤثر على أقل من مريض واحد من بين ١٠٠٠):
- يرقان (اصفار الجلد وبياض العين)، إذا حدثت هذه الحالة فيجب مراعاة الطبيب حالاً.
 - تأثير على وظائف الكلية (آخر)، خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلية أو من قصور في القلب.
 - صعوبات في النوم، اكتئان، قلة الراحة.
 - شعور بdryness أو وخز في الذراعين أو في الرجلين.
 - اضطرابات في نظم القلب.
 - صعوبات في التنفس (يشمل إلتهاب الرئتين وسوائل في الرئتين).
 - سخونة.
 - إنها في البنكرياس - يسبب آلام شديدة في البطن.
 - تقلصات عضلية.
 - ضرر للأوعية الدموية الذي يُؤدي لظهور نفط حمراء أو بنفسجية على الجلد.
 - إنخفاض في خلايا الدم البيضاء، خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية - من شأنها أن تجعلي بارهاق، تلوثات، سخونة أو كمات.
 - طفح شديد سريع الانتشار، مع حويصلات أو تقرش الجلد أو ظهور حويصلات في الفم.
- أعراض جانبية نادرة جداً (تؤثر على أقل من مريض واحد من بين ١٠٠٠):
- إنفاس الوجه، اللسان، الشفتين و/أو الحنجرة.
 - حكة.
 - ألم في الظهر، المفاصل والمussels.
 - تغيرات في وظائف الكبد، يشمل إنها في الكبد (hepatitis).
 - من المجاز أن تشعر بارهاق، اصفار الجلد وإصفار بياض العينين، وأعراض إنفلونزا.
 - سعال.
 - غثيان.
 - المركب الغعال، هيدرووكورتيازيد، الموجود بـ كاندور بلوس، يمكنه أن يحفز أو يفاقم مرض النثنية (لوبيوس) لدى بعض المرضى.
- أعراض جانبية بشيوع غير معروفة:
- سرطان الجلد والشققين (سرطان جلد من نوع ليس ميلانوما).
 - قصر مقاوجي في الرؤية.
- إذا كنت في فترة الرضاعة أو تخططين للرضاعة الرجاء بلغي الطبيب، لا يوصى الأمهات المرضعات باستعمال كاندور بلوس خلال فترة الرضاعة خاصة لدى حدثي الولادة وأدخر، إذا رغبت في الرضاع فمن المجاز أن يوصى الطبيب بعلاج بديل.
- ١. السياقة واستعمال الماكيات:**
- قد يسبب هذا الدواء الدوار أو الإرهاق لدى أشخاص معينين. في حال شعورك بهذه الأعراض، تجنب سياقة المركبات، تشغيل الماكيات الخضراء، واي شاشة يقتضي البظرطة.
- ٢. معلومات استعمال الدواء:**
- الأدواء تحتوي على تكتوز حيث يعتبر نوع من السكر، إذا قبل لك من قبل الطبيب أنت تعاني من عدم تحمل لسكريات معينة، استشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء.
- ٣. كيفية استعمال الدواء؟**
- يجب إستعمال الداما مسبب تعليمات الطبيب، عليك الاستيقاظ من النوم أو المصيادي إذا لم تكن وألقاً.
- الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
- لا تتجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.
- هذا الدواء غير مخصص للأطفال (دون عمر ١٨ سنة).
- إرشادات الاستعمال:**
- عند الحاجة بالإمكان شطر القرص للإستعمال الفوري، لا تتوفّر معلومات حول سقوط أو مضاعف القرص.
- بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.
- يوصى بتناول الأدواء في نفس الوقت كل يوم، في الصباح، مثلاً.
- إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فيجب تناول الجرعة الدوائية التالية كالمعتاد، ولكن لا يجوز تناول جرعتين دوائين معاً في أي حال من الحالات، إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بقي طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك على الدواء.
- عليك إكمال العلاج الموصى به من قبل الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.
- ٤. لا تتناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء**
- والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع في خلايا الدم البيضاء، خلايا الدم الحمراء والصفائح الدموية - من شأنها أن تجعلي بارهاق، تلوثات، سخونة أو كمات.
- إذا توفر لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو المصيادي.
- ٥. الأعراض الجانبية**
- كما بكل دواء، إن إستعمال كاندور بلوس قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين، لا تندفع من قائمة الأعراض الجانبية، من المجاز أن تعاني أي منها.
- الأعراض التي يتضمنها إهتماماً خاصاً، توقف عن تناول الدواء وراجح الطبيب حالاً:**
- صعوبات في التنفس واللدين، إنها في الوجه، اللسان، الشفتين و/أو الحنجرة.
 - حكة شديدة ترافق بحويصلات بارزة، طفح شديد يتغطّر بسرعه، مع حويصلات ونقشر الجلد وغالباً حويصلات في الفم أيضاً.
 - ميل حدوث كدمات سهولة، أو ارهاق شديد (نادر).
 - في أي حالة شعورك بأعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، أو إذا طرأ تغير على شعورك العايم، عليك استشارة الطبيب بالدأ.
 - قد يسبب كاندور بلوس إنخفاضاً في نسبة خلايا الدم البيضاء، نتيجة لذلك قد تكون لديك مقاومة أقل لللتوثات، ومن المجاز أن تشعر بارهاق، التعبات أو سخونة، في هذه الحالة يجب الاتصال فوراً بالطبيب من أجل إجراء قحوص دم.