



## السيادة واستعمال الماكنت

قد يضعف مرض ألزهايمر من قدرتك على السيادة أو تشغيل ماقنات أو أجهزة خطرة. فمن أجل سلامتك، منمنع عليك تجنب تلك التنشاطات إلا إذا سمح لك الطبيب بذلك. كما أن، ميموريت قد يسبب إرهاق، دوار وتقىصات عضلية. في حال ظهور هذه الأعراض، فلا يجوز السيادة أو تشغيل ماقنات أو أجهزة خطرة.

**الحمل والإرضا**  
لا يجوز استعمال ميموريت خلال الإرضا. إذا كنت حاملاً أو من الجائز أنك أصبحت حاماً، فيجب استشارة الطبيب.

**معلومات هامة عن بعض Produkates الدواء**  
يحتوي الدواء على لكتون. يجب إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج بـ ميموريت، وذلك إذا كنت حساساً لسلكيات معينة.

**(٣) كيفية استعمال الدواء؟**  
يجب الاستعمال حسب تعليمات الطبيب دائماً.

عليك الاستياضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً من المقادير الدوائية وطريقة العلاج يحدمن من قبل الطبيب فقط.

**- المقدار الدوائي الاعتيادي هو:**  
كمقدار دوائي إبتدائي عادة يجب تناول ميموريت ٥ (ملغ) كل مساء، بعد شهر، من الجائز أن يوصيك الطبيب بتناول ميموريت ١٠ (ملغ) كل مساء. يجب تناول قرص ميموريت بشكل الكامل مع القليل من الماء قبل النوم.

عند الحاجة للإمكان شطر القرص للاستعمال الفوري. لا تتوفر معلومات عن سحق أو مفعه القرص.

قد يتغير عيار الدواء حسب الفترة الزمنية التي تتناول فيها الدواء وحسب توصية الطبيب.

**- المقدار الدوائي الأعظمي الموصى به هو ١٠ ملغ**

ميموريت كل مساء.

- لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به. لا يجوز تغيير المقدار الدوائي بدون تعليمات من الطبيب.

يجب المواطبة على العلاج بـ ميموريت كما أوصيت من قبل الطبيب.

**• فترة العلاج - ميموريت:**  
يوصيك طبيب أو الصيدلي الخاص بك على فترة العلاج بـ ميموريت. يلي إجتياز فحص من طبيب من حين لأخر خلال العلاج وذلك لتقدير الأعراض والعلاج.

**• إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر من ميموريت**  
أو إذا بليغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأخسر علبة الدواء معلم. علامات لجرعة مفرطة من ميموريت تتضمن غثيان وقيقations، سيلان اللعاب، تعرق، نظم قلب بطيء، اختناق ضغط الدم (دوار عند الانتقال إلى وضعية الوقوف)، صعوبة في التنفس، فقدان الوعي، إختلالات أو تشنجات.

لا يجوز تناول أكثر من قرص واحد في اليوم.

• مرض قلبي (نظم قلب غير منتظم أو بطيء جداً).

• رو أو مرض رئوي مزمن آخر.

• مشاكل في الكبد.

• صعوبة في التبول أو مرض كلوي معتمد.

بإمكان المتعالجين الذين يعانون من مرض كلوي استعمال

ميموريت، لكن يجب استشارة الطبيب.

المتعالجون الذين يعانون من مرض كبد خفيف حتى

متوسط يمكنهم إستعمال ميموريت، ولكن يجب إستشارة

الطبيب.

لا يوصي بإستعمال الدواء لدى متعالجين يعانون من

مرض شديد في الكبد.

إذا انقطعت عليك إحدى الحالات التي ذكرت سابقاً، احك عن

ذلك للطبيب أو الصيدلي قبل بدء العلاج بـ ميموريت.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي عن الشخص الذي يعني

بك، فهو يمكنه أن يساعدك بتناول الأدوية المطلوب.

**(٤) إذا كنت تتناولين، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى**

بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية

ذلك، لأن هذه الأدوية قد تؤثر على نجاعة ميموريت.

يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالأخص إذا كنت تتناول

الأدوية التالية:

أدوية أخرى ضد الزهايمر مثل الالاتامين.

• مضادات الالتهاب أو أدوية المعالجة التهاب المفاصل مثل:

أسيپيرين، مضادات الالتهاب اللاسترونيديه (NSAIDs) (مثل آيبوبروفين أو ديكوكوفيناك صوديوم).

أدوية مضادة للإللتاجلات (الصرع)، مثل فينيتوين.

• مضادات حيوية، مثل اريتوميسين وريفاراميسين.

أدوية لعلاج الفطريات، مثل بيكتونازول، إيتراكونازول.

• مضادات الإكتبات، مثل فلو أوكسيتين.

أدوية مضادة للأرطاجات (الصرع)، مثل فينيتوين أو كاربامازيبين.

أدوية مالماحة الثالثة الكلبية، مثل كينيدين أو حاجيات

بيتا (مثل بروبرانولول وأنثيولول).

أدوية لإرخاء العضلات، مثل ديزابيم، سوكسينيل كولي.

أدوية للتهدير العام.

**(٥) العمليات الجراحية والفحوص أثناء تناول ميموريت**

إذا كنت مقيماً على إجراء عملية جراحية (يشمل جراحة

الأسنان) أو أي إجراء يتطلب التخدير، يجب إبلاغ الطبيب

المخدر والطبيب المعالج بأنك تتناول ميموريت. قد يؤثر

ميموريت على كمية المادة المخدرة اللازمة.

**(٦) استعمال ميموريت مع الطعام**

لا يوجد الطعام تأثير على عمل الدواء.

**(٧) استعمال ميموريت واستهلاك الكحول**

لا يجوز شرب الكحول أثناء العلاج بـ ميموريت. إن

الكحول قد يؤثر على عمل الدواء.

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - ١٩٨٦

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط.

## ميموريت ١٠٪

### أعراض

**المادة الفعالة وكميته:**

يحتوي كل قرص من ميموريت ٥ على:

دونينبيزيل هيدروكلوريد ٥ ملغ

يحتوي كل قرص من ميموريت ١٠٪ على:

دونينبيزيل هيدروكلوريد ١٠ ملغ

Donepezil Hydrochloride 5 mg

Donepezil Hydrochloride 10 mg

مواد غير فعالة إضافية: أنظر الفقرة ٦ في النشرة.

**إنقرأ النشرة تعمّن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء.**

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفرت لديك أسلطة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

احفظ هذه النشرة، من الجائز أن ترتفع في المصحفي بها ثانية.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضه. لا تعطيه للآخرين. فهو قد

يضرر حتى ولو بدا أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

الدواء مخصص للبالغين فقط.

### اللأي غرض مخصوص الدواء؟

المعالجة الخرف الخفيف حتى المتوسط لمرض ألزهايمر.

**الفصيلة العلاجية:** من مثبّطات الإنزيم أسيتيل كولي

إستراز.

يتخلل الأسيتيل كوليين بمسيرات الذاكرة في المخ.

دونينبيزيل يرفع كمية البوتاسيوم وذلك بتنبيط

عملية تفكيك التي تتم بواسطه أسيتيل كوليين إستراز.

يسعّى دونينبيزيل لمعالجة أعراض مرض ألزهايمر مثل

ترابيد قذف الذاكرة، إرباك وتغيرات سلوكية، التي تلقى

الضرر ببنائه الحياة السليم للمتعالجين.

### قبل إستعمال الدواء

#### ١) لا يجوز إستعمال ميموريت إذا:

هيديروكلوريد، لمشتقات الـ بـ بـ بـ يـ بـ يـ بـ يـ دـ يـ

من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر

الفقرة ٦: «معلومات إضافية» في هذه النشرة).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

قبل العلاج بالدواء يستشر الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت

في الماضي من:

• قرحة في المعدة أو في الأمعاء العشي.

• نوبات أو اختلالات.

## ٦) إذا نسيت تناول الدواء:

إذا نسيت تناول ميموريت في الوقت المطلوب، لا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف. يجب تناول المقدار الذي أقراصه في الدارج التالي كالمعتاد. إذا نسيت تناول ميموريت لفتره تزيد عن الأسبوع، استشر الطبيب قبل أن تتناول ميموريت.

## ٧) في حال توقفك عن تناول ميموريت:

لا يجوز التوقف عن تناول الدواء، إلا إذا أوصى الطبيب بفعل ذلك. في حال توقفك عن تناول ميموريت، فإن فوائد العلاج تتلاشى تدريجياً.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة؛ يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقاييس الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال ميموريت، استشر الطبيب أو الصيادي.

## ٤) الأعراض الجانبية:

كما بكل دواء، إن استخدام ميموريت قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية، أو عندما تتعانى من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

عليك التوجه حالاً إلى الطبيب إذا ظهرت الأعراض الخطيرية التالية، من الجائز أن تحتاج لعلاج طبي طارئ:

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى ١٠٠٠ مستعملين من بين ١٠٠٠٠):

ضعف عضلي، حساسية أو ألم في العضلات، خاصة إذا شعرت في نفس الوقت بأنك مريض، لديك سخونة أو بول داكن. هذه العلامات قد يكون سببها حالة غير طبيعية لتفتك النسيج العضلي التي قد تشكل خطراً على الحياة وتسبب مشاكل في الكلى (هذه الحالة تسمى إنحلال الخلايا المخططة، أو rhabdomyolysis).

قرحات في المعدة أو في الأنثأة عشرى. الأعراض هي: ألم في البطن وإنزياج (الشعور بشكل في الضم) في منطقة البطن بين السرة وعظم الصدر.

نزف في المعدة أو في الأمعاء. يتجلّى ببراز أسود أو دم مرئي بفتحة الشرج.

إختلالات أو تشنجات.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى ١٠٠١٠٠ مستعملين من بين ١٠٠٠٠):

NMS - Neuroleptic malignant syndrome (NMS). علامات NMS تشمل: سخونة مرتفعة، تصلب العضلات، تعرق أو تدلى مستوى الوعي.

\* ضرر لل Kidd، مثل: يرقان (hepatitis). الأعراض هي: غثيان وقيءات، قلة الشهية للطعام، شعور عام سيء، سخونة، حكة، إصفرار الجلد والعينين وبول داكن.

## ٦) معلومات إضافية:

أعراض جانبية شائعة جداً (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين ١٠٠٠):

إسهال، غثيان وقيءات، صداع.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى ١٠٠١٠٠ مستعملين من بين ١٠٠٠):

تقاسطات انتانية، إرهاق، أرق، رعش، قلة الشهية للطعام، مديان، أحلام غريبة تشمل كوابيس، قلة هدوء، سلوك عدواني، إغماء، دوار، انزعاج في البطن، فطح، حكة، قلة السيطرة على التبول، ألم، حوادث (متталجون يميلون أكثر للسقوط والإصابة).

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى ١٠٠١٠٠ مستعملين من بين ١٠٠٠٠):

تباطؤ نظم القلب.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى ١٠٠١٠٠ مستعملين من بين ١٠٠٠٠):

تصلب، رعش، حرकات لا إرادية بالأخص للوجه واللسان بل للأطراف أيضاً.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعانى من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بإمكانك التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov) الذي يوجهك إلى التسويق المباشري للتبلغ عن أعراض جانبية.

بدلاً من ذلك، بالإمكان تبليغ شركة "يونيفارم.م.ض.".

## ٥) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على علبة الكرتون وعبوة البليستير. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة دون ٢٥ درجة مئوية وفي مكان محظى من الضوء.

• لا يجوز رمي أدوية إلى مياه المجاري أو للقمامة البيئية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد بحاجتها. إن إتخاذ هذه الوسائل تساعده في الحفاظ على البيئة.