

سيلازيريل بلوس

أقراص

التركيب: يحتوي كل قرص على:

سيلازيريل ٥ ملغ ١٩٦٥ ملخ Cilazapril 5 mg

هيدروكلوروتيازيد ١٢,٥ ملخ Hydrochlorothiazide 12.5 mg

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

١) قبل العلاج بـ سيلازيريل بلوس إحكام للطبيب إذا:

- أصبت في الماضي بسرطان الجلد، أو إنما تطور لديك آفة غير متعددة في الجلد خلال فترة إستعمال الدواء.
- إن إستعمال هيدروكلوروتيازيد قد يزيد من خطورة تطور سرطان في الجلد وفي الشفتين (سرطان جلد ليس من نوع ميلانوما)، خاصة بالإستعمال طول الأمد وبجرعات دوائية عالية. يجب حماية الجلد من التعرض للشمس والأشعة فوق البنفسجية (UV)

خلال فترة إستعمال سيلازيريل بلوس.

٢) كنت تعاني أو عانت في الماضي من خلل في وظيفة القلب و / أو الأوعية الدموية، الكبد، الكلية / الجهاز البولي، إذا كنت تعاني من سعال، سكري، فرط البوتاسيوم في الدم (يتميز بأعراض مثل إرثراك)، عدم إنتظام نظم القلب، حصبة، خدر أو وحش في البدينين، في راحتي القدمين أو في الشفتين، ضيق أو صعوبات في التنفس، ضعف عام أو تقليل في الرجلين، من التعرق (gout)، من ارتفاع في نسبة الشحوم في الدم (كوليسترول والشحوم الثلاثية)، من فقدان متزايد للسوائل (إسهال أو تقيؤ).

٣) تنوين الحمل خلال فترة العلاج، عليك إستشارة الطبيب بالنسبة لمواصلة العلاج.

٤) كنت مريضاً وتتعيّن حمية غذائية فقيرة الصوديوم، كنت مريضاً تختنق للديزيز، كنت مريضاً تعاني من الذئبة.

٥) يجب إبلاغ الطبيب خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الأداء الوظيفي للكلري ومعالجاً بأدوية لخفض ضغط الدم الحادى على أليسكيرين.

٦) قد يؤدي هذا الدواء إلى انخفاض شديد في ضغط الدم. من الجائز حدوث تأثير متزايد للدواء عند إستعمال الجرعة الدوائية الأولى والذي يتجلّى بانخفاض ضغط الدم، لذلك يوصى بتناول الجرعة الدوائية الأولى يومياً بوضعيّة الاستلقاء.

٧) يجب الانتباه بأن التعرق المتزايد وفقدان السوائل من خلال التعرق أو الإسهال مثلاً قد يؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط الدم - يجب الحرص على الشرب الكافي في هذه الحالات.

٨) كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.

٩) يجب الانتباه إلى احتقان عملية جراحية (يشمل الأسنان) أو إجراء منوط بالتخدير، يجب إبلاغ الطبيب (المخدر) عن تناولك لهذا الدواء.

١٠) لا يجوز إستعمال إضافات البوتاسيوم أو بدائل الملح الحاووية على بوتاسيوم بدون استشارة الطبيب مسبقاً.

١١) هذا الدواء غير مخصص عادة للأطفال والرضع.

١) قبل العلاج بـ سيلازيريل بلوس إحكام للطبيب إذا:

- أصبت في الماضي بسرطان الجلد، أو إنما تطور لديك آفة غير متعددة في الجلد خلال فترة إستعمال الدواء.
- إن إستعمال هيدروكلوروتيازيد قد يزيد من خطورة تطور سرطان في الجلد وفي الشفتين (سرطان جلد ليس من نوع ميلانوما)، خاصة بالإستعمال طول الأمد وبجرعات دوائية عالية. يجب حماية الجلد من التعرض للشمس والأشعة فوق البنفسجية (UV)

خلال فترة إستعمال سيلازيريل بلوس.

٢) كنت تعاني أو عانت في الماضي من خلل في وظيفة القلب و / أو الأوعية الدموية، الكبد، الكلية / الجهاز البولي، إذا كنت تعاني من سعال، سكري، فرط البوتاسيوم في الدم (يتميز بأعراض مثل إرثراك)، عدم إنتظام نظم القلب، حصبة، خدر أو وحش في البدينين، في راحتي القدمين أو في الشفتين، ضيق أو صعوبات في التنفس، ضعف عام أو تقليل في الرجلين، من التعرق (gout)، من ارتفاع في نسبة الشحوم في الدم (كوليسترول والشحوم الثلاثية)، من فقدان متزايد للسوائل (إسهال أو تقيؤ).

٣) تنوين الحمل خلال فترة العلاج، عليك إستشارة الطبيب بالنسبة لمواصلة العلاج.

٤) كنت مريضاً وتتعيّن حمية غذائية فقيرة الصوديوم، كنت مريضاً تختنق للديزيز، كنت مريضاً تعاني من الذئبة.

٥) يجب إبلاغ الطبيب خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل في الأداء الوظيفي للكلري ومعالجاً بأدوية لخفض ضغط الدم الحادى على أليسكيرين.

٦) قد يؤدي هذا الدواء إلى انخفاض شديد في ضغط الدم. من الجائز حدوث تأثير متزايد للدواء عند إستعمال الجرعة الدوائية الأولى والتي يتجلّى بانخفاض ضغط الدم، لذلك يوصى بتناول الجرعة الدوائية الأولى يومياً بوضعيّة الاستلقاء.

٧) يجب الانتباه بأن التعرق المتزايد وفقدان السوائل من خلال التعرق أو الإسهال مثلاً قد يؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط الدم - يجب الحرص على الشرب الكافي في هذه الحالات.

٨) كنت حساساً لأي طعام أو لأي دواء، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل تناول الدواء.

٩) يجب الانتباه إلى احتقان عملية جراحية (يشمل الأسنان) أو إجراء منوط بالتخدير، يجب إبلاغ الطبيب (المخدر) عن تناولك لهذا الدواء.

١٠) لا يجوز إستعمال إضافات البوتاسيوم أو بدائل الملح الحاووية على بوتاسيوم بدون استشارة الطبيب مسبقاً.

١١) هذا الدواء غير مخصص عادة للأطفال والرضع.

١٢) لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت في فترة الحمل أو الرضاعة.
- عدم وجود حساسية لأحد مركباته أو لأدوية أخرى من فصيلة مثبطات ACE، لنيازيدات (مدرات للبول) أو لأدوية فيها مشتقات سولفوناميدات.
- عانيت في الماضي من وذمة وعاشرة (انتفاخ الوجه، اللسان، الحجرة) بعد علاج بأدوية أخرى من فصيلة مثبطات ACE.
- كنت تعاني من إستسقاء سوائل في جوف البطن.
- كنت تعاني من احتباس البول.
- كنت تعاني من السكري ومعالج بأدوية لخفض ضغط الدم الحاووية على أليسكيرين.

١) الفحوص والمتابعة:

قبل بدء العلاج وخلال فترة العلاج بهذا الدواء يجب إجراء فحوص الدم، البول، الأداء الوظيفي الكلوي والمتابعة لارتفاع ضغط الدم.

قد يؤثر الدواء على تناول فحص الدم والبول. يجب إبلاغ الطبيب قبل إجراء هذه الفحوص.

٢) التداخلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالإضافة إذا كنت تتناول: أليسكيرين (انخفاض ضغط الدم)، أدوية إضافية لخفض ضغط الدم، أدوية مضادة للسعال والرشح، أدوية مدرة للبول، مضادات الإلتهاب الالاستيرويدية (NSAIDs) مثل أسيبرين، ليتبيوم (الإستربطاب ثانوي القطب)، مضادات المحموضة، كورتيكوسترئويات، أدوية لخفض الكوليسترول مصدرها راتينج (كوليستيرامين وكوليستيپول)، أدوية مرخصة للعللات، أدوية التي قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم (مثل أردبيللين) باربيتورات، مسكنات الآلام المخدّرة، مستحضرات تحتوي على بوتاسيوم (مثل بدايل الملح)، أدوية لعلاج السكري (إنسولين)، مستحضرات بالإعطاء الفموي، البيوريتون (النقرس)، أدوية الركود الخلوي /أدوية منظمة لجهاز المناعي، بروكاثيناميد (للقلب)، ديجيتاليس، إذا كنت تعاني من علاج بسبب ساعات النحل أو الدبابير.

٣) إستعمال الدواء واستهلاك الكحول:

لا يجوز شرب الكحول أو المشروبات الروحية خلال فترة العلاج بالدواء لأنه قد ينجم عن ذلك إنخفاض شديد في ضغط الدم.

٤) السيادة واستعمال الماكولات:

إن إستعمال هذا الدواء قد يضرع من اليقطة أو يسبب الدوار، خاصة في بداية العلاج وبالتالي يجب توخي الحذر عند سيادة المركبة، عند تشغيل الماكولات الخطرة وبائي نشاط يتطلب اليقطة.

٥) معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي المستحضر على لكتوز وقد يسبب الحساسية لدى الأشخاص الذين لديهم حساسية للكتوز.

٦) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

٦) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمواد الفعالة أيضاً:

Lactose anhydrous, Maize starch, Hydroxypropyl methylcellulose, Sodium stearly fumarate, Opadry brown OY-9375, Opadry white Y-1-7000.

يحتوي كل قرص من سيلاريل بلوس على ١٧٣ ملغم لكتوز.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
سيلاريل بلوس معبأ ضمن لوحيات (بليستر) في داخل علبة كرتون؛ في كل علبة يوجد ٧، ١٠، ١٤، ٢٨، ٣٠، ٥٥، قرصاً.
من الجائز لا تسوق كافة أحجام العلب.

سيلاريل بلوس عبارة عن أقراص مطبلة، مستديرة، محدبة من كلا الجانبين، لونهابني فاتح، مع خط للشطر من جانب واحد.

إسم صاحب الإمداد: يونيفارم م.ض.، ص.ب.، ٢٤٢٩، تل - أبيب، ٦١٢١٣٠١.

اسم المنتج وعنوانه: تريما م.ض.، كيبيوت معتبروت. أقرت وزارة الصحة صيغة هذه النشرة ومحوهاها فحص ورخص في تموز ٢٠١٢ وتم تدريسيها بموجب تعليمات وزارة الصحة في شباط ٢٠١٩.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

سيلاريل بلوس: ٠٠٠ ٢١٣٦٥ ٩٥ ١٣٥

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

وذمة في أعضاء مختلفة، بما في ذلك: الشفتين، العينين، اللسان وصعوبة في التنفس (نادراً): توجه للطبيب حالاً! إنخفاض ضغط الدم (الذي يتجلّى بدوار أو إغماء وقد يؤدي إلى حدوث نوبة قلبية)، ألم في الصدر، نظم قلب سريع أو غير منتظم، التبول بشكل متكرر أو براقة له، صعوبات في التنفس أو سعال دموي، علامات لستة (مثل خدر في الوجه، اليدين والرجلين، صعوبة في النطق، الفهم أو البصر، فقدان الرؤية، صداع مفاجئ)، ألم مفاجئ في البطن (intestinal angioedema) أو إنتفاه البنكرياسي (pancreatitis) (نادراً): توجه للطبيب حالاً!

أعراض صدمة إستهداافية (مثل غثيان، صداع، طفح، صيق في التنفس، إنخفاض في ضغط الدم، تباطؤ في نظم القلب): توجه حالاً للطبيب!

غثيان وتنقيّات خطيرة، إسهال خطير، علامات تلوث (مثل ألم في الحنجرة، سخونة)، ألم في العضلات أو الألم في المفاصل، اصفرار الجلد أو العينين (مشاكل في الكبد) (نادراً): توجه حالاً للطبيب!

أعراض جانبية شيعها غير معروفة (لا يمكن تقييم الشيوخ من المعلومات المتوفرة): سرطان الجلد والشفيقين (سرطان الجلد من نوع ليس ميلانوما).

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت أحدي الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، علي إستشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب لجوء دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى التموزن المباشر للت bliغ عن أعراض جانبية. بدلاً من ذلك، بالإمكان تبليغ شركة «يونيفارم م.ض.».

٥) كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقى بدون تعليمات صرحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضائه تاريخ الصلاحية (exp. Date) تاريخ انقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

التخزين: يجب تخزين دون ٢٥ درجة مئوية وفي مكان محمي من الضوء.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها. عند الحاجة بالإمكان شطر القرص للإستعمال الفوري. لا تتوفر معلومات بخصوص سحق أو مضغ القرص. يجب بلع الدواء مع القليل من الماء، قبل أو بعد وجبة الطعام. ستحسنتناول الدواء كل يوم في نفس الساعة تقريباً، يفضل في الصباح.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفلاً بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عليه الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المخصص، يجب تناول جرعة دوائية حالاً عند تذكرة بذلك، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول جرعتين دوائيتين سوية!

كيف يمكنك المساهمة في نجاح العلاج؟
عليك إكمال العلاج الذي أوصى به الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسللة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

٤) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال سيلاريل بلوس قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تذهبش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أي منها. بالإضافة للتأثيرات المرغوبة للدواء، قد تظهر خلال فترة إستعماله أعراضًا جانبية، مثل صداع، طفح، إسهال، غثيان، دوار، إرهاق، إضطرابات في الهضم، تغيرات في حالة التذوق، قلة الشهية للطعام، تساقط الشعر، حساسية زائدة للضوء، زيادة التعرق، عجز جنسي، تورّد، إضطرابات في التوّم. عادة تزول هذه الأعراض خلال وقت قصير بعد فترة التعود على المستحضر.

أعراض تقضي اهتماماً خاصاً:
إنخفاض في كريات الدم الحمراء، البيضاء أو الصفائح الدموية، ألم في اللسان، إنتفاه الجيوب الأنفية، مشاكل خطيرة في الجلد (بما في ذلك حوصلات أو نقشر)، تخلخل الأظافر، تضخم الصدر لدى الرجال (نادراً): توجه للطبيب حالاً!