

קוקסידין יובפרמה 200 וטרינרי Coxidin Huvepharma 200 Veterinary

תוסף לתערובת - אבקה
עפ"י מרשם רופא וטרינרי בלבד

הרכב: כל 1 ק"ג מוצר מוגמר מכילים מוננסין סודיום 200 גרם Monensin sodium.

קבוצה תרפויטית: אנטיביוטיקת פוליאתר

פעילות רפואית: למניעת קוקסידיוזיס בתרנגולות פטם והודים.

מינון ואופן השימוש:

תרנגולות: 500-625 גרם של קוקסידין יובפרמה 200 וטרינרי לכל טונה מזון (100-125 מ"ג/ק"ג מוננסין סודיום).
הודים: 300-500 גרם של קוקסידין יובפרמה 200 וטרינרי לכל טונה מזון (60-100 מ"ג/ק"ג מוננסין סודיום).
יש לערבב היטב עם מרכיבי המזון האחרים. יש לשים לב בזמן העברת התערובת שלא ייווצרו משקעים.
יש לערבב תחילה עם 20-50 ק"ג מתערובת המזון ורק אחר כך להשלים עם יתר התערובת לקבלת הריכוז הסופי (PPM100)
מנות המכילות תחמיץ או מזון רטוב אחר יש לחשב לפי בסיס של 90% מזון יבש על מנת לקבל את המינון הנכון של מוננסין.

מינון יתר:

מינון יתר עלול לגרום לירידה בצריכת המזון, לעכב גדילה, לשלשולים ואף למוות.

התוויות נגד:

אין להשתמש בתכשיר למטילות ביצים למאכל אדם.
אין לתת להודים שגילם גבוה מ-16 שבועות.
אין לתת בו-זמנית עם תכשיר רפואי המכיל TIAMULIN וטרולאנדומיצין או לפחות 7 ימים לפני או אחרי שכן עלול לגרום לעיכוב בגדילה ואף למוות.
אין לתת בו-זמנית עם אריתרומיצין, אולאנדומיצין, סולפהדימטוקסין, סולפהדימידין, סולפהקווינוקסלין
לא לתת בעופות לרבייה.
אין לתת התכשיר לבעלי חיים ממשפחת הסוסיים, כגון: סוסים, זברות וחמורים וכן לכלבים שכן עלול להיות קטלני להם.
אין לתת עם קוקסידיוסטט אחר או סולפונאמיד.

זמני המתנה לשחיטה לבשר:

אין לשחוט בזמן הטיפול.
יש להמתין 1 יום מתום הטיפול לפני השחיטה.

אזהרות:

הרחק מהישג ידם של ילדים
אין לאחסן או להשליך את התכשיר במקום העלול להיות נגיש לבעלי חיים שאינם בטיפול או לחיות בר.
לשימוש וטרינרי בלבד

אזהרות למפעיל:

רעיל בבליעה.

גורם לגירוי בעיניים, בעור, באף ובגרון.

בחשיפה חוזרת יכולה להתפתח תגובה אלרגית.

אין לבלוע או לנשום אבק של תכשיר זה. בזמן הטיפול בחומר (פתיחת המיכל וערבוב) יש ללבוש ביגוד המגן על כל הגוף, כולל כובע הניתן לכביסה, מסיכה לפני, הכוללת משקפי מגן ואשר מגנה משאיפת אבק, וכפפות פלסטיק (PVC) עד למרפק.
בתום שימוש יומי יש לנקות היטב את הציוד וביגוד המגן.

יש להימנע ממגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף מיד עם מים זורמים במשך 15 דקות ולפנות לטיפול רפואי במקרה של הרעלה – יש לפנות לסיוע רפואי

באחריות המפעיל להכיר את כל הוראות הבטיחות כפי שרשומים

ב MSDS (material safety data sheet) של התכשיר.

יש לרחוץ היטב ידיים, זרועות ופנים במים ובסבון לאחר העבודה, ולפני אכילה שתיה או עישון

טיפול באריזות הריקות:

יש לנער ולרוקן את האריזות ולהשליך אותן למכלים המיועדים לפסולת רפואית.
אין לשרוף את האריזות הריקות.

חומרי גלם בלתי פעילים:

Calcium carbonate, Starch

אחסנה: במקום קריר ויבש מתחת ל - 25°C.



יצרן: ביווט בע"מ, פשטרה, בולגריה

בעל הרישום: ג.ו. אורסל אינטרנשיונל בע"מ, מושב סתריה.

מספר רישום התרופה: 083-98-92417

תכולה: 20 ק"ג